

吐瀉

曾小兒吐瀉併作卽名霍亂有心痛而先吐者有腹痛而先瀉者莫不由中焦而作上焦主納而不出中焦主腐化水穀而生榮衛灌溉百骸下焦分別水穀主出而不納脾居中州胃爲水穀之海乳哺入胃脾能尅化然後水穀分膈上一寸傳變得宜豈有吐瀉之患凡小兒吐瀉皆因六氣未完六淫易侵兼以調護失宜乳食不節遂使脾胃虛弱清濁相干蘊作而然有先瀉而後吐者乃脾胃虛冷其候先瀉白水吐

亦不多口氣緩而神色慢額前有汗六脉沉濡此爲
冷也先吐而後瀉者乃脾胃有熱氣促唇紅吐來面
赤脉紅而數渴飲水漿此爲熱也冷熱之分要須詳
審 嘔吐瀉昏睡露睛者胃虛熱錢氏白朮散和中
散主之 吐瀉昏睡不露睛者胃實熱錢氏玉露散
河間益元散主之 薛手足指冷者脾氣虛寒也用
異功散加木香 傷風吐瀉者風木尅脾土也亦用
前藥 若飲熱乳而瀉黃者濕熱壅滯也用四苓散
如不瘳或反甚者元氣復傷也用白朮散 瀉而腹
中重墜者脾氣下陷也用補中益氣湯 若服尅滯

之劑而腹中窄狹者脾氣虛痞也用六君子湯
面黃瀉青脾虛而肝乘之也用六君柴胡升麻木香
若多噫瀉黃心脾氣虛也用六君炮薑升麻生
下半月旬日內吐者止宜調治其母恐嬰兒藏府脆
弱不勝藥餌故也

夏秋治裏

錢小兒初生三日內吐瀉壯熱不思乳食

大便乳食不消或白色是傷寒當下之併和胃下用
白餅子

癖

和胃用益黃散

脾

主之

兒生三日已上至十日吐瀉身溫涼不思乳食大便
青白色乳食不消此上實下虛也更有五藏兼見證

五月身
熱瀉黃
九分下
分補

肺腫露睛喘氣 心驚悸飲水 脾困倦饒睡
肝呵欠煩悶 腎不語畏明 當先視兒兼藏證先
瀉其所實者而補其虛如脾虛益黃散主之此二證
多病於秋夏也

五月夏至後吐瀉身壯熱者此熱也蓋小兒藏府十
分中九分熱也或因傷熱乳食不消瀉深黃色玉露
散主之

玉露散方 一名甘露散

寒水石 牛兩軟而微青
黑中有細紋者

生甘草 壹錢

石膏 半兩堅白而有墻壁手不可析者如無以
方解石代之堅白似石膏敲之段段皆方

是者

右同爲細末每服一字或五分一錢食後溫湯調

下

海藏云非腎熱相火大盛者不宜服此

一

六月大暑後吐瀉身大溫而似熱臟腑中六分熱四分冷也吐嘔乳食不消瀉黃白色似渴或食乳或不食乳食前少服益黃散食後多服玉露散 廣親宮五太尉病吐瀉不止米穀不化衆醫用溫藥一日而加喘吐不定錢氏曰當以涼藥治之所以然者謂傷熱在內也用石膏湯三服并服之衆醫皆言吐瀉多而米穀又不化當補脾何以用涼藥王信衆醫皆用

補脾丁香散三服錢醫後至曰不可服此三日後必
腹滿身熱飲水吐逆三日外果如所言所以然者謂
六月熱甚伏入腹中而令引飲熱傷脾胃卽大吐瀉
也醫又行溫藥使上焦亦熱故喘而引飲三日當甚
衆師不能治復召錢至見其熱證以白虎湯發熱三
服更以白餅子下之一日減藥二分二日三日又與
白虎湯各二服四日用石膏湯一服及旋合麥門冬
黃芩腦子牛黃天竺黃茯苓以硃砂爲衣服五丸竹
葉湯化下熱退而安

七月立秋後吐瀉身溫藏府中三分熱七分冷也不

能食乳多似睡悶亂哽氣長出氣睡露睛唇白多噦
欲大便不渴食前多服益黃散食後少服玉露散

廣親宮七太尉七歲病吐瀉是時七月其證全不食
而昏睡睡覺而悶亂哽氣乾嘔大便或有或無不渴
衆醫作驚治之疑睡故也錢曰先補脾後退熱與史
君子丸疳補脾石膏湯退熱次日又以水銀硫黃末
研和以薑水調下壹字錢曰凡吐瀉五月內九分下
而一分補八月內九分補而一分下此者是脾虛瀉
醫妄治之至於虛損下之卽死卽當補脾若以史君
子丸恐緩已又留溫胃益脾藥治之醫者李生曰何

月身
瀉青
分下
分補
後不
恩隨證
用藥

食而噦錢曰脾虛津少卽嘔逆曰何瀉青褐水曰腸
胃至虛冷極故也錢治而愈

八月秋分後吐瀉身冷無陽也不能食乳乾嘔噦瀉
青褐水當補脾益黃散主之不可下也

田凡小兒盛暑吐瀉邪熱在下焦則瀉在上焦則吐
亡津必渴用玉露散雖吐時時與啜之過三日必愈

如身熱脉大小便黃用五苓益元各半熱湯調溫
服之如身涼脉細小便青早晨益黃散午後玉露

散如過四五日困弱宜異功散和中散開胃丸

潔如有風而瀉用防風羌活謂此瀉兼肝病有熱

而瀉用黃連黃芩大黃

謂吐瀉兼心
病身熱也

有寒而瀉用

附子

謂吐瀉兼腎病身冷
或足脛寒而逆也

有濕而瀉用白朮茯苓

謂吐瀉兼本藏脾病
多睡體重昏倦也

有肺病而瀉用芍藥桂心定

喘麥冬人參甚者多檳榔大便不通加大黃

謂吐瀉
兼肺病

喘嗽也

更詳看病新舊新則止之久則有腸風之患

宜推陳致新法當宣風散

痘發熱

導過後用入藏君臣

藥調之宜益黃散

曾有小兒盛夏初秋遇夜乘風渴而飲水過餐生冷

果物攻激腸胃遂乃暴吐暴瀉傳作手足俱痺筋攣

而痛痛則神志不寧以驚證治之誤矣所謂筋遇寒

則引縮又以陽明養宗筋屬胃與大腸因內傷生冷
飲食外感風邪吐瀉交作胃氣因虛不能養其宗筋
亦致攣急此證口氣溫面色慘脉沉緩再以手按兩
膝腕下見筋縮而引於皮間是其候也治以理中湯
加附子半生半炮水薑熟煎空心溫服更詳虛實冷
熱爲治可也 有數歲小兒忽患吐瀉始自夏秋晝
近極熱之地解衣乘涼夜卧當風之所致蓋先感熱
後感冷陰陽相搏氣射中焦名爲霍亂活人書用香
薷散調治以其能分別水穀升降陰陽又曰熱多欲
飲水者五苓散寒多不飲水者理中丸詳此治法得

非欲平中焦乎

薛凡暑令吐瀉手足指熱作渴飲

冷者屬陽證宜清涼之劑手足指冷作渴飲熱者屬陰證宜溫補之劑凡病屬陰證誤用寒涼者死則手足青黯或徧身皆然

香薷飲

治夏秋臟腑冷熱不調飲食不節吐痢心

腹疼痛發熱煩悶

香薷

各二兩

白扁豆

厚朴

各壹兩半

生甘草

二兩

右剉每服二錢水一盞煎服

車前子散

治暑月霍亂吐瀉煩悶引飲不止小便

不利

白茯苓

豬苓

香薷

車前子

炒

人參

各等分

右爲末燈心湯調下

不換金正氣散

治脾胃不和寒熱往來臟腑虛熱

霍亂吐瀉

厚朴

薑制衣

藿香

陳皮

半夏

蒼朮

米泔浸

甘草

炙各等分

右每服二三錢薑棗水煎服

二順散

治中暑霍亂吐瀉煩悶燥渴小便赤澀便

血肚疼

豬苓

澤瀉

茯苓

白朮

甘草炙

官桂

乾薑

杏仁各壹兩去皮尖雙仁炒

右爲末每服半錢不拘時水調下或水煎服

六和湯 治心脾不和氣不升降霍亂吐瀉咳嗽胸

滿頭目疼痛嗜卧倦怠并陰陽不分冒暑伏熱煩

悶成痢中酒作渴心逆畏食

人參去蘆

縮砂仁

甘草炙

杏仁泡去皮尖

半夏湯煮透剉焙乾各壹兩

白扁豆炒熟剉去殼壹

斤碎切爛杵拌勻
釀經一宿焙乾

藿香

赤茯苓

去皮

木瓜

各貳兩

香薷

厚朴

去麤皮薑製慢
火焙乾各肆兩

右每服二錢水一盞薑一片棗一放煎七分無時

溫服或入鹽半字同煎

冬春治表

錢傷寒吐瀉身溫乍涼乍熱睡多氣麤大

身溫瀉
黃白咳
嗽先表
後瀉

便黃白色嘔吐乳食不消時咳嗽更有五藏兼見證

當煎入臍君臣藥先服大青膏後服益黃散如先曾

下或無下證慎不可下此乃脾肺受寒不能入脾也

潔古云身溫吐瀉咳嗽是風木入於脾母虛其子
亦弱法當煎煎瀉鄭荳蔻湯下大青膏後服益黃散

身熱渴
而渴
先止渴
後表

身涼濕
不可不渴
後

傷風吐瀉身熱多睡能食乳飲水不止吐痰大便秘黃

水此為胃虛熱渴吐瀉也當生胃中津液以止其渴

止後用發散藥止渴多服白朮散發散大青膏主之

潔古云吐瀉身熱而渴小便少者五苓散主之身熱而嘔者當服白朮散後煎檀榔木香湯下大青膏

傷風吐瀉身涼吐沫瀉青白色悶亂不渴噎氣長出

氣睡露睛此傷風荏苒輕怯因成吐瀉當補脾後發

散補脾益黃散發散大青膏主之此二證多病於春

冬也潔古云身涼吐瀉不渴者則知為寒煎附子桂枝湯下大青膏

大青膏

天麻末壹分

白附子末生壹錢半 蝎尾去毒生半錢

上為冬春治寒

刀十二

上六

表木
看利
後補

朱砂研壹字七

青黛壹錢研

麝香壹字七

烏蛇稍肉

酒浸焙乾取末半錢

天竺黃壹字七研

右同再研細生蜜和成膏每服半皂子大至一皂子大月中兒粳米大同牛黃膏溫薄荷水化一處服之五歲已上同甘露散服之

小兒傷於風冷病吐瀉醫謂脾虛以溫補之不已復以涼藥治之又不能散謂之本傷風醫者亂攻之因脾氣積虛內不能散外不能解至十餘日其證多睡露睛身溫風在脾胃故大便不聚而為瀉當去脾間風風退則痢止宣風散主之後用史君子丸補其胃

亦有諸吐痢久不瘥者則脾虛生風而成慢驚矣

海吐瀉過多脾胃虛乏欲生風候者四君子加白附子減半生薑煎服

守胃散 治陰陽不和吐瀉不止預防風證常調脾

胃進飲食

人參 去蘆

白朮

白茯苓 去皮

山藥 去黑皮

乾葛

扁豆 炒去殼

南星 剉碎瓦器盛東壁土同醋煮少時濾乾切片焙

甘草

藿香 去梗

防風 去蘆

天麻 各半

右剉每服二錢水一鍾薑二片冬瓜子仁五十粒