

集
驗
良
方

招

卷

外



癸卯年續補集驗拔萃良方目錄

內消疔瘡神九

附方一

治咽喉青芝散

八寶丹

猪胆膏

潤肌膏

治哮喘良方

吐血良方

附方一

治虛勞奇法

治膨脹良方

瘡疾奇效良方

三

治瘰癧靈膏

治三日瘰癧良方

痢疾奇效良方

三

萬應如意痢疾丸

萬應神糲

治鼻中息肉良方



治流火經驗方

治白濁良方

小兒至寶丹

砂雪丸 驚藥

小兒大小便不通

救苦靈膏

神效八厘散



癸卯年續補集驗拔萃良方

○○○內消疔瘡神丸

附方一

專治五色疔瘡初起或有小白頭一粒或痒或木憎寒發熱及疔毒走黃黑陷昏憤嘔惡等症

此丸兼治對口腦疽發背癰腫無名大毒屢試屢驗勝於飛龍奪命丹也

猪牙皂

切碎去筋炒研
淨末叁錢

真乾蟾酥

壹兩
切薄片

白明礬

生研極細
叁錢

當門麝香

去毛淨
叁分

右將蟾酥用滴花燒酒浸軟加入礬皂麝三末和勻搗



南京中醫藥大學圖書館藏

為丸如菜豆大，晾燥收貯。每服一丸，將葱白衣裹藥，以好酒送下。勢重者，每日服二次。此藥每次止可服一丸。危急之症，併體壯實者，服兩丸多服，恐致嘔吐。慎之慎之。

凡疔生唇口上，頭腫如斗，心神昏陷，急以蠅虫搗爛塗之，頃刻瘡口流黃水，腫消神清。再看大腿灣有紫筋起者，急用銀針刺破，手擠惡血，應效如神。

青芝散

治咽喉風火時邪急症，併雙單乳蛾等，用此極驗。

上川連

捌分

廣青黛

壹錢貳分

梅花冰片

貳分

白硼砂

壹錢貳分

西瓜霜

貳錢

橄欖核

叁錢



絲瓜葉

貳錢

右藥照法製度各研淨末稱準分兩和勻同研極細無聲為度磁瓶收貯臨用時約半匙許吹患上提出痰涎立愈慎勿吹多

製藥法

廣青黛

貳兩滾水沖之燉飯鍋上用絹篩濾去粗滓水飛四五次提取淨標澄清日乾去脚不用因有石灰性故也

橄欖核

用好橄欖去肉取生核搗研細末熟核無用

西瓜霜

要頭藤頂好老結西瓜一個藏好俟九十月間西風起日將瓜切下小盞挖去瓢子以馬牙硝四兩即頂大之瓜以硝四兩為則撒于瓜內仍將小盞蓋好以繩絡之懸于有風無雨處俟硝從皮泛出以鷄翎拂下收貯備用

絲瓜葉

採取經霜者去淨筋灸存性

〇〇八寶丹

專治癰疽發背搭手無名腫毒拔膿除腐生肌

長肉應

效如神

真珍珠

壹錢
豆腐內煮研

全蝎

貳個
漂淨灸

龍骨

壹錢五分
煨

蜈蚣

貳條
去頭足灸

馬腦

壹錢
煨

白蠟

壹錢

雄精

壹錢

海螵蛸

壹錢
漂淡

麝香

壹分

金毛狗脊

貳分
灸



梅片

壹分

製甘石

壹錢

紋銀末

貳分

劉研極細

製乳香

壹錢

象皮

壹錢五分
瓦上炙

製沒藥

壹錢

輕粉

貳分

右藥共研極細末收貯磁瓶備用

○○○猪胆膏

專治一切疔瘡癰腫惡毒應驗如神

松香

壹兩四錢
葱姜汁製

真廣膠

貳兩貳錢

明乳香

壹兩四錢
燈心炒去油

老姜汁

陸兩

集念及方

八寶丹

猪胆膏



南京中醫藥大學圖書館藏

明沒藥

壹兩四錢
燈心炒去油

大蔥汁

陸兩

猪苦胆

壹百個
取汁

右藥各研末和葱姜汁拌勻再加廣膠儘取

三日加猪

胆汁以竹簽挑破擠汁日晒夜露成膏

三伏時製

勿見雨鉄

忌火

隔水燉化

用元色

紬綾捫膏

布攤膏不用油紙

白疽忌用

○○潤肌膏

治白屑風手窩瘡鵞掌風血風瘡小兒胎癩瘡神效

真蔴油

四兩

當歸

五錢



奶酥油

貳兩

紫草

壹錢

將當歸紫草入香油內浸二日火燂焦去渣加黃蠟五錢溶化用布濾頃入碗內不時用柳枝攪冷成膏每用少許日擦二三次

〇〇〇治哮喘良方

程琢齋傳

製南星

五錢

桔梗

五錢

川貝母

五錢
去心

細辛

五錢

製半夏

五錢

杏仁

五錢
去皮尖

生麻黃

叁錢

生甘草

五錢

集驗良方

潤肌膏

哮喘

白蘇子

叁錢

生紫苑

叁錢

製藥之法先將蔴油陸兩煎藥枯去渣濾淨然後用白
蜜四兩姜汁四兩熬成膏滴水成珠為妙每服時須要
五更鷄鳴時分用老姜二片沖百沸湯調和膏大茶匙
一匙小匙二匙幼童時二料必能全愈年輕者三料必
愈中年難以除根到發時服之亦勉強楚忌酒生冷一
切發物不可食永遠不發矣

吐血良方

附方一

百草霜

貳兩

紅花蕊

壹兩四錢



中医药大学图书馆藏

全當歸

壹兩

川撫芎

捌錢

參山漆

壹兩

赤芍藥

壹兩

淨茜草

四錢

陳京墨

壹兩

右藥俱揀道地惟京墨最要頂高真陳久者妙參山漆
與百草霜亦要覓頂高者用之

修合之時選擇吉日齋戒一日用煉白蜜四兩搗和前
藥為丸每丸重五分候其陰乾固藏

切忌陰人着手服藥之人亦要淨素一日如婦女犯此
症者亦宜男童取藥送入口中服下無不效驗



醫書內云凡吐血之症服寒涼藥者百無一生吃童便

者百無一死真至言也 緣予年甫十一歲即患吐血

症賴先慈每日以 生鷄蛋二枚將銀針於蛋上打眼

五個皆左通透於右以 好童便浸一晝夜清晨煮食

連食一載無間病即全愈今年已七十有七矣 又

胞兄二十六歲時亦患吐血症先服 童便浸鷄蛋後

單服童便年餘雖不能除根但逢吐即服不致為害

後因童便不便改服 自己小便每逢吐血即服年屆

六旬終不為吐血所損 後來凡遇吐血之人勸其不

可服寒涼藥傳以吃 童便浸鷄蛋 或服童便
飲本身小便俱見不成損症此實身歷屢試而無疑故
特附刻之

治虛勞奇方

凡虛勞夜熱咳嗽夢遺肢瘦盜汗喘泄諸藥不應醫皆
覆絕惟有一法可以起死回生取紫河車拾個將老鴨
一隻每以水煮河車一個不必洗淨分作三日喂鴨食
之一月之中河車喂完將鴨烹調病者食之若單服河
車難辨有毒無毒及男女胎之物總之鴨吃有毒已化



其鴨更肥而大如月食三鴨其功比獨參湯更得其功
此法愈人已廣幸勿泛視

治噤脹良方

時聲三傳

用雄豬肚子一隻不用落水用青馬糞三個同大蒜頭
裝入塞滿為度將銀針縫好肚口用磁罐燒爛取出將
肚內蒜頭馬糞揀出用草紙揩淨肚內然後搗爛加淮
山藥粉和入再搗為丸曬乾收貯每服三錢切不可犯
鐵器 因友人患此症候數載百醫未愈得此良方照
前法製服之三料其病即除根



○○○瘧疾奇效良方

山陰倪涵初先生定

瘧之為害南人患之北人尤甚弱者患之強者尤甚雖
不致遽傷大命然不治則發無已時治之不得其道則
惡邪內伏正氣日虛久之遂不可藥予所定三方甚為
平易又無奇絕不入常山草果等劫藥且不必分陰瘧
陽瘧一日二日三日及非時瘧入無老幼病無久近用
此三方不必加減唯按次第服之無不應手而愈也

第一方

此方平胃消痰理氣除濕有疏導開先之功受病輕者

二劑即愈若三劑後病勢雖減尚未全愈再服第二方

紫厚朴

捌分
姜汁炒

茅朮

捌分
米泔水製

柴胡

捌分

茯苓

貳錢

姜半夏

壹錢

青皮

六分

威靈仙

壹錢

檳榔

六分

淡黃芩

捌分

陳皮

壹錢

炙甘草

捌分

右藥加生姜三片水酒各一碗煎八分饑時服頭痛加

白芷一錢

無汗加麻黃用時酌量分兩只用一劑後俱



北京中醫藥大學圖書館藏