

中風

張渙等方有中風方論今見小兒絕無患者而用藥多犯香燥恐血熱生風類中風證誤用之則爲害不淺故一切削而不載薛氏云中風之證西北方有之東南氣溫腠理疎泄人患之者皆類中風也况小兒元氣未充皮毛不固易虛易實外邪乘之則壯熱抽搐氣麤涎涌甚至昏愢口噤卽似中風悞以續命等湯投之多至不救大人且無真中况小兒乎凡有前證當辨其因若陽明經氣虛風邪所乘筋脉拘急者

爲外因足厥陰肝火熾盛筋脉偏急者爲內因脾肺
虛弱腠理不密外邪乘入或驚風過服金石之劑耗
損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼喎斜
者皆肝血不足肝火生風之類中風之類證也

角弓反張

錢肝有風甚則身反張強直不搐心不受熱當補腎
治肝補腎地黃丸治肝瀉青丸 丹溪云瘓比癰爲
虛宜帶補多是氣虛有火兼痰用人參竹瀝治之不
用兼風藥此論實發前人所未發湯氏雖云瘓候十
無一生蓋未嘗有此法施於人也 薛錢仲陽曰角
弓反張者由風邪客於太陽經也經曰風從上受足
太陽主周身之氣其脉起於目内眦而行於背肝屬
木主風所以風邪易侵也夫小兒肌膚未密外邪易

傷肝爲相火其怒易發若身反張強直發熱不搐者
風傷太陽也宜用人參羌活散小續命湯若因暴怒
而擊動其肝火者宜用瀉青丸若飲前劑其證益甚
者此邪氣已去而脾氣虧也宜用異功散加芎歸補
之若因肝經虛熱或因尅伐真氣虛熱生風者宜用
異功散地黃丸補之若因下而脾氣困憊腹肚膨脹
者此中氣損也宜用白朮散補之若氣血素弱或服
攻伐之劑而手尋衣領咬牙呵欠者肝經虛甚也急
用地黃丸以補之仍與肝藏參覽 一小兒忽腰背
又張目上視面青赤曰青屬肝主風赤屬心主火此

風火相搏用柴胡梔子散倍加釣藤鉤頓安而痰如
舊又用抱龍丸而愈 一小兒忽腰背反張服治驚
之藥後不時舉發面色黃白肢體甚倦余用五味異
功散十餘劑而愈後因驚兼飲食不節不時舉發隨
用前藥卽愈遂日以參朮末每服五七分炮薑大棗
煎湯調下服至二兩而不發已上二證元氣虛而病
氣實也若用攻邪之藥皆誤矣 一小兒素患前證
疾盛面色素白而兼青余謂肺氣不能平肝肝氣乘
脾脾氣虛而生痰耳先用抱龍丸二服以平肝隨用
六君子湯以補脾肺月餘而痊半載之後復發謂非

逐痰不能全愈遂用下劑痰涎甚多而咽喉如鋸聲
余曰乃脾不能攝涎也咽間鳴乃肺氣虛甚也遂用
人參伍錢炮薑參分水煎服而醒至第四劑後加棗
貳枚人參服數兩而愈後每發非獨參湯不應若執
常方鮮有不誤者

人參羌活散

方見驚搖

小續命湯

方見雜病中風

瀉青丸

方見肝藏

異功散

方見吐瀉

胡梔子散

方見積熱

抱龍丸

方見驚搖

子湯

方見吐瀉

反張鼻

入際三分灸三壯

大椎下節

間灸三壯

診湯氏曰身軟時醒者爲癰身強直反張如弓不時醒者爲瘳瘳候十無一生

角
五
不
引

公
利

五
之

搖頭

湯肝風搖頭諸方不載鄭都丞子患七年搖頭三年下血已服百餘方前後所服治搖頭者無非風藥止血者或作痢或作腸風百藥無効予旣視其病又知其詳亦不明其標本退而思之乃肝血液盛外有風熱乘之肝屬木盛而脾土爲木所尅脾與肺是子母俱爲肝所勝而血遂漬於大便故便血不止遂處一方但損肝祛風而益脾初亦一時之見只數服而愈十餘日後血止而下白膿遂得以安

清肝益胃丸

犀角屑

甘草各壹分

瓜蒌根

黃耆蜜炙

羌活

白芍藥各半兩

蛇退皮炙赤

釣藤鈎

麻黃去節各壹錢

防風伍兩

右爲末棗肉丸食後薄荷湯下只二服作効頭搖
卽止便血隨愈次間服胃風湯數日頓除沈舍人
子服之亦驗

薛經曰諸風掉眩皆屬肝木木得風則搖動乃肝經

火盛而生虛風也便血者風木搖動則土受凌虐而

不能統血也或食酸味過多以益其脾致令陰結經
曰結陰者便血一升再結二升三結三升又邪在五
藏則陰脉不和陰脉不和則血留之結陰之病陰氣
內結不得外行滲入腸間故便血也血亦有乳母恚
怒風熱熾盛或肝木傷脾使清氣不升或風邪侵入
大腸者治法若因風熱用柴胡清肝散若因怒火用
加味小柴胡湯若清氣不升脾氣下陷者用補中益
氣湯若風邪侵於大腸者用清肝益胃丸肝經血熱
妄行者用六味地黃丸脾土不能培肝木者用六君
柴胡釣藤鈎肝木勝脾土者用四君芍藥釣藤鈎結

陰者用平胃地榆湯

一小兒傷風咳嗽痰湧余謂

脾虛肺弱腠理不密風邪外乘用六君子湯加桔梗
桑皮杏仁而愈後飲食停滯作瀉腹脹仍用六君子
加山查厚朴而安又停食作瀉服消導之藥更加咳
嗽余謂當調補脾土不信自用發表尅滯前證益甚
更加搖頭余以天麻散倍加釣藤鉤及異功散而愈
一小兒項間結核面色痿黃肌體消瘦咬牙抽搐
頭搖目劄此肝木尅脾土也用六君子湯及九味蘆
薈丸頓愈

一小兒病後遇驚卽痰甚咬牙抽搐搖

頭作瀉恪服腦麝朱砂等藥以致慢驚而卒

海食療云蛇蛻皮主去風邪明目治小兒一百二十種驚癇寒熱痔蠱毒安胎熬用 治癇弄舌搖頭者宜用全蛻

余猶憶少時聞友人孫彭山云嘗見姻家一小兒患驚搖延專科治之諸證悉退而搖頭不止後一老醫至於常服藥中加入紫河車卽時愈按紫河車草名神農本草經名蚤休唐本名金線重樓錢氏方名白甘遂主治驚癇搖頭弄舌乃本經正文古人謂遵白字療病多効不虛也

抄

外

三

偏風口噤

薛小兒偏風者屬少陽厥陰肝膽二經證也噤者筋急由風木太甚而乘於脾以勝水濕則筋太燥然燥金主於收斂勁切故也又曰風之爲病善行而數變或左或右其因一也治須審而藥之若足陽明胃經氣虛風邪所乘其筋脉偏急者屬外因若足厥陰肝經風熱乘脾筋脉偏急者屬內因若脾肺虛弱腠理不密外邪所乘或服金石之劑耗損肝血或吐瀉後內亡津液不能養肝致口眼歪斜或半身不遂諸證

皆屬肝血不足肝火生風宜滋腎水養肝血壯脾土
治法脾胃虛而動風者異功散加柴胡釣藤鈎脾肺
虛而外邪所乘者用釣藤飲肝火血燥者用六味地
黃丸津液不足者用白朮散若兼目緊上視寒熱往
來小便淋漓面色青潔兩脇脹痛之類皆肝經之本
病也或唇口歪斜腹痛少食目胞浮腫面色青黃肢
體倦怠之類皆肝木乘脾之證也當審五藏相勝而
主之設執其見證槩投風藥反成壞證者有矣一
小兒口眼喎斜面色或青或赤此肝心風火乘脾也
朝用柴胡清肝散夕用異功散加釣藤鈎而愈其時

有患前證服祛風導痰之藥者皆不能起一小兒
痢後患前證發搐面色痿黃肢體倦怠此元氣虛尅
伐多矣余用補中益氣湯加釣藤鈎子服而漸愈後
因乳母七情飲食失宜或兒乳食過多前證仍作服
補中益氣湯五味異功散而愈

錢全蝎散 治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正
手足偏廢不舉

全蝎 去毒炒

僵蠶 直者炒

川芎

黃芩 去心

甘草

桂枝

赤芍藥

麻黃 去節各壹兩

天麻 陸錢