

御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣

崩漏門

崩漏總括

淋瀝不斷名爲漏忽然大下謂之崩紫黑塊痛多
屬熱日久行多損任衝脾虛不攝中氣陷暴怒傷
肝血妄行臨證審因須細辨虛補瘀消熱用清

註

婦人經行之後淋瀝不止名曰經漏經血忽
然大下不止名爲經崩若其色紫黑成塊腹



御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣目錄

崩漏門

崩漏總括

崩漏證治

荊芩四物湯

加味四物湯

膠艾四物湯

琥珀散



南京中医药大学图书馆版权所有

八珍湯

十全大補湯

益氣養榮湯

補中益氣湯

益胃升陽湯

調經升陽除濕湯

失笑散

地榆苦酒煎

帶下門



北京中醫藥大學圖書館版權所有

五色帶下總括

帶下證治

吳茱萸湯

補中益氣湯

六君子湯

六味地黃湯

歸脾湯

四物湯

清白散



北京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

四君子湯

導水丸

萬安丸

威喜丸

固精丸

加味四物湯

逍遙散

癥瘕積痞疝諸證門

癥瘕積聚痞瘀血血蠱總括



南京中醫藥大學圖書館版權所有

癥瘕證治

大七氣湯

食癥證治

烏藥散

血癥證治

血竭散

痞證治

助氣丸

積聚證治



南京中醫藥大學圖書館版權所

御製醫宗金鑑卷四十一

開鬱正元散

瘀血血蠱證治

桃奴散

失笑散

玉燭散

疔癰疔證總括

疔癰證治

葱白散

疔病證治



當歸散

治諸積大法

嗣育門

胎孕之原

男女完實

種子時候

分男女論

雙胎品胎

衄見有子



行身...金
胎男女論

辨別孕病

分經養胎

受孕分房靜養

安胎母子二法

胎前用藥三禁

安胎審宜調治



南京中醫藥大學圖書館版權所有

御纂醫宗金鑑卷四十五

編輯婦科心法要訣

崩漏門

崩漏總括

淋瀝不斷名爲漏忽然大下謂之崩紫黑塊痛多
屬熱日久行多損任衝脾虛不攝中氣陷暴怒傷
肝血妄行臨證審因須細辨虛補瘀消熱用清

註

婦人經行之後淋瀝不止名曰經漏經血忽
然大下不止名爲經崩若其色紫黑成塊腹



脇脹痛者屬熱瘀若日久不止及去血過多而無塊痛者多係損傷任衝二經所致更憂思傷脾脾虛不能攝血者有中氣下陷不能固血者有暴怒傷肝肝不藏血而血妄行者臨證之時須詳審其因而細細辨之虛者補之瘀者消之熱者清之治之得法自無不愈

崩漏證治

荆芩四物湯

崩漏血多物膠艾熱多知柏少芩荆漏瀉香附桃
紅破崩初脹痛琥珀攻日久氣血衝任損八珍
補養榮寧思慮傷脾歸脾治傷肝逍遙香附青

註

崩血漏血去血過多者宜用膠艾四物湯補
之如屬熱多者宜用知藥四物湯清之熱少
者宜用荆芩四物湯和之若漏血瀉少此屬
血滯宜用四物湯加香附桃仁紅花破之若
崩血初起脹痛此屬瘀凝宜用琥珀散攻之
崩漏日久氣血已虧衝任傷損者宜用八珍



湯十全大補湯人參養榮湯量補其損傷若
因思慮傷脾者宜用歸脾湯補之恚怒傷肝
者宜用逍遙散加炒香附青皮平之

膠艾四物湯

四物湯

琥珀散

八珍湯

十全大補湯

人參養榮湯



歸脾湯

逍遙散 方俱見前調經彙方內

補中益氣湯

益胃升陽湯

氣陷補中益氣舉保元升柴歸木陳益胃升陽加
苓麴腹痛加芍嗽減參

註

崩漏日久脾傷食少中氣下陷不能載血者
宜用補中益氣湯益胃升陽湯升舉之補中
益氣湯卽人參黃耆甘草保元湯加升麻柴



胡當歸白朮陳皮也益胃升陽湯卽補中益氣湯加黃芩神麴也若腹痛者宜加白芍藥有熱者用黃芩無熱者用肉桂調之咳嗽者肺熱也減人參

調經升陽除濕湯

夾水水瀉不甚弱調經升陽除濕湯者草升柴歸蒼朮羌獨藁本蔓荊防

註

崩漏下血夾水或日水瀉一二次形氣不甚弱者宜用調經升陽除濕湯其方卽黃耆甘



草升麻柴胡當歸蒼朮羌活獨活藁本蔓荊
子防風也以風藥先勝其濕若形氣虛弱者
則當加人參陳皮合補中益氣湯補中
可也

失笑散

地榆苦酒煎

殺血心痛失笑散蒲黃五靈脂定疼崩血不已防
滑脫地榆苦酒煎止崩

註
崩血心腹痛甚者名曰殺血心痛乃血滯不

散宜用失笑散其方卽蒲黃五靈脂也先定其痛痛止然後隨證治之若崩血補之仍不止者當防其滑脫宜用地榆一兩醋煎一宿次早溫服立止止後隨證治之名地榆

苦酒煎

崩漏門彙方

補中益氣湯

黃耆

人參

白朮

甘草 各一錢

炙

