

本草蒙筌



本草蒙筌卷三

新安祁門月朋陳嘉謨廷采纂輯

草部下

一百一

附子

味辛甘氣溫大熱浮也陽中之陽也有大毒

係烏頭傍出故附子僉名皮黑體圓底平山芋狀

相彷彿畏人參黃耆甘草併黑豆烏韭防風惡蜈

蚣使地膽種時川蜀

蜀人春每種時

冬月收採者汁全頂

擇正圓一兩一枚者力大製宗陶氏槌法以刀去

淨皮臍先將薑汁鹽水各半甌入砂鍋緊煮七沸



次用甘草黃連各半兩。加童便緩煮一時。撈貯罐中。埋伏地內。晝夜週畢。囑音忽圖音輪曝乾。藏須密封。

用旋薄剉。仍文火復炒。庶劣性盡除。氣因浮中有沉。功專走而不守。凡和羣藥。可使通行。諸經以爲引導。佐使之劑也。除四肢厥逆。去五臟沉寒。噤閉牙關。末納鵝管吹入。紅突丁毒。末調釀醋塗消口。瘡久不差。醋麪和末貼脚底。脚氣暴發腫。醋汁攪末敷患間。漏瘡剉片如錢。封口加艾可灸。煖脚膝健步。堅筋骨強陰。佐八味丸中。壯元陽益腎。

非附子不

能補下焦陽虛故八味丸加桂附乃補腎經之陽
六味丸去桂附蓋補腎經陰也丹溪謂加為少陰
向導恐君木附湯內散寒溼溫脾陰經直中真寒
非是

薑附湯煎可禦此須生用不在製拘助甘緩參者

成功健潤滯地黃建効內傷熱甚速入勿疑

此藥治外

感證非得身表涼四肢厥者不可僭用經云壯火
食氣故也治內傷證縱身表熱甚而氣虛脉細者
正宜速入經云溫能除大熱是也俗醫不知誤為補劑日相習用

寧不殺人孕婦忌煎墮胎甚速○立春生者乃謂

烏頭

因有腦類烏烏頭顱竟假名為醫家呼喚氣

味製度俱與附同本經云春採為烏頭冬採為附

子又云附子頂圓正烏頭頂歪斜宗此別之庶弗

差謬忌豉汁惡藜蘆反半夏括蕒暨貝母及斂

白斂遠志為使諸經亦行理風痺卻風痰散寒邪除

寒痛破滯氣積聚去心下痞堅亦善墮胎孕婦切

忌煎膏名射射須識數射箭禽獸即亡倘誤中人

甘草急嚼藍青萍草亦可解之○烏喙音兩岐頂

兩岐狀如牛角喙者乃烏之口因類亦假為名一

應俱同烏頭惟使別用莽草主風溼陰囊瘙癢止

寒熱歷節掣疼亦墮妊娠更消癰腫○天雄亦係

一種其體略細而長氣味相同製度弗異惡腐婢
使亦遠志忌豉汁制須乾薑專補上焦陽虛善治
一切風氣毆寒溼痺緩急拘攣卻頭回風往來疼
痛助武勇力作不倦消結積身輕健行調血脈益
精墮胎孕通竅○**側子**狀如棗核又從附子傍生
畏惡無差但宜生用理脚氣驗散風癰良掃鼠癭
惡瘡切冷氣溼痺如前墮孕女科當知○毗穗亦
一名**木鼈子**者是令人喪目藥中忌之

謨按附子烏頭烏喙天雄側子射罔木鼈子七

名實出一種。但治各有不同。今尊會編附其總論。天雄長而尖者。其氣親上。故曰非天雄不能補上焦陽虛。附子圓而矮者。其氣親下。故曰非附子不能補下焦陽虛。烏頭原生苗腦。形如烏鳥之頭。得母之氣。守而不移。居乎中者也。側子散生傍側。體無定在。其氣輕揚。宜其發四肢。充皮毛。爲治風癰之神妙也。烏喙兩歧相合。形如鳥嘴。其氣鋒銳。宜其通經絡。利關節。尋蹊達徑。而直抵病所也。煎爲射罔。禽獸中之卽死。非氣

之鋒銳捷利者能如是乎。又有所謂木鼈子。雄喙鳥附側中有毗穗者。其形摧殘。其氣消索。譬如疲癯殘疾之人。百無一能。徒爲世累。且又令人喪目。宜其不入藥用也。

三
百
一
天
南
星

味苦辛。氣平。可升。可降。陰中陽也。有毒。下澤極多。在處俱有。苗類荷梗直起。高僅尺餘。葉如蕩葉。杪生。兩枝相抱。花若蛇頭。黃色。子結作總鮮紅。根比芋猶圓。肌細膩且白。本經載虎掌草卽此。後人以天南星改稱。亦與鬼蒟蒻相伴。每逢冬月。

間誤採殊不知蒟蒻莖斑花紫根極大肌麓南星

莖青花黃根略小肌細泡之易裂得此纔真製須

多泡生姜湯七八次佳或研填入牯牛膽臘月黑牯牛膽一箇用南

星研末取汁風乾過年成塊剉碎復炒拯疴方書

謂之牛膽南星卽此是也倉卒不能得此依前薑湯泡或火炮並殺毒堪

用但性猶烈也乃上行治肺經本藥欲下行資黃蘗引之

畏生乾薑及黑附子散跌撲卽凝瘀血墜中風不

語稠痰利胃膈下氣墮胎破堅積誅癰消腫水摩

搗蛇蟲咬毒醋調貼破腦傷風瘤突額顱麝加敷

消全

愈。先用小針十數枚作一把，痛上微刺，通竅，用新南星醋摩加麝少許，日敷二次，任如椀大。

三

百十

守田

味辛微苦，氣平，生寒，熟溫，沉而降，陰中陽。

也有毒，山谷川澤處處有之，苗起一莖，莖端三葉。

根名半夏，八月採收，反烏頭，惡皂莢，畏雄黃，生薑。

乾薑、秦皮、龜甲、忌羊肉、羊血、海藻、飴糖，使宜射干。

柴胡經入足膽脾胃，久藏入藥，同橘皮謂二陳，生。

嚼戟喉。生用則麻，戟人喉嚨。宜沸湯製七次，仍加薑制，纔可。

投瓶，若研末，攪少枯礬。每泡過半夏四兩，入枯礬一兩共研。拌薑汁。

捏作小餅。楮葉包裹。風際陰乾。此又名半夏麴也。
片則力峻。麴則力柔。總主諸痰。驗證佐助火痰黑。
老痰膠。加芩連。枯樓海粉。寒痰清。溼痰白。入薑附。
蒼朮陳皮。風痰卒中昏迷。皂角天南星和。痰核延。
生腫突。竹瀝白芥子攪。劫痰厥頭疼。止痰飲脇痛。
散逆氣除嘔惡。開結氣發音聲。脾瀉兼毆。心汗且。
斂。蓋脾惡溼。半夏專能燥溼。勝水故爾。孕婦忌用。
恐墮胎元。如不得已用之。復加薑汁炒過。消渴及。
諸血證。尤禁莫加。因燥反助火邪。真陰愈被熬害。

津枯血耗。危殆日侵。不得不預防也。**生平夏消腫**

腫成顆者。摩水敷。蠅子螫人。塗上卽愈。婦人產後。暈絕爲丸。塞兩鼻中。能頃刻回甦。此扁鵲捷法。

謨按內經云。腎主五液。化爲五溼。自入爲唾。入

肝爲淚。入心爲汗。入脾爲痰。入肺爲涕。丹溪又

云。有痰曰嗽。無痰曰欬。是知痰者。因嗽而動脾

之溼也。半夏惟能入脾。以瀉痰之標。不能入腎

以瀉痰之本。然欬無形。痰有形。無形則潤。有形

則燥。所以爲流溼潤燥之劑也。又小柴胡湯中。

加之以治傷寒寒熱半助柴胡以主惡寒半助黃芩而能去熱及往來寒熱皆用之有各半之意故因而名曰半夏云本經別以守田目之者蓋緣夏半前後人多耘時在田斯又指名而生意也

第二卷貝母欬後謨按宜叅看

京三稜

味苦辛氣平陰中之陽無毒生荆襄陂澤

近霜降採根狀若鯽魚黃白體重者美麵包火炮加醋復炒過靈色白屬在氣邊專破血中之氣故



消癥瘕血塊證兼毆積聚氣滯疼虛者忌煎恐損
真氣○仍有三種亦附其名
○**三棱**形如鷄爪屈曲根上生根
○又**三棱**色黃體重堅硬如石總消積氣主治
相同。

味苦辛氣溫無毒多產廣南諸州或生江

浙田野子如乾椹葉似蓑荷莖錢大略高根類薑
成塊茂生根底相對似卵大小不常九月採收依
前炮製色黑屬在血分氣中之血專毆破瘀癖止

心疼通月經消瘀血治霍亂積聚理惡症邪傷人
氣藥仍發諸香在女科真爲要劑凡求速効摩酒
單嘗

味苦氣溫無毒陰溼山谷生長最多根著

樹石上有毛葉附兩小葉相對

每一大葉邊附小葉槎牙兩兩相對

不結花實至冬乾黃入藥採根刮去毛用補骨節

傷碎療風血積疼破血有功止血亦効本名曰胡

孫薑唐明皇以其主折傷甚驗故易名骨碎補也

味辛苦氣寒陰中微陽無毒多生漢中巴郡



花開品色異常富貴來先賢贊揚賞玩爲當世重。凡資治療。惟採根皮。家園花千層。根氣發奪無。力。山谷花單瓣。根性完。具有神。專利多。兼補。最入劑之際。不可不知。今市多取枝梗皮代充。或採五加皮雜賣。乖謬殊甚。選擇宜精。經入足腎少陰。及手厥陰包絡。忌胡蒜。畏菟絲。涼骨蒸不遺。止吐衄必用。除癥堅瘀血。留舍於腸胃中。散冷熱血氣。攻作於生產後。仍主神志不足。更調經水欠勻。治風癰。定搐止驚。療癰腫。排膿住痛。

本草蒙生 卷三
謨按牝牡乃天地稱牡則爲羣花首花爲陰成
實葉爲陽發生丹係赤色象離陰中之火能瀉
故丹溪云地骨皮治有汗骨蒸牡丹皮治無汗
骨蒸蓋有見於此爾本經又云主神志不足神
不足手少陰也志不足足少陰也張仲景八味
丸用者又非主於斯乎

大小薊

味甘苦氣溫一云氣涼無毒雖係兩種氣

味不殊隨處田野俱生北平

今改順天

出者力勝益

門以薊取名則可徵矣凡資治病五月採根