

陳修園醫書四十種

閱者注意

本書從前出版祇有四十種現復重加搜輯增加十種其目列下

本經便讀

溫熱贅言

本草經百種錄註解

婦科雜症

醫壘元戎

名醫別錄

平辨脈法歌括

局方發揮

醫法心傳

增補食物祕書

合計共五十種較前更形完備以供諸君子之參考幸垂鑒焉



醫
首
壘
元
戎



醫壘元戎

傷寒不可汗不可下不可吐諸證

大發春宜吐夏宜汗秋宜下凡用藥汗及吐下渴劑皆中病即止

若少陽病脈微不可發汗亡陽故也宜附子湯若陽已虛尺中弱濇者復不可下

之宜小柴胡湯若動氣在左在右在上在下並不可發汗宜柴胡桂枝湯若少

陰病脈細沈數病在裏不可發汗宜當歸四逆湯若少陽病不可發汗宜小柴胡

湯若咽中閉塞咽喉乾燥亡血衄家淋家瘡家不可發汗已上六證並宜小柴胡

湯若下利清穀不可發汗宜理中湯四逆湯之類若四逆厥及虛家皆不可吐

厥者宜當歸四逆湯虛宜附子湯有熱人宜黃耆人參建中湯若少陰膈上

寒乾嘔不可吐宜小半夏加橘皮湯溫中丸若咽中有動氣不可下咽中閉塞不

可下宜烏扇湯若外實者不可下諸四逆厥者不可下虛家亦然厥宜當歸四逆

湯虛者宜附子湯有熱宜黃耆人參建中湯本虛攻其熱必噦宜小柴胡湯

若脈浮而緊法當身疼痛宜以汗解假令尺中遲者不可發汗榮氣不足血少故

也宜小柴胡湯若脈濡而緊濡則衛氣弱緊則榮中寒陽微衛中風發熱而惡寒

榮緊衛氣冷微嘔心內煩此不可汗宜小柴胡湯若濡而弱不可發汗宜小柴胡

湯若浮而大浮為氣實大而血虛小便當赤而難胞中當虛今反小便利而大汗

出。法應衛家微。可與小建中湯。若反更實津液四射。榮竭血盡。乾煩而不得眠。此不可下。宜與小柴胡湯。若脈浮大應發汗。宜柴胡桂枝湯。若脈浮而緊者。不可下。而反下之。爲大逆。宜桂枝麻黃各半湯。若脈數不可下。宜柴胡桂枝湯。若下之。必煩利不止。宜葛根黃芩黃連湯。若脈濇弱浮數不可下。宜小柴胡湯。若濡弱微濇。微則陽氣不足。中風汗出。而反躁煩。濇則無血。厥而且寒。不可下。宜桂枝甘草牡蠣龍骨湯。若結胸脈浮大不可下。下之卽死。宜小陷胸湯。若陽病多者。熱下之則硬。宜小柴胡湯。若太陽發汗不徹。轉屬陽明。微汗出不惡寒。若太陽證不罷。不可下。下之爲逆。宜桂枝麻黃湯。若太陽病有外證未解。不可下。下之爲逆。宜桂枝麻黃湯。若病發於陽而反下之。熱入因作結胸。病發於陰而反下之。因作痞。結胸則有陷胸湯丸三。痞則有瀉心湯五。若太陽與陽明合病。喘而胸滿。不可下。宜麻黃杏子甘草石膏湯。若太陽與少陽合病。心下硬。頸項強而眩者。不可下。宜小柴胡湯。若病欲吐者。不可下。宜小半夏加橘皮湯。太陰腹痛。吐食自利。腹痛下之。必胸下結硬。厥陰病。喝氣正衝心。心中熱。饑不欲食。食則吐。虯下之則利不止。若少陰病。飲食入口則吐。心中溫溫欲吐。腹痛能吐。始得交。手足寒。脈弦遲者。此胸中寒實。不可下也。宜溫中湯生薑汁半夏湯。若無陽陰強。大便硬者。下之必清穀腹滿。宜用蜜煎導法。若傷寒五六日。不結胸。腹濡。脈虛復厥者。不可

下。此亡血也。宜當歸四逆湯。下之則死。宜四逆加人參湯。若藏結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不可攻也。謂下也。宜用小柴胡湯。若傷寒嘔多。雖有陽明證。不可攻之。宜小柴胡湯。若陽明病身面色赤。攻之必發熱。宜調胃承氣湯。若色黃者。小便不利也。宜五苓散。若陽明病。心下硬滿者。不可攻之。宜生薑瀉心湯。半夏瀉心湯。攻之利不止者死。宜四逆湯。不可汗下吐三法。利害非輕。前人多列經後。大抵醫之失。只在先藥。藥之錯則變生。若汗下不差。則永無亡陽生黃畜血結胸痞氣及下痢洞泄脇熱痢瘕急勞等證生矣。其如此。故錄大禁忌於前。使醫者當疾之初不犯也。

太陽證 桂枝二方在後保命集內

傷寒六經所感形證。合用汗下吐和解等湯丸。仲景活人。雲岐子保命集載之詳者。此不復重錄。數書中所無者。并諸方對證加減。今載於後。

金匱黃耆建中湯 治虛勞裏急諸不足。宜此方主之。

黃耆

桂枝

生薑 切各二兩

芍藥 六兩

炙甘草 二兩

膠飴 一升

大棗 十二個

右七味。吹咀。以水七升。先煮六味。取三升。去滓。內膠飴令消。溫服一升。日三。若嘔者。加桂薑。若腹滿者。去棗。加茯苓四兩。若肺虛損

不足。痞氣。加半夏五兩。

易簡建中加減法

若婦人血疼。界子心腹疔痛。并四肢拘急疼痛甚者。加遠志半兩。若或吐或瀉。狀如霍亂。及胃涉濕寒。賊風入腹。拘急切痛。加附子七錢半。若疝氣發作。當於附子建中湯煎時。加蜜一匙頭許。若男子婦人諸虛不足。小腹急痛。脇肋脹。下虛滿。胸中煩悸。面色痿黃。脣口乾燥。少力身重短氣。腰背強痛。骨肉酸疼。行動喘乏。不能飲食。或因勞傷過度。或因病後不復。加黃耆一兩半。若婦人一切血氣虛損。及產後勞傷。虛羸不足。腹中疔痛。呼吸少氣。小腹拘急。痛引腰背。時自汗出。不思飲食。加當歸一兩。名當歸建中湯。產後半月。每日三服。令人精壯。

大建中湯 治內虛裏急。少氣。手足厥逆。少腹攣急。或腹滿弦急。不能食。起即微汗出。陰縮。或腹中寒痛。不堪勞苦。脣口舌乾。精自出。或手足作寒作熱。而煩苦酸痛。不能當立此補中益氣。

桂心 三錢

芍藥

黃耆 錢各三

甘草 炙

當歸

人參 錢各一

生薑 半兩

附子 五分

半夏 二錢

棗 二枚

右咬咀水五盞。煮至三盞。去滓分三服。

易簡杏子湯 治咳嗽不問外感風寒。內傷生冷。及虛勞咯血痰飲停積。悉皆治療。

人參

半夏

茯苓

細辛 減半

甘草 炙

官桂 減半

乾薑 減半

芍藥

五味子

右咬咀每服四錢水

一盞半杏仁去皮尖剉五枚薑五片糞至六分去滓服

若感冒得之加麻黃等分

若脾胃素實者用鶯粟殼去筋膜碎剉以醋淹炒等分加之每服加烏梅二枚糞

服其效尤驗嘔逆惡心者不可用此若久年欬嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃

添芍藥如麻黃之數乾薑五味子各增一半名小青龍湯

大補十全散

參耆朮茯苓

芍地桂歸川

三五錢秤用

生薑棗水煎

婦人虛弱用

名美

號十全

治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨

瘠拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘欬中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治

之

肉桂

芍藥

甘草

黃耆

當歸

川芎

人參

白朮

茯苓

熟地黃 各等分

右爲麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時候溫服桂芍藥

甘草小建中湯也黃耆與此三物卽黃耆建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯

也川芎芍藥當歸四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱天得地之成數故名曰十全

散



易簡胃風湯 治大人小兒風冷乘虛入客腸胃。水穀不化。泄瀉注下。及腸胃濕毒。下如荳汁。或下瘀血。日夜無度。

人參

茯苓

川芎

官桂

當歸

芍藥

白朮各等分

右咬咀。每服二錢。水一大盞。粟米百餘粒。同煎七分。

去滓。稍熱服。空心。小兒量力減之。若加熟地黃。黃耆。甘草等分。足爲十味。名曰補

湯。若虛勞嗽。加五味子。若有痰。加半夏。若發熱。加柴胡。若有汗。加牡蠣。

若虛寒。加附子。若寒甚。加乾薑。皆依本方等分。若骨蒸發熱。飲食自若者。用十

補湯。加柴胡二兩服之。若氣短。加人參。若小便不利。加茯苓。若脈弦濇。加川

芎。若惡寒。加官桂。若脈濇。加當歸。若腹痛。加白芍藥。若胃熱濕盛。加白朮。

若血瘀色紫者。陳血也。加熟地黃。若血鮮色紅者。新血也。加生地黃。若寒熱

者。加柴胡。若肌熱者。加地骨皮。若脈洪實痛甚者。加酒浸大黃。潔古云。防風

爲上使。黃連爲中使。地榆爲下使。

千里漿一名水葫蘆

木瓜

紫蘇葉

官桂各半兩

烏梅肉

赤茯苓各一兩

右爲細末。煉蜜爲丸。如彈子大。噉化一丸。嚥津。

又方

百藥煎

烏梅肉

紫蘇葉

人參

甘草

麥門冬

右各等分爲細末。煉蜜丸噙化。

荔芩湯

烏梅肉

甘草 各三兩

百藥煎 一兩

白芷 半兩

白檀 三錢

右爲細末湯點。

蜜酒

好蜜 二斤

水一碗

細麴 一斤

好乾酵 三兩

右先熬蜜水去花沫。

令絕。冷下麴酵。每日三攪。三日熟。

陽明證

葛根湯三方升麻湯大小青龍等湯在後保命集內承氣湯三方亦在

易老門冬飲子

治老弱虛人大喝

人參

枸杞

白茯苓

甘草 各二錢

五味子

麥門冬 去心各半兩

右爲麴末。生薑水煎。

麥門冬飲

治勞復欲死。人氣欲絕者。用之有效。

麥門冬 一兩

甘草 二兩

粳米 半合

右門冬去心爲細末。水二盞。煎粳米

令熟。去米。約湯一小盞半。入藥五錢。匕棗二枚去核。新竹葉十五片。同煎至一大盞

去滓。大溫服。不能服者。綿滴口中。後人治小兒不能灌注者。宜用此綿滴法。此方



不用石膏。以其三焦無大熱也。兼自欲死之人。陽氣欲絕者。故不用石膏。若加人參大妙。

海藏五飲湯。一留飲心下。二澀飲脇下。三痰飲胃中。四溢飲膈上。五流飲腸間。凡此五飲。酒後傷寒。飲冷過多。故有此疾。

旋覆花

人參

陳皮

枳實

白朮

茯苓

厚朴

半夏

澤瀉

猪苓

前胡

桂心

芍藥

甘草

右等分。剉每兩分四。

服水二盞。生薑十斤。同煎至七分。取清溫飲。無時。忌食肉。生冷。滋味等物。因酒有飲。加葛根。花縮砂仁。

海藏已寒丸。此丸不僭上陽。生於下。治陰證。服四逆輩。胸中發燥而渴者。或數日大

便秘。小便澀赤。服此丸上不躁。大小便自利。

肉桂

茯苓

兩各半

良薑

烏頭

七錢各

附子

炮

乾薑

炮

芍藥

茴香

炒一兩各

右等分。爲細末。糊爲丸。桐子大。溫酒

下。空腹食前。五七十丸。八九十丸亦得。酒醋爲糊俱可。

婦人血風證。因大脫血。崩漏或前後。血因而枯燥。其熱不除。循衣撮空。摸牀。閉目不省。擲手揚視。搖動不寧。錯語失神。脈弦浮而虛。內燥熱之極也。氣竈鼻乾而不潤。上下



通燥。此為難治。宜生地黃黃連湯主之。

川芎

生地黃

當歸錢各七

赤芍藥

梔子

黃連

黃芩錢各三

防風三兩

右為釐末。每服三錢。水二盞。煎至七

分。取清飲。無時徐徐與之。

若脈實者。加大黃下之。大承氣湯。氣藥也。自外而之

內者用之。

生地黃黃連湯。血藥也。自內而之外者用之。氣血合病。循衣撮空。證同

自氣而之血。血而復之氣。大承氣湯下之。自血而之氣。氣而復之血。地黃黃連湯

主之也。二大者俱便

增損理中丸 王朝奉云。大小陷胸湯丸。不愈者宜與之。

人參

白朮

枳實炮二十

牡蠣各二兩

甘草炒三兩

乾薑兩各一

枳實炮二十

黃芩去兩枯

右為細末。煉蜜為丸。如彈子大。湯盞

煎服。不歇。復與之。不過五六。胸中豁然矣。用藥神速。未嘗見也。渴者加枳實根。

汗者加牡蠣。

少陽證

大柴胡五分。在後。保命集附子。

易簡參蘇飲。治感冒發熱頭痛。與痰飲凝積。發而為熱。並宜服之。若感冒發熱。亦如

服養胃湯法。連進數服。微汗即愈。大治中脘痞悶。嘔逆惡心。開胃進食。小兒室女。尤

宜服之。



前胡

人參

紫蘇

乾葛

半夏

茯苓

加三分

枳殼

陳皮

甘草

桔梗

木香

各半

右

咬咀

每服

四錢

水一

盞半

生薑

七片

棗一

枚

煎至

六分

去滓

不以

時候。素有痰飲者。俟退熱。以二陳湯。或六君子湯。間服。若男子。婦人。虛勞。發熱。或吐衄。下血。過多。致虛熱者。用此藥三兩。加四物湯二兩。合和。名茯苓補心湯。

活人治婦人傷寒妊娠服藥例

若發熱惡寒者。不離桂枝芍藥。

若往來寒熱者。不離柴胡前胡。

若大渴者。不離

知母石膏五味子麥門冬。

若大便泄者。不離桂附白朮乾薑。

若大便燥結者。不

離大黃黃芩。

若經水適來。適去。斷者。不離小柴胡。

若安胎者。不離人參附膠白

朮黃芩。

若發汗者。不離葱豉生薑麻黃旋覆。

若頭痛者。不離前胡石膏梔子。

若傷暑頭痛者。不離柴胡石膏甘草。

若滿悶者。不離枳實陳皮。

若腦氣不安者。

不離黃芩麥門冬人參。

若癰發黑者。不離黃芩梔子升麻。

萬病紫苑丸。

療臍腹久患疝癰。如碗大。及諸黃病。每地氣起時。上氣衝心。遶臍絞痛。

一切蟲咬。十種水病。十種蟲病。反胃吐食。嘔逆惡心。飲食不消。天行時病。婦人多年

月露不通。或腹如懷孕多血。天陰即發。又治十二種風頑痹。不知年歲。晝夜不安。夢

與鬼交。頭白多屑。或哭或笑。如鬼魅所着。腹中生瘡腹痛。服之皆效。

紫苑上去苗

桔梗去蘆

黃連去錢鬚

川烏去三錢皮臍

煉蜜丸如桐子大。每服三丸。漸加至五七丸。生薑湯送下。食後臨蓐。初有孕者不宜服。其引於後。

痔漏腸風酒下。赤白痢譚子湯下。膿血痢米飲湯下。墮傷血悶。四肢不收酒

下。蛔蟲咬心。檳榔湯下。氣噎憂噎。荷葉湯下。打撲傷損酒下。中毒毒灰甘

草湯下。一切風升麻湯下。寸白蟲檳榔湯下。霍亂乾薑湯下。欬嗽杏仁湯

下。腰腎痛荳淋湯下。陰毒傷寒溫酒下。吐逆生薑湯下。食飲氣塊麵湯下。

時氣井花水下。脾風陳皮湯下。頭痛水下。心痛溫酒下。大小便不通燈

草湯下。因物所傷。以本物湯下。吐水藜湯下。氣病乾薑湯下。小兒天風弔

搐。防風湯下。防已亦可。小兒疳痢。葱白湯下。小兒乳食傷白湯下。月信不通。

煎紅花酒下。婦人腹痛。川芎湯下。懷孕半年後胎漏。艾湯下。有子氣衝心酒

下。產暈痛溫酒下。血氣痛。當歸酒下。產後心腹脹滿。荳淋湯下。難產益志

湯下。產後血痢。當歸湯下。赤白帶下。酒煎艾湯下。解內外傷寒粥飲下。室

吳茱萸次湯洗十 菖蒲

茯苓去皮 皂莢去皮子

蜀椒微去目及閉日

加羌活 獨活

巴豆出去油研膜

柴胡去蘆

桂枝 厚朴一薑兩製

人參去兩各

右為細末。入巴豆。勻



女血氣不通。酒下。子死。菜子湯下。又治小兒驚癇。大人癲狂。一切風及無孕婦。人身上頑麻。狀如蟲行。四肢俱腫。呻吟等疾。

太陰證

方在後保命集內

理中湯加減例

若爲寒氣濕氣所中者。加附子一兩。名附子理中湯。若霍亂吐瀉者。加橘紅青橘各一兩。名治中湯。若乾霍亂心腹作痛。先以鹽湯少許頓服。候吐出令透。卽進此藥。若嘔吐者。於治中湯內。加丁香半夏一兩。每服生薑十片同煎。若泄瀉者。加橘紅茯苓各一兩。名補中湯。若瀉泄不已者。於補中湯內。加附子一兩。不喜飲水穀不化者。再加縮砂仁一兩。共成八味。若霍亂吐下。心腹作痛。手足逆冷。於本方中去白朮。加熟附。名四順湯。若傷寒結胸。先以桔梗枳殼等分煎服。不愈者。及諸吐利後。胸痞欲絕。心隔高起急痛。手不可近者。加枳實茯苓各一兩。名枳實理中湯。若渴者。再於枳實理中湯內。加栝蒌根一兩。若霍亂後轉筋者。理中湯內。加火煨石膏一兩。若臍上築者。腎氣動也。去朮加官桂一兩半。腎惡燥。故去朮。恐作奔豚。故加官桂。若悸多者。加茯苓一兩。若渴欲飲水者。添加朮半兩。若苦寒者。添加乾薑半兩。若腹滿者。去白朮。加附子一兩。若飲酒過多。及啖炙煖熱食。發爲鼻衄。加川芎一兩。若傷胃吐血。以此藥能理中脘。分利陰陽。安定血脈。只用本

方。若中附子毒者。亦用本方。或止用甘草乾薑等分煎服。仍以烏荳煎湯解之。
平胃散加減例

若瀉脾濕。加茯苓丁香白朮爲調胃散。一法加藿香半夏。若加乾薑爲厚朴湯。

若溫疫時氣。二毒傷寒頭痛壯熱。加蓮鬚葱白五寸。豈豉三十粒。煎三二服。微汗出。

愈。若五勞七傷。脚手心熱。煩躁不安。百節酸疼。加柴胡。若痰嗽瘧疾。加薑製半

夏。若本藏氣痛。加茴香。若火氣衝滿。加桑白皮。若婦人赤白帶下。加黃耆。

若酒傷加丁香。若飲冷傷食。加高良薑。若滑脫泄瀉。加肉荳蔻。若風痰四肢

沈困。加荊芥。若腿膝冷痛。加牛膝。若渾身虛壅拘急。加地骨皮。若腿膝濕痺。

加兔絲子。若白痢加吳茱萸。若赤痢加黃連。若頭風加藁本。若轉筋霍亂。

加楠木皮。若七邪六極。耳鳴夢洩盜汗。四肢沈重。腿膝酸痠。婦人宮藏久冷。月脈

不調者。加肉桂。若胃寒嘔吐。多加生薑。一法加茯苓丁香各三兩。共成六味。

若氣不舒快。中脘痞塞。加縮砂仁香附子各三兩。生薑煎服。若與五苓散相半爲

對金飲子。若與六一散相合爲黃白散。若與錢氏異功散相合爲調胃散。若

欲進食。加神麴麥芽吳茱萸蜀椒乾薑桂爲吳茱萸湯。若加藁本桔梗爲和解散。

治傷寒吐利。若加藿香半夏爲不換金正氣散。若瘧疾寒熱者加柴胡。若小

腸氣痛者。加苦楝茴香。

少陰證

真武四逆等湯在活人書附方七道在保命集內

八物定志丸。補益心神。安定魂魄。治痰去胸中邪熱。理肺腎。

人參半兩

菖蒲

遠志心去

茯神心去

茯苓去皮各

硃砂

白朮

麥門冬

去心各半兩

牛黃

二錢另研

右爲細末。煉蜜丸。桐子大。米飲湯下。

三十丸無時。

若髓竭不足加。生地黃。

當歸。若肺氣不足加。

天門冬。

門冬。五味子。

若心氣不足加。

上黨參。

茯苓。

菖蒲。若脾氣不足加。

朮。

白芍藥。

益志。

若肝氣不足加。

天麻。

川芎。

若腎氣不足加。熟地黃。

遠志。

牡丹皮。

若膽氣不足加。

細辛。

酸棗仁。

地榆。

若神昏不足加。

硃砂。

預知子。

茯神。

仲景八味丸。

熟地黃。補腎水真血。

肉桂。補腎水真火。

牡丹皮。補神志不足。

附子。能行諸經。

而不止。兼益火。

白茯苓。能伐腎邪濕滯。

澤瀉。去胞中留垢及遺溺。

山茱萸。治。

精滑不禁。

乾山藥。能治毛中燥酸澀。

右八味皆君主之藥。

若不依易老加減。

服之。終不得效。若加五味子爲腎氣丸。

述類象形之劑也。益火之源。以消陰翳。壯水。

之主。以制陽光。錢氏地黃丸減桂附。

潔古老人天麻丸。

治證見活法機要。

天麻六兩 日焙 酒浸三 除風痺 牛膝六兩 日焙 酒浸三 強筋 玄參六兩 樞機管領 萆薢六兩

末另為 壯骨 杜仲七兩 剉 炒去絲 使筋骨相着 當歸十兩 全用 和養血 羌活十五兩 或去骨節

間風 生地黃一斤 益真血 附子一兩 炮 行諸經不止 獨活五兩 去腎間風邪 右為

細末 煉蜜為丸 如桐子大 每服五七十丸 病大至百丸 空心食前溫酒白湯下 服藥

忌壅塞 宜於通利 故服半月稍覺壅塞 微以七宣丸輕疎之 使藥再為用也

大效 牡丹皮散 治血藏虛風 及頭目不利 不思飲食 手起煩熱 肢節拘急疼痛 胸膈

不利 大腸不調 陰陽相干 心驚忪悸 或時旋運

牡丹皮 川芎 枳殼一兩 炒各 陳皮炙 玄胡 甘草 羌活

半夏洗湯 三稜炮 乾薑炮 肉桂各半 木香 調子肉 白朮三炒 各分

芍藥錢三 當歸半兩 右為細末 每服二錢 水一盞半 煎五七沸 食前溫服 益血

海退血風勞攻注 消寒痰 實脾胃 理血氣 攻刺及氣虛惡寒潮熱證 至妙

海藏大五補丸同三才丸例

天門冬 麥門冬 菖蒲 茯神 人參 益智 枸杞

地骨皮 遠志 熟地黃 右為末 煉蜜為丸 如桐子大 空心酒下三十丸

清心丸治熱 本方數服 以七宣丸泄之

醫 量 元 戊 八 商務印書館印行

