

證治要訣

二酉堂梓



北京中医药大学图书馆版权局

秘傳證治要訣目錄

卷一諸中門

中風 附破傷風漏風

中寒

中濕

卷二諸傷門

傷風寒

傷濕 附痺

傷禽

中氣

中暑

中惡 附霜

傷暑

傷酒

卷三諸氣門



七氣

積聚

蠱脹

陰顏氣

附王莖疼

小腸氣

卷四諸血門

鼻衄

肌衄

吐血

軟血附肺癰

痞塞

腫

脚氣

附下

手氣

舌衄

牙宣

咯血

小便



破傷血

大便血

卷五諸痛門

頭痛

牙痛

脇痛

附心瘕

飲流入臂

心痺痛

腰痛

卷六諸嗽門

瘡毒血

眼眶骨痛

附眼梁痛

咽喉痛

附上癰

臂痛

肩背痛

脇痛

腹痛



嗽證

嘔吐附惡心

停飲伏痰

不喜食

咳逆

卷七 寒熱門

瘧寒熱

卷八 小腑門

小便多

哮喘

吐血

胃

噫氣吞酸

獨寒

潮熱附虛煩

淋閉尿



白濁

三消

瀉泄

瀉血

痢疾

卷九 虛損門

五勞

眩暈

驚悸

五癰

附健忘

附痢後風脫肝

遺精

大便秘

交腸

腸風



南京中医药大学图书馆藏

盜汗自汗

虛炎短之

惺忪

顛狂附心風

不寐

卷十拾遺門

渴病

眼疾

鼻

卷十一瘡毒門

癰疽癰毒

附發背腸癰露痕

癰

癩風

附下疳瘡

惡虫蛇傷

耳疽

口舌附舌瘡

瘡癰疥附疥

豆疥

癩撲

發丹



療癰

卷十二婦人門

經事不調

血虛

赤白帶

方訣引用醫書

素問

和劑方

本事方

脾胃論方

難經

三因方

宣明論方

按萃

血痛和血

崩中

胎前產後

傷寒論

濟生方

事親書方

直指方



高要言

楊氏家藏方

魏氏家藏方

易簡方

簡易方

古選方

得效方

瑞竹堂方

黃聖志方

江西方

沈氏筆讀方

千金方

大全方

活人書



秘傳證治要訣卷之二

大醫院使戴元禮述

明月新安余時雨校

諸中門

中風附破傷風漏風

天地間惟風無所不入一罅不塞來不可禦人之
身續蠶者少踈漏者多風乘之也輕則為感重則為
傷又重則為中古人謂避風如避寇蓋欲窒源以防
患中風之證卒然暈倒昏不知人或痰涎壅盛咽喉
作弄或口眼喎斜手足癱緩或半身不遂或舌強不



語風邪既盛氣必上逆痰隨氣上停留壅塞昏亂暈
倒皆痰為之也五臟雖皆有風而犯肝經為多蓋肝
主筋屬木風易人之各從其類肝受風則筋緩不榮
或緩或急所以有喎斜癱緩不遂舌強語澀等証治
之之法調氣為先經云善治風者以氣理風氣順則
痰消徐理其風庶可收効先用麻油調蘇合香圓或
用姜汁或用白滾調如口噤挾開灌之稍甦則進八
味順氣散

諸中或未甦或已甦或初病或久病忽吐出紫紅色
之死昏沉石看人事口禁不可進藥急以生半夏為

未吹入鼻中或用細辛皂角為末吹入喉噴嚏則甦
此可以驗其受病深淺則知其可治不可治苦稍得
甦省者八味順氣散便服治風藥然未遽絕治氣藥
小續命湯煎熟去滓調蘇合香圓一粒或五積散加
麝香少許或星香散或醜風湯加木香不線如服前
藥不效其人頑涎愈盡或前證不解或增困重宜星
附湯或三生飲加全蝎三箇間磨沉香湯下養正丹
肥人多有中病以其氣盛於外而歉於內也肺為氣
出人之道人肥者氣必急氣急必肺邪盛肺金剋木
膽為肝之腑故痰涎壅盛所以治之必先理氣為急

中後氣未盡順痰未盡除調理之劑惟當以藿香正
氣散星香散煎服此藥非特可治中風之證治中氣
中惡霍亂尤宜尋常上嘔下疼多痰者亦可用之
若中後體虛有痰不可峻補熱燥者宜四君子湯和
星香飲或六君子湯和之中而口眼喎斜者先燒皂
角烟薰之以遂去外邪次燒乳香薰之以順其血脈
若前證多怒宜小續命湯加羚羊角熱而渴者小續
命湯去附子加秦艽半錢恍惚錯語者加茯神遠志
各半錢不得睡者加炒酸棗仁半錢不能言者加竹
瀝一甌殼許人虛無力者去麻黃加茯苓如其數

若人自甦者能言能食惟身體不遂急則攣蹠緩則

躑曳經年累月難以起止加減地仙丹常服

若中飲食坐臥如常但失音不語俗呼為啞風小續

命湯去附子加石菖蒲一錢

筋骨疼者俗呼為痛風或痛而遊走無定俗呼為走

注風並宜烏藥順氣散和氣散嚙地仙丹

或青龍圓未效用大防風散或五積散調乳香末

脛細而膝腫者俗呼為鶴膝風宜地仙丹

感冒後四逆手足不遂牙關緊急與霍亂後四逆手

足搐捻欲成風者草果飽和星香散各半貼煎服



中医药大学图书馆藏

有無故口眼喎斜投以中風藥劑不效蓋經骨虛中
受風所致當於此求之不可倒作尋常中風治之則
烏一叶決不可少宜炮熟用

遍身骨節疼痛書靜夜劇如虎之噬名曰白虎瘧節
風並宜加減地仙丹或青龍圓乳香圓等

有於窓牖間梳洗卒然如中呼為簷風五積散加防
風一錢有痛風而痛有常處其痛處赤腫灼熱或渾
身壯熱此欲成風毒宜敗毒散

兩頰赤腫其狀如癰名頭面風酒調消風散食後服
仍以生杏仁去殼頻搗之諸般頭風見在諸痛門頭



痛證病有終身不愈者其在腰或屈而不能伸或伸不能屈者在手足亦然以風傷肝肝主筋筋為之也治法活血為先多服四物湯吞活絡丹治風之法初得之即當順氣及其久也即當活血此萬古不易之理久患風疾四物湯吞活絡丹愈者正是此義若先不順氣遽用烏附又不活血徒用防風天麻羌活輩吾未見能治也風有偏枯風痺風懿風痺此皆言其至重也外有證狀不同其名亦眾非旦暮可愈非口耳可受不復繁引苦中人髮直吐清沫搖頭上攔面赤如粧汗綴如



珠或頭面赤黑眼開口開手撒遺尿聲如鼾睡皆不可治所謂風中脉則口眼喎斜中腑則支體廢中則性命危不特中風他中亦然

其有害大風者古謂之癩風俗呼為麻風病之至惡

無出於此得此病而眉髮髭髯先落猶風撼木而葉

先落也間有食蛇服大風油而愈者亦幸耳

破傷風者因皮肉曾有破傷處風從瘡口入其證項

強牙關緊狀如發瘥不似中風又似產後角弓反張

用蘇合香圓進防風散玉真圓

漏風不論冬夏額上常有汗出得之醉後當風所致

