

亥 12
4-426

證謨

頭痛 面病 口舌 眼目 耳證 鼻病 聲瘖
咽喉 齒牙 遺精 淋濁 遺溺

全書 必



景岳全書卷之二十六必集

雜證謨

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

頭痛

經義

五藏生成篇曰頭痛巔疾下虛上實過在足少陰巨陽甚則入

腎○心煩頭痛病在膈中過在手巨陽少陰

經脉篇曰膀胱足太陽也是動則病衝頭痛目似脫項如拔

脉解篇曰陽明並於上上者則其孫絡太陰也故頭痛鼻鼽腹腫也

通評虛實論曰頭痛耳鳴九竅不利腸胃之所生也

著至教論曰三陽獨至者是三陽並至並至如風雨上爲巔疾

下爲漏病

脉要精微論曰來疾去徐上實下虛爲厥巔疾○推而下之下而不上頭項也

平人氣象論曰寸口之脉中手短者曰頭痛

脉要精微論曰厥成爲巔疾○顙痛刺手陽明與顙之盛脉出

血○顙痛刺足陽明曲周動脈見血立已不已按入迎於經
立已○項痛不可俛仰刺足太陽不可以顙刺手太陽也
寒熱病篇曰陽迎頭痛胸滿不得息取之人迎○足太陽有通
項入於腦者正屬目本名曰眼系頭目苦痛取之在項中兩
筋間

雜病篇曰厥挾脊而痛者至頂頭沈沈然目眈眈然腰脊強取
足太陽腦中血絡

奇病論帝曰人有病頭痛以數歲不已此安得之名爲何病岐
伯曰當有所犯內至骨髓髓者以腦爲主腦逆故令頭痛齒



亦痛病名曰厥逆帝曰善

厥病篇曰眞頭痛頭痛甚腦盡痛手足寒至節死不治

論證 共二條

凡診頭痛者當先審久暫次辨表裏蓋暫痛者必因邪氣久病者必兼元氣以暫病言之則有表邪者此風寒外襲於經也治宜疎散最忌清降有裏邪者此三陽之火熾於內也治宜清降最忌升散此治邪之法也其有久病者則或發或愈或以表虛者微感則發或以陽勝者微熱則發或以水虧於下而虛火乘之則發或以陽虛於上而陰寒勝之則發所以暫



病者當重邪氣、久病者當重元氣、此固其大綱也、然亦有暫
病而虛者、久病而實者、又當因脉因證而詳辨之、不可執也、
一頭痛有各經之辨、凡外感頭痛、當察三陽厥陰、蓋三陽之脉
俱上頭、厥陰之脉亦會於巔、故仲景傷寒論則惟三陽有頭
痛、厥陰亦有頭痛、而太陰少陰則無之、其於辨之之法、則頭
腦額顫、雖三陽俱有所會、無不可痛、然太陽在後、陽明在前、
少陽在側、此又各有所主、亦外感之所當辨也、○至若內傷
頭痛、則不得以三陽爲拘矣、如本經所言、下虛上實、過在足
少陰、巨陽、若厥病篇所論、則是六經及手少陰少陽皆有之、

矣、奇病論曰、腦者陰也、髓者骨之克也、凡痛在腦者、豈非少陰之病乎、此內證外證之異、所不可不察也、
厥病篇義
詳類經

論治 共五條

一、外感頭痛、自有表證可察、蓋其身必寒熱、脈必緊數、或多清涕、或兼咳嗽、或兼脊背痠痛、或兼項強、不可以左右顧、是皆寒邪在經而然、散去寒邪、其痛自止、如川芎、細辛、蔓荊子、柴胡之類、皆最宜也、若寒之甚者、宜麻黃、桂枝、生薑、蔥白、紫蘼、白芷之類、隨其虛實而加減用之、

一、火邪頭痛者、雖各經皆有火證、而獨惟陽明爲最、正以陽明



胃火盛於頭面而直達頭維故其痛必甚其脉必洪其證必
多內熱其或頭腦振振痛而兼脹而絕無表邪者必火邪也
欲治陽明之火無如白虎湯加澤瀉木通生地麥冬之類以
抑其至高之勢其效最速至若他經之火則芍藥天花苓連
知栢龍膽梔子之類無不可擇而用之但治火之法不宜佐
以升散蓋外邪之火可散而去內鬱之火得升而愈熾矣此
爲忌也

一陰虛頭痛卽血虛之屬也凡久病者多有之其證多因水虧
所以虛火易動火動則痛必兼煩熱內熱等證治宜壯水爲

全書卷三十六
雜說
主當用滋陰八味煎、加減一陰煎、玉女煎之類。主之○火微者、宜六味地黃丸、四物湯、三陰煎、左歸飲之類。主之。

一陽虛頭痛、卽氣虛之屬也。亦久病者有之。其證必戚戚悠悠、或羞明、或畏寒、或倦怠、或食飲不甘、脉必微細、頭必沉沉、遇陰則痛、逢寒亦痛。是皆陽虛陰勝而然。治宜扶陽爲主。如理陰煎、理中湯、十全大補湯、補中益氣湯之類。皆可擇用。或以五福飲、五君子煎、加川芎、細辛、蔓荊子之類。以升達陽氣。則最善之治也。

一痰厥頭痛。諸古方書皆有此名目。然以余論之。則必別有所

因但以頭痛而兼痰者有之未必因痰頭痛也故兼痰者必
見嘔惡胸滿脇脹或欬嗽氣粗多痰此則不得不兼痰治之
宜二陳湯六安煎和胃飲平胃散加川芎細辛蔓荊子之類
主之○如多痰兼火者宜用清膈煎或二陳湯六安煎加黃
芩天花粉之類主之火甚者加石膏亦可○如多痰兼虛而
頭痛者宜金水六君煎或六君子湯加芎辛之類酌而用之
○東垣治痰厥頭痛惡心煩悶頭旋眼黑氣短促上喘無力
懶言心神顛倒目不能開如在風雲中頭苦痛如裂身重如
山四肢厥冷不得安卧如范天騾之妻因兩次下之而致頭

痛者、用半夏白朮天麻湯

述古

共三條

活人書云、頭痛者、陽證也、太陽證、頭痛、發熱、惡寒、無汗、麻黃湯
有汗、桂枝湯、若已發汗、未發汗、頭痛如破者、連翹蔥白湯、不
止者、葛根蔥白湯、○陽明證、頭痛、不惡寒、反惡熱、胃實也、調
胃承氣湯、○少陽頭痛、小柴胡湯、○太陰少陰、並無頭痛之
證、○仲景只有厥陰一證、吳茱萸湯、

東垣曰、金匱真言論云、東風生於春、病在肝、俞在頸項、故春氣
者、病在頭、又諸陽會於頭面、如是太陽膀胱之脉、起於目內

背、上額交巔上入絡腦還出別下項、病衝頭痛、又足少陽膽
之脉起於目銳眥、上抵頭角、病則頭角額痛、夫風從上受之
風寒傷上、邪從外入、客於經絡、令人振寒頭痛、身重惡寒、
在風池風府調其陰陽、有餘則瀉、不足則補、汗之則愈、此傷
寒頭痛也、○頭痛耳鳴、九竅不利者、腸胃之所生、乃氣虛頭
痛也、○心煩頭痛者、病在耳中、過在手巨陽少陰、乃濕熱頭
痛也、○如氣上不下、頭痛巔疾者、下虛上實也、過在足少陰
巨陽、甚則入腎、寒濕頭痛也、○如頭半寒痛者、先取手少陽
陽明、後取足少陽陽明、此偏頭痛也、○有真頭痛者、甚則腦

盡痛、手足寒至節、死不治。○有厥逆頭痛者、所犯大寒、內至骨髓、髓者、以腦為主、腦逆故令頭痛、齒亦痛。○凡頭痛、無以風藥治之者、總其大體而言之也。高巔之上、惟風可到、故味之薄者、陰中之陽、乃自地升天者也。然亦有三陰三陽之異。○故太陽頭痛、惡風、脈浮緊、川芎、薑活、獨活、麻黃之類為主。○陽明頭痛、自汗發熱、惡寒、脈浮緩、長實者、升麻、葛根、白芷為主。○少陽經頭痛、脈弦細、往來寒熱、柴胡為主。○太陰頭痛、必有痰疾、體重、或腹痛、爲痰癖、其脈沉緩、蒼朮、半夏、南星為主。○少陰頭痛、三陰三陽經不流行、而足寒氣逆爲寒厥。

其脉沉細、麻黃附子細辛爲主。○厥陰頭項痛、或吐痰沫、厥
冷、其脉浮緩、吳茱萸湯主之。○血虛頭痛、當歸川芎爲主。○
氣虛頭痛、人參黃芪爲主。○氣血俱虛頭痛、調中益氣湯主之。
加川芎、蔓荊子、細辛、其效如神。○半夏白朮天麻湯治痰厥
頭痛藥也。○清空膏乃風濕熱頭痛藥也。○薑活附子治厥
陰頭痛藥也。○如濕氣在頭者、以苦吐之、不可執方而治。○
先師嘗病頭痛、發時兩頰青黃、眩暈目不欲閉、懶言身體沉
重、兀兀欲吐、潔古曰、此厥陰太陰合病、名曰風痰、以局方玉
壺丸治之、更灸俠谿穴、卽愈、是知方者、體也、法者、用也、徒執

體而不知用者弊、體用不失可謂上工矣

立齋曰、久頭痛、多主於痰、痛甚者、乃風毒上攻、有血虛者、有諸

經氣滯者、有氣虛者、有四氣外傷者、有勞役所傷者、有可吐

者、有可下者、當分虛實寒熱兼變而治之、若夫偏正頭風、久

而不愈、乃內挾痰涎、風火鬱遏、經絡氣血壅滯、甚則目昏、緊

小、二便秘澁、宜砭出其血、以開鬱解表、余嘗治尚寶劉毅齋、

但怒則兩太陽作痛、先用小柴胡加茯苓、山梔子、後用六味

丸、以生腎水而再不發、○譚侍御每頭痛、必吐清水、不拘冬

夏、喫薑便止、余作中氣虛寒、用六君子、當歸、黃芪、炮薑而瘥、



○商儀部勞則頭痛余作陽虛不能上升以補中益氣湯加蔓荊子而痊

簡易方

硝石散 治風寒入腦頭痛不可當

因九七

一方 用生蘿葡汁仰臥注兩鼻孔數年之患一注即愈

灸法

神庭

上星

後頂

百會

風池

以上諸穴隨灸一處可愈

頭痛論列方

麻黃湯 散一

桂枝湯 散九

葛根葱白湯 散三二

白虎湯 寒二

四物湯 補八

蓮鬚葱白湯 散三三

平胃散 和十七

和胃飲 新和五

補中益氣湯 補三二

二陳湯 和一

六安煎 新和二

十全大補湯 補二十

五福飲 新補六

玉女煎 新寒十二

小柴胡湯 散十九

六味地黃湯 補一二一

清隔煎 新寒九

理中湯 熱一

