

傷寒論

冊四



註解傷寒論卷第六

漢張仲景著

晉王叔和撰次

宋成無已註

明汪濟川校正

辨太陰脈證并治第十

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛
若下之必胸下結鞭

太陰爲病陽邪傳裏也太陰之脈布胃中邪氣壅
而爲腹滿上不得降者嘔吐而食不下下不得升
者自利益甚時腹自痛陰塞在內而爲腹痛者則
爲常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹
自痛也若下之則陰邪留於胸下爲結鞭經曰病
發於陰而反下之因作痞

太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者爲欲愈

太陰脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫
末疾也表邪少則微裏尋和則澁而長長者陽也
陰病見陽脈則生以陰得陽則解故云欲愈
太陰病欲解時從亥至丑上

脾爲陰土王於丑亥子向陽故云解時

太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

經曰浮爲在表沉爲在裏太陰病脈浮者邪在經
也故當汗散之

自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服
四逆輩

自利而渴者屬少陰爲寒在下焦自利不渴者屬
太陰爲寒在中焦與四逆等湯以溫其藏

傷寒脈浮而緩手足自溫者繫在太陰太陰當發身

黃若小便自利者不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

太陰病至七八日大便鞭者爲太陰入府傳於陽明也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去也下利煩燥者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩下利日十餘行而利必自止

本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之

表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太陰裏氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏太實痛者桂枝加大黃湯主之

大實大滿自可除下之故加大黃以下大實

太陰爲病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者

宜減之以其人胃氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尙弱易爲動利也

辨少陰病脈證并治第十一

少陰之爲病脈微細但欲寐也

少陰爲病脈微細爲邪氣傳裏深也衛氣行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也



欲吐不吐心煩者表邪傳裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰此自利而渴爲寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引水自救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利欲飲水者以有熱故也此下利雖渴然以小便色白明非裏熱不可不察

病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脈陰陽俱緊爲少陰傷寒法當無汗反汗出者陽虛不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰邪客少陰之絡令人噤痛不可內食少陰寒甚是當咽痛而復吐利

少陰病欬而下利譫語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰汗者津液內竭加火氣煩之故譫語小便難也

少陰病脈細沉數病爲在裏不可發汗

少陰病始得之反發熱脈沉者爲邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少陰病脈細沉數爲病在裏故不可發汗

少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱瀋者復不可下之

脈微爲亡陽表虛不可發汗脈弱瀋爲亡陽裏虛復不可下

少陰病脈緊至七八日自下利脈暴微手足反溫脈

緊反去者爲欲解也雖煩下利必自愈

少陰病脈緊者寒甚也至七八日傳經盡欲解之時自下利脈暴微者寒氣得泄也若陰寒勝正陽虛而泄者則手足厥而脈緊不去今手足反溫脈緊反去知陽氣復寒氣去故爲欲解下利煩燥者逆此正勝邪微雖煩下利必自止

少陰病下利若利自止惡寒而踰臥手足溫者可治
少陰病下利惡寒踰臥寒極而陰勝也利自止手足溫者裏和陽氣得復故爲可治

少陰病惡寒而踰時自煩欲去衣被者可治

惡寒而踰陰寒甚也時時自煩欲去衣被爲陽氣得復故云可治

少陰中風脈陽微陰浮者爲欲愈

少陰中風陽脈當浮而陽脈微者表邪緩也陰脈當沉而陰脈浮者裏氣和也陽中有陰陰中有陽陰陽調和故爲欲愈

少陰病欲解時從子至寅上

陽生於子子爲一陽丑爲二陽寅爲三陽少陰解於此者陰得陽則解也

少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至者灸少陰七壯

經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反發熱不死脈不至者吐利暴虛也灸少陰七壯以通其脈

少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱必便血也



膀胱太陽也少陰太陽爲表裏少陰病至八九日
寒邪變熱復傳太陽太陽爲諸陽主氣熱在太陽
故一身手足盡熱太陽經多血少氣爲熱所乘則
血散下行必便血也

少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道
出或從口鼻或從目出是名下厥上竭爲難治

但厥無汗熱行於裏也而強發汗虛其經絡熱乘
經虛迫血妄行從虛而出或從口鼻或從目出諸
厥者皆屬於下但厥爲下厥血亡於上爲上竭傷
氣損血邪甚正虛故爲難治

少陰病惡寒身踈而利手足逆冷者不治

針經曰多熱者易已多寒者難已此內外寒極純
陰無陽故云不治

少陰病吐利躁煩四逆者死

吐利者寒甚於裏四逆者寒甚於表躁煩則陽氣欲絕是知死矣

少陰病下利止而頭眩時時自冒者死

下利止則水穀竭眩冒則陽氣脫故死

少陰病四逆惡寒而身踈脈不至不煩而躁者死

四逆惡寒而身踈則寒甚脈不至則真氣絕煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁爲熱來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈將滅而暴明其能久乎

少陰病六七日息高者死

腎爲生氣之源呼吸之門少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也



少陰病脈微細沉但欲臥汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者死

陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更自利煩躁不得臥寐則正氣弱陽不能復病勝藏故死

少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯主之

少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖脈沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之

麻黃附子細辛湯方

麻黃

二兩去節

細辛

二兩

附子

一枚

炮去皮

破八片

辛熱

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少



陰之經

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與與麻黃附子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩
去節

甘草

二兩
炙

附子

一枚
炮
去皮

麻黃甘草之甘以散表寒附子之辛以溫寒氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得臥黃連阿膠



湯主之

脈經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於寒二
三日已上寒極變熱之時熱煩於內心中煩不得
臥也與黃連阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方

黃連

四兩
苦寒

黃芩

一兩
苦寒

芍藥

二兩
酸平

鷄子黃

二枚
甘溫

阿膠

三兩
甘溫

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足
以甘補之鷄子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍
藥之酸收陰氣而泄邪熱

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱盡

少冷內鷄子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥
是無熱也背爲陽背惡寒者陽氣弱陰氣勝也經
曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子
湯溫經散寒

附子湯方

附子

二枚破八片
去皮辛熱

茯苓

三兩
甘平人參

白朮

四兩
甘溫

芍藥

三兩
酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參
白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所
以然者偏陰偏陽則爲病火欲實水當平之不欲
偏勝也

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之
少陰腎水而主骨節身體疼痛支冷脈沉者寒成
於陰也身疼骨痛苦脈浮手足熱則可發汗此手
足寒脈沉故當與附子湯溫經

少陰病下利便膿血者桃花湯主之
陽病下利便膿血者協熱也少陰病下利便膿血
者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂

一斤

一半

篩末

乾薑

辛熱

粳米

甘平

瀋可去脫赤石脂之瀋以固腸胃辛以散之乾薑
之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤石



脂末方寸匕日三服若一服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹滿小便不利下利不止
便膿血者桃花湯主之

二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒
也小便不利者水穀不別也下利不止便膿血者
腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利也

少陰病下痢便膿血者可刺

下焦血氣留聚腐化則爲膿血刺之以利下焦宣
通血氣

少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之
吐利手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者陽氣內
爭與吳茱萸湯助陽散寒

少陰病下痢咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之