

傷寒證治準繩帙之二

金壇王肯堂輯

門人南昌張

緯校

太陽病

發熱

惡寒

惡風

頭痛

項強

身體痛

黃經曰太陽之爲病頭項強痛而惡風寒不傳經者固
有之然而傳者多矣如經言傷寒一日太陽受之脉若
靜者爲不傳頗欲吐及煩燥脉數急者爲傳也又曰傷
寒二三日陽明少陽證不見者爲不傳也太陽經治法
有汗吐下溫和解調併刺俱有之蓋太陽所感非一傳
變多端故也雖發汗解肌一法證有輕重脉有浮沉用

藥必宜隨脉證用之。庶造仲景之深意。如發熱惡寒脉浮緊麻黃湯。自汗惡風脉浮緩桂枝湯。此脉證相應之定法也。又如項背強几几反汗出惡風桂枝加葛根脉微而惡寒桂枝麻黃各半湯。發熱惡寒熱多寒少脉微弱者桂枝二越婢一湯。脉浮緊自汗出小便數心煩微惡寒脚攣急桂枝加附子湯。又如汗後復汗者發汗遂漏不止惡風小便難四肢微急難以屈伸桂枝加附子湯。服桂枝大汗出脉洪大者與桂枝如前法。若如瘧狀日再發宜桂枝二麻黃一湯。仲景汗劑二十七湯所治五十九證大宜精別如何而用青龍湯如何而用五

苓散如何而用茯苓甘草湯之類蓋病有輕重治有急
緩故也清碧杜先生曰傷寒陽熱之證傳經之邪變態
不一辨之不精則汗吐下三法之治一差死生反掌矣
非比陰寒之邪中在一經不復傳變易於治也不過隨
寒邪輕重用溫藥治之一定之法耳今之庸工好用熱
劑而不知涼藥之妙且難也

汗

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二越婢一湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

葛根湯

葛根加半夏湯

葛根黃連黃芩湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龍湯

桂枝加芍藥人參新加湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

五苓散

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝加桂湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝附子湯

茯苓甘草湯

文蛤散

去桂加白朮湯

甘草附子湯

吐

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子厚朴湯

梔子乾薑湯

瓜蒂散

下

調胃承氣湯

大柴胡湯

承氣湯

柴胡加芒硝湯

桃仁承氣湯

抵當丸

大陷胃湯

抵當湯

大陷胃丸

白散

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

溫

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

四逆湯

乾薑附子湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

桂枝甘草湯

真武湯

小建中湯

炙甘草湯

和解

小柴胡湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

小陷胷湯

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

柴胡桂枝湯

桂枝人參湯

白虎湯

白虎加人參湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

調

赤石脂禹餘糧湯

旋復代赭石湯

黃連湯

刺

縱橫刺期門

服桂枝刺風池風府

太少併病刺期門

熱入血室刺期門

太少併病刺大根肺俞

太陽之為病脉浮頭項強痛而惡寒

成經曰尺寸俱浮者太陽受病太陽

脈浮緩有汗為中風宜桂枝湯

主表為諸陽主氣脉浮頭項強痛而惡寒者

太陽病

發熱汗出惡風脉緩者名為中風

太陽病上條所揭云云者是也後皆倣此

○成風陽也寒陰也風則傷衛發熱汗出惡風者衛中風也榮病則發熱無汗不惡風而惡寒衛病則發熱汗出不惡寒而惡風以衛為陽衛外者也病則不能衛固其外而皮腠疎故汗出而惡風也傷寒脉緊傷風脉緩者寒性勁急而性解緩故也
太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝

湯主之 太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗

出欲救邪風者宜桂枝湯 （成）太陽中風風併於衛則衛實而榮虛榮者陰也衛者陽

也發熱汗出陰弱陽強也內經曰陰虛者陽必疾之故少氣時熱而汗出與桂枝湯解散風邪調和榮衛

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發陰弱者汗自出

齋齋惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者桂枝湯主

之 （成）陽以候衛陰以候榮陽脈浮者衛中風也陰脈弱者榮氣弱也風并於衛則衛實而榮虛故發熱汗自

出也經曰太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強強者是也齋齋者不足也惡寒之貌也淅淅者灑灑也惡風之貌

也衛虛則惡風榮虛則惡寒榮弱衛強惡寒復惡風者以自汗出則皮膚緩腠理疎是亦惡風也翕翕者扪隔

然而熱也若合羽所覆言熱在表也鼻鳴乾嘔者風擁而氣逆也與桂枝湯和榮衛而散風邪也 病

人藏無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也

先其時發汗則愈宜桂枝湯主之時發熱自汗出謂有時而發熱自汗出有
時而止惟其時作時止故病留連而不愈也當其發熱自汗之時不可與藥當先其時作候其時止而後與之
故曰先其時也素問曰當其盛而必毀因其衰也事必大昌其是之謂歟

桂枝湯方

桂枝

參兩 去皮

芍藥

參兩

甘草

貳兩 炙

生薑

參兩 切

大棗

拾貳枚 擘

右五味咬咀以水柒升微火煮取參升去滓適寒溫服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許徧身熱熱微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑若不汗更

服依前法又不汗後服小促其間半日許令三服盡若
病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者
更作服若汗不出乃服至二三劑禁生冷粘滑肉麵五
辛酒酪臭惡等物

小促宋板
作少從容

成經云桂枝本為解肌若脉浮緊發熱汗不出者不
可與之常須識此勿令誤也蓋桂枝湯本專主太陽
中風必也皮膚疎湊又自汗風邪干於衛氣者乃可
投之也仲景以解肌為輕以發汗為重故發汗吐下
後身疼不休者津液內耗也雖有表邪而止可解肌
故須桂枝湯少和之也桂味辛熱用之為君桂猶圭

也宣導諸藥爲之先聘是謂辛甘發散爲陽之意蓋
發散風邪必以辛爲主內經所謂風淫所勝平以辛
佐以苦以甘緩之以酸收之是以芍藥爲臣而甘草
爲佐也內經曰風淫於內以甘緩之以辛散之生薑
味辛溫大棗味甘溫是用以爲使而此又不特專於
發散以脾主爲胃行其津液薑棗之用專行脾之津
液而和榮衛者也麻黃湯不用薑棗者謂專於發汗
不待行化而津液得通矣

龐凡桂枝湯病證者常目汗出小便不數手足溫和
或手足指稍露之則微冷覆之則溫渾身熱微煩而

又憎寒始可行之若病者無汗小便數或手足逆身
冷不惡寒反惡熱或飲酒後慎不可行桂枝湯也脉
緊必無汗設有汗不可誤作桂枝證

〔許〕有人病發熱惡寒自汗脉微弱而浮三服湯而愈
此方在仲景一百十三方內獨冠其首今人全不用
何也仲景云太陽中風陽浮而陰弱陽浮者云至

翕翕發熱宜桂枝湯此脉與證仲景說得甚明後人
看不透所以不敢用也 假令寸口脉微名曰陽不
足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也尺脉弱名曰陰不
足陽氣下陷入陰中則發汗也此謂元氣受病而然

也又曰陽微則惡寒陰微則發熱醫既汗之使陽氣微又大下之令陰氣弱此謂醫所使也大抵陰不足陽往從之故內陷而發熱陽不足陰往乘之故陰上入陽中則惡寒舉此二端明白易曉何懼而不用桂枝湯哉

垣仲景治表虛製此湯桂枝味辛熱發散助陽體輕本乎天者親上故桂枝為君芍藥甘草佐之如陽脉瀋陰脉弦法當腹中急痛乃製小建中湯以芍藥為君桂枝甘草佐之一則治其表虛一則治其裏虛故各有主用也後學當觸類而長之以桂枝易肉桂

無汗為
傷寒宜
黃湯

治寒腹痛神品藥也如夏中熱腹疼少加黃芩去桂
痛立止桂於春夏二時為禁藥

陶桂枝麻黃湯為當時傷寒設與過時之溫暑者何
預焉若以此二湯通治春溫夏喝之病則誤之甚矣

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽

俱緊者名曰傷寒

成經曰凡傷於寒則為病熱為寒氣客於經中陽經怫結而成熱也中風

即發熱者風為陽也及傷寒云或已發熱或未發熱以寒為陰邪不能即熱鬱而方變熱也風則傷衛寒則傷榮衛虛者惡風榮虛者惡寒榮傷寒者必惡寒也氣病者則麻血病者則痛風令氣緩寒令氣逆體痛嘔逆者榮中寒也經曰脉盛身寒得之傷寒脉陰陽俱緊者知其傷寒也○但見惡寒即為在表此是要訣

太

陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者

傷寒九陽病
麻黃湯主之

成寒則傷榮頭痛身疼腰痛以至牽連骨節疼痛者太陽經榮血不利也內經曰風

寒客於人使人毫毛畢直皮膚閉而為熱者寒在表也風并於衛衛實而榮虛者自汗出而惡風寒也寒并於榮榮實而衛虛者無汗而惡風也以榮強衛弱故氣逆而喘與麻黃湯以發其汗

麻黃湯方

麻黃

參兩去節

桂枝

貳兩去皮

甘草

壹兩炙

杏仁

柒拾個泡去皮尖

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮

取貳升半去滓溫服捌合覆取微似汗不須啜粥餘如桂

枝法

○凡用麻黃去節先滾醋湯畧浸片時撈起以備後用庶免太發如冬月嚴寒腠理緻密當生用

一用麻黃後汗出不止者將病人髮披水盆中足露

出外用炒糯米壹升龍骨牡蠣藁本防風各壹兩研
爲細末周身撲之隨後祕方用藥免至亡陽而死此
良法也

吳或云發汗必用麻黃亦有禁用者何也凡傷寒發
於天令寒冷之時且其寒邪在表閉其腠理身疼拘
急惡寒而無汗者須用麻黃辛苦之藥爲能開發腠
理逐寒邪汗出而解也惟夏月炎暑之時爲禁用之
藥故宜辛涼之劑以發之乃葛根葱白豆豉之類是
也若麻黃加涼劑在內亦可用如通解散是也

成本草言輕可去實卽麻黃葛根之屬實謂寒邪在