

全書

四庫



第七三八册

四庫全書

● 上海古籍出版社

本冊目次

顧顥經	宋不著撰人	一
銅人鍼灸經	宋不著撰人	一五
明堂灸經	舊題口西方子撰	五一
博濟方	宋王袞編	九七
蘇沈良方	宋蘇軾撰	二一七
壽親養老新書	宋沈括撰	二一七
腳氣治法總要	宋陳直撰	二八三
旅舍備要方	元鄒鉉續編	二八三
素問入式運氣論奧	宋董汲撰	四三九
附黃帝內經素問遺篇	宋劉溫舒撰	四五一
傷寒微旨論	宋韓祇和撰	五四一
傷寒總病論	宋龐安時撰	五七五
附傷寒論音法訓藥	宋董炳編	五七五

欽定四庫全書

子部五

提要

顧頤經二卷

醫家類

欽定四庫全書 子部
顧頤經卷上

顧頤經卷下

欽定四庫全書

顧頤經

顧頤經卷上

738-1

詳校官太醫院吏目臣等更
編修臣倉聖脈覆勘

恭錄監生臣徐元秀

遺名曰內經百姓莫可見之後穆王賢士師
巫於崆峒山得而釋之云云其所言師巫與
宋志相合當即此本疑其唐末宋初人所為
以王冰素問注第七卷內有師氏藏之一語
遂托名師巫以自神其說耳其名顧頤者案
首骨曰顧腦蓋曰顛殆因小兒初生顛頤未
合證治各別故取以名其書首論脈候至數
之法小兒與大人不同次論受病之本與治

療之術皆深中肯綮要言不煩次論大丹證

原序

治分列十五名目皆他書所未嘗見其論雜證亦多秘方非後世俗醫所可及蓋必別有師承故能精晰如此宋史方技傳載錢乙始以顧頤經著名至京師視長公主女疾授翰林醫學乙幼科冠絕一代而其源實出於此書亦可知其術之精矣謹據永樂大典所載褒而輯之依宋志舊目釐為二卷俾不至無

欽定四庫全書

校勘

傳於後馬乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸 費 墉

夫顧頤者謂天地陰陽化感顧頤故受名也嘗覽黃帝內傳王母金文始演四序二儀陰陽之術三才一元之道揅御靈機黃帝得之昇天祕藏金匱名曰內經百姓莫可見之後穆王賢士師巫於崆峒山得而釋之叙天地大德陰陽化功父母爻和中成胎質爰自精凝血室兒感陽興血入精宮女隨陰住故以清氣降而陽谷生濁氣升而陰井盛也甚者二儀互換五氣相參日覩元機非賢莫達謂真陰錯雜使精血聚而成殃陽發異端感榮衛合而有疾遂使嬰兒幾養驚候多生庸愚不測始末亂施攻療便致枉損嬰兒吁哉吁哉遂究古言尋察端由叙成疾目曰顧頤經焉真憑辨證乃定死生後學之流審依濟疾天和太清降乘赤海真一元氣乘之則母情先搖蕩漾熾然足陽盛發陰當妊男也六脉諸經皆舉其陽證所謂妊衰不勝藏氣則觸忤而便傷妊勝而氣劣則母疾三五月而發皆隨五歲心臟乾而口

欽定四庫全書

題辭

一

苦舌乾肺臟渴而多涕發寒肝藏邪而胆酸多睡脾藏

發而嘔逆惡食腎藏困而軟弱無力藏姪氣平則和而

無苦胎若劣而強得藏養至生亦乃多疾二儀純陰之

證昇雜真一者謂陰發陽則父精薄姪當成女也六脉諸經皆發陰證若血盛氣衰則肥而劣氣若氣盛血衰

則瘦而壯氣餘藏姪之氣皆同男說孩子處母腹之內時受化和之正氣分陰陽之紀綱天地降靈十月而化萬物以生成隨其時變大理清純化成祥瑞之基全真

顧顥經卷上

脈法

凡孩子三歲已下呼為純陽元氣未散若有脉候即須於一寸取之不得同大人分寸其脉候未來呼之脉來三至吸之脉來三至呼吸定息一至此為無患矣所言定息呼氣未出吸氣未入定息之中又至此是平和也若以大人脉五至取之即差矣如此七至已上即為有

道一故生成焉一月為胚精血凝也二月為胎形兆分也三月陽神為三魂動以生也四月陰靈為七魄靜鎮形也五月五行分藏安神也六月六律定腑滋靈也七月精開霞通光明也八月元神具降真靈也九月宮室羅布以生人也十月氣足萬物成也太乙元真在頭曰泥丸總衆神也得諸百靈以潔邪氣陶甄萬類以靜為

源是知慎於調護即以守恬和可以保長生耳故小兒瘦病蓋他人之過也

初生小兒鴟口撮噤並是出胎客風着顧臍致有此可

病證

孩子脉呼吸十五至已上三至以下皆死矣

一兩顆桃心

氣或脉浮如弓之張弦此為有風並可依後方合藥治之或七至已下此為冷候亦宜依後方合藥療之或診候取平或忽而不見沉浮不定伏益根平者此為神鬼之病且合求祟續宜使藥或桃榔枝湯浴煎飲子為使

以小父灸三壯及烙之愈

初生小兒至夜啼者是有瘀血腹痛夜乘陰而痛則啼

初生小兒一月內乳癧如膠是母寒氣傷胃所致也

初生小兒一月內兩眼赤者是在胎之時母喫灸燙熱

麪壅滯氣入胎中熏兒腦所致也

小兒溫熱皆因從氣熱而搏胃氣然若下之平氣即愈

氣虛則生驚而變癇

欽定四庫全書

卷上

二

小兒驚癇一從虛邪客熱相搏而生其候當用補養安和即愈加以性冷及太過即死

小兒嘔逆吐皆胃氣虛逆氣客於藏氣而作當和胃養氣至如下冷即極小兒霍亂吐逆皆胃氣與陰陽氣上下交爭而作當用分和補藥調養即愈餘皆死

小兒客忤無章皆因客入所觸及暴露星月小兒嫩弱所以此候多惡

小兒一眼青揉瘡是肝疳二齒焦是骨疳三面色鼻中

乾是肺疳四皮乾肉裂是筋疳五髮焦黃是血疳六舌

上生瘡是心疳七愛喫泥土是脾疳孩子肌膚肥實皮

膚白無故煩渴此自小亦猛衝損肺但依後方內用甘

草人參合飲子若氣急甚胃脹起鼻連眼下臉青色呻吟之聲者此必死之兆不得與藥

孩子利如泔碇者難效利如鵝鴨血者脾已爛損不宜與藥

孩子凡有諸色疾苦但眼瞼下垂牽必定死矣

欽定四庫全書

卷上

三

孩子瘡皆難效或發無時即口噤咬牙作聲此必死矣呼為瀝疳瘡亦名為鎖腸疳

孩子渴喫乳食夜啼作聲此即是腹肚痛

孩子無故搖頭此是腦頂風

孩子喫乳食皆出此是脾冷

孩子無故肚大項細四肢消瘦筋脉骨節起自是小來少乳嚼食與喫早成骨熱疳勞先宜與保童丸吃續與

柴胡龍甲引子保童丸方見一切疳門中

孩兒頭面脣脣肌厚脣脰細瘦行走遲者是小兒抱損

孩子鼻流清涕或鼻下赤痒此是腦中鼻中疳極宜用

後方青黛散吹鼻兼傳下赤爛處方見疳疾
吹鼻門中

已前並診候孩子疾狀孩子氣脈未調藏府脆薄腠理

開疎看脉以時依方用藥

孩子或夏中熱時因乳母沐浴多使冷水妳得冷氣血

脉皆伏見孩兒氣未定便與妳使孩子多胃毒及赤白

兩般惡病此乃是妳母之過凡浴後可令定息良久候

欽定四庫全書醫經
卷上

氣定捺與之即全無患

師巫燒錢乳母須預祝之勿令着水噴兒皆令驚熱入

心轉成患害切細慎之

凡孩子自生但任陰陽推移即每六十日一度變蒸此

骨節長來四肢發熱或不下食乳遇如此之時上唇有

珠子如粟粒大此呼為變蒸珠子以後方退熱飲子療

之不宜別與方藥一切新書注云顧頭經以六十日為一變
葉氏病源以三十二日為一變

說有不同
故並存之

驚癇癲證治

牛黃丸 治小兒胎驚及癇或心熱

牛黃 龍齒 馬牙硝

鐵焰粉各一分

右為細末鍊蜜丸如梧桐子大每日乳食前熱水調破一丸灌下令母忌口

又牛黃丸 治孩子驚熱入心擬成癇疾面色不定啼哭不出潮熱無度不吃乳食大段眼翻露白手足逆

欽定四庫全書醫經
卷上

冷呼喚不應

牛黃 研 独活 各一分

琥珀 研 各半兩

升麻

菉豆粉

大麻仁

研 各半兩

右為末蜜丸如梧子大空心熟水下一丸頓服之食

後再服一丸至十歲加金銀箔各五片忌燭炙毒物

虎睛丸 治孩兒風癇驚啼不喫乳

虎睛 一隻 犀角

子芩 各等分

梔子仁

大黃

各十分

右五味為細末鍊蜜丸如梧子大驚啼不喫妳乳汁

下七丸風癇米飲下五丸至七丸兒小減丸數取利

為度忌毒物若有虛熱加知母六分

又虎睛丸

治小兒孩子二十四種驚癇壯熱抽掣腳

手嘔吐夜啼眼腫

虎睛

一隻聖惠

梔子仁

茯苓

各二分

牛黃

少許聖惠
用半兩

人參

一分聖惠

鈎藤

欽定四庫全書

卷上

七

大黃

各四分
七寸燒灰
聖惠用一分

犀角

未一分聖

黃芩

一分聖惠用

蛇退

七寸燒灰
聖惠用一分

升麻

一分聖惠用

白蘚皮

雷丸

燒金赤

欽定四庫全書

卷上

七

人參

各三分

細辛

一分半

蛇皮

五寸赤

石膏

五分

蟬

一枚去翅足

足

右為末蜜丸如黍米大空心熟水下隨年九輕者一
服重者三服妳汁下亦得聖惠熟水下妳母忌一切

生冷油膩毒物

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目

牛黃

一錢

右為細末研和蜜水服之

二十二味虎睛丸 治孩子從一歲至大癩發無時口
出白沫小便淋瀝不利

虎睛

乾酒浸令黃色

真珠

蜂房

各三錢

麻黃

二分去節

鈎藤

三分

鐵精

防葵

大黃

梔子仁

龍齒

銀屑

升麻

羌活

各四分

柴胡

欽定四庫全書

卷上

七

白蘚皮

雷丸

燒金赤

右為末蜜丸如赤豆大四五歲五丸日再服大兒十
丸濃煎米飲下忌生冷油膩

疳瘡證治

保童丸 治小兒孩子諸色疳候或腹內虛脹驚癇頭

髮立常咬手指脊疳勞臂脰細弱倚立不得父鼻

下常赤清涕流涎不止舌上生瘡腦疳口疳腹上筋

脉

虎睛半隻

硃砂

麝香各一錢

牛黃

龍腦

巴豆

芎藭

桔梗

枳殼

檀香

茯神

人參

當歸

羌活

代赭

鶴虱

白术

各半兩

右為細末下香砂巴豆全句鍊蜜丸如梧子大一歲

欽定四庫全書

卷上

至五歲每日一丸十歲每日兩丸並空心米飲下但

稍知孩子病甚即加藥與之孩子未較好母忌生冷

油膩炙燙毒魚大蒜米醋

又方 治孩子瘧痢諸色疳并一十五種病狀一腹大

二皮膚黑黃三骨節癱四眼赤五口赤六鼻中生瘡

七頭髮黃八咬指甲九愛喫土十愛喫甜物十一身

熱十二頭大十三臍凸十四項細十五面無光並宜

常服保童丸方

硃砂

牛黃

麝香

蟾酥各少許

阿魏二分

右先將硃砂於淨器中研如粉入諸藥一時以蒸餅

為丸忌羊血生冷等

又方 治孩子疳氣或釀肚脹上筋脈頭大項細喫物

不知足夜中即起腹內長鳴

大黃一兩

陳橘皮

二兩酸醋二合浸二日曬乾

蟬娘

二十箇去翅足子熱燒醋安之以石蓋地上去火毒陰冷取出炒過

欽定四庫全書

卷上

右為末蜜丸如梧子大每日空心熟水下十九丸忌

如常

紫雪圓方 治小兒五疳兼腹肚虛脹疳氣煩悶或時

燥渴

大黃

黃連

代赭各二分

硃砂

麝香各少許

杏仁去皮尖

肉豆蔻

巴豆

去皮以冷水浸別研各一兩

右為細末蜜丸如梧子大每服空心米飲湯下圓五

歲十歲只可服五丸臨時加減忌冷水油腻矣燄

硃砂丸 治孩子疳癆辨蟲顏色定吉凶

硃砂 半石蓮大阿魏如硃砂大蝙蝠血 三兩清

蟾酥 少許

右為細末和少許口脂調先以桃柳枝煎湯浴兒後

看小兒大小以菉豆大填兒臍中後用紙片向臍中貼之用青衣蓋兒看蟲出來黃色輕青黑色重

青黛散 治孩子鼻流清涕或鼻下赤癩

欽定四庫全書

卷上

十一

青黛 一錢

蘆薈

地龍 各半錢

硃砂 一字乞

瓜蒂 半錢

細辛 一錢

宣連 半錢

右為細末和合吹鼻中入麝香少許

保童丸

硃砂

麝香

新蟾酥 各等分

右研合成劑合子內盛丸如麻子大又於一合子內浸一丸以筋頭點入鼻中亦名問命丸但孩子病甚

下忌如常

即與吹之或得七噴可以治之五噴即甚三兩噴即死矣此不可深著水浸臨時入水亦不畏

蓋腦散 治孩子腦疳鼻癢毛髮作穗面色赤

地榆 灰

蝦蟆 燒各一分 蝎牛殼 二十一箇

青黛

石蜜 各二分

麝香

右為末吹鼻當有黃水出忌甜物

胡黃連丸 治孩子熱疳

蟾酥 各等分

十二

欽定四庫全書

卷上

十一

右為末蜜丸如菉豆大五歲熟水送下二丸調中丸 治孩子諸疳或熱攻衝心肺氣急晝夜有汗日漸羸瘦不吃乳食

柴胡

茯苓

人參

木香

桂心

大黃

醋炙各等分

枳殼

甘草

鱉甲 醋炙各等分

右為末蜜丸如桐子大每歲兩丸至五歲三丸熟水

地黃煎方 治孩子疳勞肺氣熱欬嗽四肢漸瘦心肺

乾

生地黃汁 五兩 酥

蜜 各一兩

生薑汁

鹿角膠 半兩

右先將地黃汁安鍋內慢火煎手不住攪約五六沸
下酥又五六沸下蜜次下膠又下薑汁慢火煎候如
稀餳即住火每食後兩度共與一匙頭忌毒物

又方 治孩兒疳蝕口齒齒齦宣露臭穢不可近

欽定四庫全書

醫經 卷上

三

薑蘆 炒

梧桐律 等分

欽定四庫全書

醫經 卷上

三

青木香 一分

黃連 半兩

右為末以臘月猪脂調微煎作膏取柳木筋子綿裹
微微搣藥時烙

又方 治孩子疳蝕脣鼻及諸瘡

硫黃

乾漆

文蛤

附子

乾薑

甘草

炮剉各半兩

右等分燒灰稍煙盡研為末入麝子少許以帛拭瘡
膿血後用藥乾擦之立效

又方 治孩子初患諸色瘡父微有疳氣

右用枳實不限多少炒令黑拗破看內外相似為散
空心米飲下半錢以歲加減服之忌如常

又方 治孩子赤白痢

阿膠

赤石脂

枳殼 炒

龍骨

阿子 炮半熟去核各半兩

白朮

右為末一歲二歲空心米飲下半錢
又方 治孩子冷毒疳痢白朮疳症日加瘦弱不喫食

腹痛

醫經 卷上

三

欽定四庫全書

醫經 卷上

三

青木香 一分

黃連 半兩

三

欽定四庫全書

醫經 卷上

三

溫脾散

治孩子水鴻利并脾冷食乳不消喫亦頻吐

顧頤經卷上考證

第一頁後二行三行 原本依後方同藥治之 按後方

已佚謹查出聲明

第二頁前一行 以小艾灸三壯原本脫艾字謹增

第五頁前六行 灌字原本訛蒲謹校正

第七頁前三行 注生眼訛在眼謹校正

十二頁前七行 稀錫原本訛稀錫謹校正

欽定四庫全書卷

顧頤經卷下

火丹證治

黃帝問岐伯曰後生少稚多被惡疾丹毒二品若何分
之岐伯曰陽解百年一十已上為毒一十已下為丹丹
毒一也隨其大小分別之治之有毒至依方萬無一差
喻人間男女皆遭丹毒至依此枉死者復何限哉良由
信邪師之語仍被恐之愚昧之人勿與下手請依方用
信邪師之語仍被恐之愚昧之人勿與下手請依方用

之今出此圖形狀如後

伊火丹從兩脇起

神龜丹從肚起

尿龜丹從踝起

胡吹龜丹從陰囊上起

天火丹從腹背遍身上起

天雷丹從頭項起

燐火丹從背甲起

胡漏龜丹從臍中起

廢龜丹從曲臂起

神氣丹從頭背上起

土龜丹從陰踝起

朱黃丹赤豆色遍身上起

螢火丹從且起

野龜丹從背脊起

鬼火丹從面上起

欽定四庫全書

卷下

二

伊火丹從兩脇起

右用豬糞燒灰并鐵槽中泥拌調塗之日三

神龜丹從肚起

右用土蜂窠杏仁膩粉生油調塗立差

尿龜丹從踝起

右用屋四角頭茅草燒灰使雞子白調塗之

胡吹龜丹從陰囊上起

右用水焰窠下泥和苦酒塗之

天火丹從腹背遍身上起

右用樟皮白末和生油調塗之亦用赤石脂羊脂調

塗之

天雷丹從頭項起

右用陰乾葱赤末拌脂塗又用龜下土雞子白調塗

胡漏龜丹從臍中起

右用屋漏水調龜中土塗之

廢龜丹從曲臂起

欽定四庫全書

卷下

三

右用屋四角茅草灰雞子白調塗之

神氣丹從頭背上起

右用枯牛骨燒灰羊脂塗之

土龜丹從陰踝起

右用屋四角茅草龜橫麻及雞子白調塗之

朱黃丹赤豆色偏身上起

右用慎火草擣汁和酒調塗之

螢火丹從耳起

右用慎火草搗汁塗之聖惠以醋調塗

野龜丹從背脊起

右用柔香耳朶罐赤小豆末塗之立差

鬼火丹從面上起

右用龜下土雞子白調塗之立差

雜證

平和飲子 小兒初生可日與之

人參

茯苓

甘草 炙

欽定四庫全書

卷下

四

升麻

以上各一分

右以水一白盞煎至一合半以來時時與之乳母忌

油膩滿月及百晬以來加之臨時冷加白术熟加缺

各半錢

又方 治孩子臍中不乾

白礬 一錢
僵蠅 過龍骨 一分

右為細末入麝香少許每次使拭臍乾繆之用帕裹

避風

青木香散 治孩子陰囊或如疝腫脹

狐陰 一雙灸

蒺藜 炒

地膚子

昆布

枳殼 炒

槐子 炒各一分

右為末一歲二歲空心米飲下一錢

又方 治孩子蛔蟲咬心痛而伏地卧口吐清水痰涎

檳榔

苦棟根

鵝蟲 炒各半兩

右為末空心熟茶下一錢以意加減忌粘食

杏仁丸

治孩子或渴此是蛔蟲傷

欽定四庫全書

卷下

五

杏仁 去皮尖

膩粉 各一分

右為末每用唾丸空心米飲茶任下二丸

又方 治孩子赤遊腫或如丹煩渴渾身赤癟壯熱

菉豆粉

鉛白霜

右細研菉豆汁調塗之

又方 取鉛霜法將鉛來於石上打令薄掘地作坑可

鉛片大以杵搗坑實滿坑着醋以鉛蓋定經一宿去取霜如珠子大和藥使之如煩渴以後服解熱飲子

又方

麥門冬

小蘆根

竹葉

茴香

冬青膽

陰莖

生甘草

乾葛

漏蘆

犀角屑

右為細末每洗

眼時取藥一分水一盞煎十沸後溫洗之或孩兒長大即加藥并水

消石散

治孩兒身上無故腫但覺肉色赤熱

消石

大黃

菉豆

知母

黃芩

青箱子

右為末每用時隨腫大小取荳蓬根研汁調塗腫上

如有惡物即看有點子以膏貼之四面以散子燙之

欽定四庫全書

卷下

六

欽定四庫全書

卷下

七

若無荳蓬根即用雞子白或車前根葉亦得

又方 治孩子胎中受風長後或滿身生瘡沸癰如疥

瘡或如飢飽瘡瘍

葱白

硝

臭黃

麝香

少許

硫黃

各等分

右用油半兩燒令熟下少許蠟先剥葱白三莖細切

待油熟即潑葱上細研續下硫黃臭黃硝更研之旋

塗

石硫黃

製

茴香散 治孩兒赤眼并胎熱及疳障多淚

茴香

冬青膽

陰莖

生甘草

右為細末每洗

眼時取藥一分水一盞煎十沸後溫洗之或孩兒長大即加藥并水

引子方

孩兒用藥洗眼後可更服之

又方

治孩子耳聾

知母

黃芩

青箱子

地蛹子

秦皮

車前草

山梔子

獨活

各等分

青箱子

欽定四庫全書

卷下

七

右藥以水五合煎二合去滓溫服忌食如常

又方 治孩子聰耳

白朮

半兩燒過

龍骨

鉛丹

燒各一分

右為末以綿裹竹枝子淨探臘水以一小豆大藥傅

之別以綿裹塞填之勿令見風

又方 治小兒聰耳

此为试读 需要完整PDF请