

診餘集卷上

荆溪余景和聽鴻甫著

男振基渭耕錄

關格

琴川趙姓女年十九。面色如常。毫無病容。脈見左沉右弱。余曰。木強土弱。肝木犯胃。尅脾。飲食作吐。否。其父曰。然。即進疏肝扶土降逆之劑。明日又至。其父曰。昨日所服之藥。傾吐而盡。余即細問其病之始末。其父曰。此病有一年。半矣。余曰。何不早治。其父曰。已服藥三百餘劑。刻下只餘每



序

余家世居荆溪兵燹後祖業蕩然避居孟河後先君游
海震爰其山水之秀風俗之美遂家焉以迄二十餘年
金奇疾怪症不可備指計雖婦孺莫不耳孟河余先生名
平居間錄治案示及門審症處方之法極不畧以壽世也
不幸於丁未秋弃養之以苦塊終生永訣桂辣麻辛少繼
先人之志爰檢遺稿存其僅存餘皆醫案而已玉碎珠零
原不足片先君之學術而元寶莊之時親手摩挲之
爾

男振元謹識 庚戌孟秋



診餘集目錄

閏格 二則

痿 三則

濕溫

久痛入絡

戴陽

腹痛肝厥

黃胆

閏格兼痿

寒脹 五則

濕痺

暑溫

陰陽並脫

瘧厥

不食不便

目錄

一

金繼鴻



大便秘結

腫脹

嘔得寒痞

氣厥

濕便聚便血

暑犯厥陰

熱鬱腸胃

陰斑海血

小便癃秘

遺精

食厥

戰汗

呃忒

熱極似寒

癰積少腹

電斑亡陽



上下並脫

肝陽吐血

子痢

胞腔膀胱

產後中暑

血分

產後血脫

尸厥

黃帶

症起厥陰

厥陰傷寒

胞阻

產後咳痢

產婦渡難

產後氣脫

小兒初生撮口

急病



十
遊魂

陰癢

一
結胸

三
淫溫

二
男子陰吹

五
便血傷脾

藥積

九
陽虛目疾

十三
脫肛奇治

十四
嫫媿中毒

二
熱淫厥淫

四
腫脹

孩食碗鋒

六
脾泄

七
胆汁不清

八
脫症



^六截蛇咬臂

^{十五}膈内生虫

^{十七}桃葉吐疾

滑胎

前淫

骨槽風 ^{二則}

時毒 ^{二則}

舌痛

^{十二}食多盲目

^{十六}額上生虫

^{十七}苦痛根洗痔

胎前吐瀉

產後血暈

瘰癧 ^{二則}

齒齬

咽喉 ^{五則}



發背 脇癰 胃癰 腸癰 懸癰

三則 二則

流痰 肺癰 肝癰 腎俞發 痔漏

二則 肺癰 五則



診餘集卷上

荆溪余景和聽鴻甫著

男振基渭耕錄

關格

琴川趙姓女年十九。面色如常。毫無病容。脈見左沉右弱。余曰。木強土弱。肝木犯胃。尅脾。飲食作吐。否。其父曰。然。即進疏肝扶土降逆之劑。明日又至。其父曰。昨日所服之藥。傾吐而盡。余即細問其病之始末。其父曰。此病有一年。半矣。余曰。何不早治。其父曰。已服藥三百餘劑。刻下只餘每



降甘州人參生津養胃。生蜜甘潤。甘潤水取其引而不
增。後復磨之。滑潤腸腑。深膏。牛膝之降下。而潛寒湯。再以此
金匱腎氣丸。溫動其陽。雲蒸雨施。藉不焦之湯。而布上焦之
陰。服後仍傾吐而盡。余追灼不堪。問曰。人乳何以飲之。父
曰。一杯作四五次。方飲。惟金匱腎氣丸。乾者三四粒
而飲下咽。余曰。得之矣。將原方濃煎。或置雞鳴壺內。終日
燉溫。頻々取服。令病人坐於門旁。俟其心曠神怡。忘却其
病之憂。將腎氣丸四錢。乾者每次三四粒。用薑汁少些送

之一日。夜間就余後診。余曰。別無他法。仍將審作腎氣丸。乾嚥以原方膏汁送之。服三四劑。忽然神氣恢復。面色轉黃。一月餘未得及衣。忽下燥糞兩尺。臥床不能起矣。舉家驚惶。余曰。下關雖通。上關仍閉。飲食仍不得下。幸而乾者能嚥。常有一線生機。將腎氣丸四錢。和入蒸飯四兩。搗丸。將前方去度著牛膝。遵前法漸下。吞之。後仍前法再加蒸飯四錢。照法吞之。數日後。胃得穀氣。食管轉潤。腎氣丸每日加飯一錢。漸加至飯三四兩。皆用大半夏湯吞之。後

以飯作丸。用清米飲吞之。一日能進飯丸四兩。再食以乾
飯。上格已開。胸氣亦潤。後用潤燥養陰之品。調理三月。而
愈。所以仲聖之法。用之得當。乃鼓應桴。人云仲聖之法。能
治傷寒。不能調理者。門外漢也。關格皆房事枯傷。用香
燥以取一時之快。此乃暗藏利刃。殺人於無形之間耳。余
於此症。焦勞兩月。始能治痊。亦生平一快事也。

又

琴川東周市顧姓。年三十餘。素性好飲。縱慾。腎虛。公龍火



上燔。嘔血盈盆。津液大傷。他醫將涼藥逼之。後年餘。大便
秘結。匝月不紅。食入即嘔。或早食著吐。又經他醫投以辛
熱溫燥。嘔吐更甚。就診余處。余曰。大吐血後。津液已傷。又
經辛香溫燥。更傷其液。肝少血養。木氣上犯。公嘔腸胃乾
澀。津不流。下降。肺道不通。故而便堅陰結也。即進二退
黃連湯。加葶藶柏杷。歸身白芍。沙苑菟絲。柏仁麻仁。牛膝
肉桂。薤白。等潤腸之品。服四五劑。即能更衣。其嘔亦瘳。再
以鹿角霜。龜版膠。又服二十餘劑。乃瘳。至今已二十八年矣。

或有當時服甘溫滋潤膏劑即瘥。此症多專以香燥藥
溫耗燥津液。關格斷難復起。汪叔庵曰。關格之症。治以香
溫香燥。雖取快於一時。久之必至於死。為醫者當必何慎
之。

關格兼痿

庚午。余治琴川孝廉邵君。憂思印震。亭生平嗜飲過度。且
有便血證。便血甚多。殆於飲食漸少。繼則四肢痿軟。後即
飲食不得入。手不能舉。遂不能行。邀余診之。其病頗未久。



日只飲人乳一杯。米粉粥一鐘而已。病急醫之方皆服
 芳名溫燥。診脈經溫而空。舌津燥。余曰。此乃血不養肝。津
 液乾溫。食管不利。夫格症皆屬津枯。剛燥之劑。亦在所禁。
 痿屬血少。不能榮養筋絡。多服燥烈。芳名胃汁。枯津液傷。
 痿症已成。格亦難愈。即進以養血潤燥之品。服五六部。格
 症漸開。余思此木柔潤之劑。難生氣血。亦不能入絡。因生
 好酒。便血太多。後起此症。即進以血肉有情之品。用鹿
 角。龜版。等膠。牛筋。蹄筋。鹿筋。羊肝。骨。雞翅。等。及蒼魚。綠膠。

大滋補

柏杞歸身已戟猪脊筋等重。剖服十餘劑。開括大開。飲食手足痛勢已舒。手略能舉。步稍能移。後即將此方加羊腎。海參。淡菜。共十七味。約四五斤。濃煎收膏。服四五料。步履如常。飲食亦復。手亦能握管矣。古人云。精不足者補之以味。生言洵不誣也。後即君賜余匾額。山中良弼四字。終不敢受。然余亦勉畧善心。金後三年。因其不能戒淫。遂色以慎保養。得中風症而逝。

痿

痿

五

