

景岳全書麻疹詮目錄謨集

卷之四十二

麻疹全

述原一

名義二

疹逆順三

疹脉四

疹證五

疹期六

麻疹初熱七

疹出沒

疹形色九

疹第

疹吉凶十一

總論治法十二

疹禁忌

十三

疹發熱

十四

疹喘嗽

十五

疹吐瀉

十六

疹飲食

十七

疹飲水

十八

疹渴

十九

疹汗衄

二十

疹躁妄狂亂

二十一

疹咽痛

二十二

疹唇口瘡

二十三

疹腹痛

二十四

疹後諸證

二十五

附麻疹

二十六

水痘

二十七

論列方

二十八

景岳全書卷之四十二謨集

麻疹詮

會稽 張介賓 會卿著

會稽 魯 超 謙菴訂

麻疹 全

述原

景岳子曰痘之與疹原非一種雖痘之變態多證而疹之收歛稍易然疹之甚者其勢凶危亦不減於痘最爲可畏蓋疹毒痘毒本無異也第古人重痘而忽疹多不詳及使後人無所

宗法余實悵之自得羅田萬氏之刻見其理透法精鄙念斯
慰今悉從其訓備述於此雖其中稍有裁訂亦不過正其疑
似詳其未詳耳使此後患疹者幸獲迷津之指南亦以見萬
氏之功爲不少矣

名義二

疹者痘之末疾惟一經受證脾與肺也內應於手足太陰外合
於皮毛肌肉是皆天地間疹戾不正之氣故曰疹也然其名
目有異在蘇松曰沙子在浙江曰醋子在江右湖廣曰麻在
山陝曰膚瘡曰糠瘡曰赤瘡在北直曰疹子名雖不同其證

則一但疹在痘前者痘後必復疹惟痘後出疹者方爲結局

疹逆順三

萬氏曰疹以春夏爲順秋冬爲逆以其出於脾肺二經一遇風寒勢必難出且多變證故於秋冬爲不宜耳夫天行不正之氣致爲人之瘍疹然古人於痘疹二字始終歸重於痘並不分別疹爲何物豈可以二證歸於一證耶想當時重痘不重疹故爾略之致使後人不得心法因而害事者往往有之今以吾家四代傳流以及今日心得之法開載於後用此應痘定不差矣敢有毫釐隱匿天其鑒之

疹脉四

凡出疹自熱起至收完但看右手一指脉洪大有力雖有別證亦不爲害此定存亡之要法也

景岳曰按此卽陽證得陽脉之義若細軟無力則陽證得陰脉矣元氣旣弱安能勝此邪毒是卽安危之基也故凡診得陰脉者卽當識爲陰證而速救元神宜用傷寒溫補托法參酌治之若執以麻疹爲陽毒而槩用清寒則必不免矣

疹證五

疹雖非痘之比然亦由胎毒蘊於脾肺故發於皮毛肌肉之間

但一時傳染大小相似則未有不由天行癘氣而發者此其
源雖內發而證多屬表故其內爲胎毒則與痘證同外有表
邪則與傷寒類其爲毒也總由君相二火燔灼太陰而脾肺
受之故其爲證則有欬嗽噴嚏面腫腮赤目胞浮腫眼淚汪
汪鼻流清涕呵欠悶頓乍涼乍熱手足稍冷夜臥驚悸或惡
心嘔噦或以手搯面目唇鼻者是卽出疹之候便宜用解毒
散邪等藥不使畱停於中庶無他患且凡是疹證必其面赤
中指冷而多嗽又必大熱五六日而後見紅點遍身此其所
以與痘與傷寒有異也

一痘欲盡發而不畱疹欲盡出則無病邪氣鬱遏則畱而不去
正氣損傷則困而不伸毒歸五臟變有四證歸脾則泄瀉不
止歸心則煩熱不退而發驚歸肺則欬嗽血出歸腎則牙齦
爛而疳蝕

程氏曰麻疹初出類傷風寒頭疼欬嗽甚目赤頰紅一二日
內卽出者輕必須解表忌見風寒葷腥厚味如犯之恐生痰
涎變爲驚搐必致危矣如初起吐瀉交作者順乾嘔霍亂者
逆欲出不出者危亡立至

徐氏曰痘自裏而出於臟故重疹自表而出於腑故輕

景岳曰痘疹之屬有四種曰痘曰疹曰麻曰班也痘則陸續漸
出自小而大或稀或密部位顆粒有辨也疹則一齊發出大
者如蘇子次者如芥子小者如蚕子而成粒成片者是也麻
則最細而碎如蚊迹模糊者是也班則無粒惟成片紅紫如
雲如錦者是也大都疹與麻班同類卽發班傷寒之屬而痘
則本非其類也蓋痘毒本於肝腎出自中下二焦是以終始
不妨於食而全賴水穀爲主所以能食則吉不能食則凶故
治痘者不可不顧脾胃麻疹之毒則由表邪不解而內犯太
陰陽明病在上中二焦所以多不能食故治麻疹者但宜解

散火邪邪散則自能食矣是痘疹之治當各有所重者如此

疹期六

出疹之候初熱一日至次日鷄鳴時其熱卽止止存五心微熱
漸見欬嗽鼻流清涕或腹中作痛飲食漸減到申酉之間其
熱復來如此者四日用手滿按髮際處甚熱其面上熱少減
二三分欬嗽連聲面燥腮赤眼中多淚噴嚏頻發或忽然鼻
中出血至五日其熱不分晝夜六日早時其疹出在兩頰下
細細紅點至午時兩手背並腰下及渾身密密俱有紅點七
日普徧掀發其鼻中清涕不流噴嚏亦不行七日晚兩頰顏

色漸淡此驗出疹之要法

凡疹熱六日而出一定之規也若醫人無識用藥太早耗散元氣及至出時變害多矣或嗽而變喘或出一二日卽隱或作大瀉或合目而喘此醫人用藥不當之害也吾家治法定不在五日內用藥必待見疹方用徐徐升表然用藥亦有次第凡一劑必作十餘次飲之况疹在皮膚之間若作一次服則藥性催之太急每致譫語煩躁故當慎之

景岳曰按此萬氏之法謂醫人用藥太早恐致耗散元氣故必待見點而後施治及作一次服恐藥性催之太急皆惟恐

無益而反以致害此固其心得之法也然以愚見則醫有高
下藥有宜否但使見有確真發無不當則於未出之前或解
或補必有得愈防之力以潛消其毒者既出之後亦必有善
調之方而不致催急者此在善與不善或不嫌早與不早也
嘗見庸流之誤治者多是誠不服藥爲中醫也此萬氏之說
所以不可不遵

疹熱五六日必出矣醫人用藥見不能散父母見藥不效醫
人見熱嗽不能除或以別證治之主家又或更醫此世之所
以誤者多矣

麻疹初熱

七

麻疹發熱之初與傷寒相似惟疹子則面頰赤欬嗽噴嚏鼻流
清涕目中有淚呵欠喜睡或吐瀉或手搯眉目面赤爲異耳
但見此候卽是疹子便宜謹避風寒戒葷腥厚味古法用升
麻葛根湯以表散毒邪余製透邪煎代之更佳或柴歸飲亦
妙但使皮膚通暢腠理開豁則疹毒易出不可作傷寒妄加
汗下也妄汗則增熱而爲衄血欬血爲口瘡咽痛爲目赤腫
爲煩燥乾渴爲大小便不通妄下則裏虛爲滑泄爲滯下經
口必先歲氣毋伐天和言不可妄汗妄下也

凡疹初熱疑似之間切不可輕易用藥總有他證必待五日腮
下見疹方可用升表之劑嗽多連打嚏噴鼻流清涕或流鼻
血飲食減少好飲涼水只宜調理飲食戒麪食葷腥

一疹子初發熱時未見出現欬百十餘聲不已上氣喘急面

目胞腫時臥時起此火毒內蒸肺葉焦舉宜甘桔湯合白虎

湯加牛旁子薄荷主之○如疹出之時欬嗽口乾心煩者此

毒在心肺發未盡也瀉白散加天花連翹玄參黃連主之

疹子欲出未出之時宜早爲發散以解其毒則無餘患若不

預解使之盡出多致毒蓄於中或爲壯熱日久枯痺或成驚

癰或爲瀉痢或爲欬血喘促或作疳蝕而死此雖一時戾氣之染然永有不由於人事之未盡也

疹出沒八

一疹子出沒常以六時爲準假如子後出午後卽收午後出子後卽收乃陽生陰成陰生陽成造化自然之數也凡此旋出旋收者輕若一出連綿三四日不收者乃陽毒太甚宜大青湯或用荆芥牛旁子甘草玄參石膏桔梗主之○若逡巡不出者乃風寒外束皮膚閉密也宜荆防敗毒散主之

一疹已出而復沒者乃風寒所逼而然若不早治毒必內攻以

致痒瘍而死急用升麻湯加荆芥牛旁子甘草熱服則疹必復出而安矣

一發熱六七日以後明是疹子却不見出此必皮膚堅厚腠理閉密或爲風寒所襲或曾有吐瀉皆能伏也急用托裏散表之劑如麻黃湯去杏仁加蟬退升麻外用胡荽酒之類○如一向未更衣者必毒甚於內伏而不出局方涼膈散加牛旁子主之

一疹子只怕不能得出若出盡則毒便解故治疹者於發熱之時當察時令寒暄酌而治之○如時證大寒以桂枝葛根湯

或麻黃湯發之○時證大熱以升麻葛根湯或合人參白虎湯發之○不寒不熱以荆防敗毒散發之○如兼疫癘之氣以人參敗毒散發之○如盡一劑不出再作本湯服之外用胡荽酒又以苧麻醮酒遍身戛之務令亟出如三四作更不出加腹中脹痛氣喘昏悶則死證也

景岳曰按此萬氏之法極得隨時制宜之善已盡發表之義矣然發表之義亦最不易卽如營衛不足而疹有不能出者其證甚多若徒知發之而不知滋之則營衛有弱者非惟不能發而且恐窮其源矣此其或在脾胃或在血氣必得其神