

图 13

1442.

評選環溪醫案
二



評選環溪草堂醫案下卷

無錫王泰林旭高著

江陰柳寶詒穀孫選評

及門諸子 參校

腫脹門

○病起欬嗽欬止而反氣升入暮尤甚面跗龐然浮腫腹雖未滿而按之不軟此屬腎風蓋風邪乘虛而入於腎腎氣上逆故入暮而氣升為甚用五苓通膀胱導出腎中之邪加細辛以徹少陰之寒風晚上再進都氣丸以安其腎庶幾久蘊之邪得解而腎藏無傷切弗輕視此病須防腹滿之虞

五苓散 加大腹皮 陳皮 細辛 肉桂

另晚服都氣丸鹽湯送下

詒按腎風之名出於素問風論其所列證狀與此不甚符合但理可相通此案所立治法亦頗有精意蓋邪入於藏必借所合之府為出路以五苓加味治其膀胱以導出邪邪隨用都氣以培腎藏之本邪正虛實之間面面周到率爾操觚者固不能辨此也

○風溼相搏一身悉腫咽痛發熱欬而脈浮擬越脾法

麻黃 石膏 赤苓 甘草 杏仁 大腹皮 通草

詒按欬而咽痛肺有鬱熱故用越脾

○風水者在表之風邪與在裏之水溼合而為病也其證頭面肢體浮腫必兼欬嗽故為風水更兼食積其腹必滿三焦不利法當開上疏中達下若不避風恐其增重

羌活 防風 枳殼 萊菔子 杏仁 橘紅 川朴 茯苓 澤瀉

大腹皮

詒按證屬外風與內溼相合故用藥從表裏兩解之法

○內有溼熱外著風邪風與水搏一身悉腫此屬風水當發汗

羌活 香薷 陳皮 防風 赤苓 焦六麴 通草 生薑 蔥白

○水腫自下而起腿足陰囊大腹胸膈咽喉無處不受其災水勢泛濫浩浩莫禦矣今先從上瀉下蓋肺主一身之氣又曰水出高原古人開鬼門潔淨府雖曰從太陽著手其實亦不離乎肺也

葶藶子 杏仁 川朴 陳皮 茯苓 椒目 薑 棗

炒出汗

另控涎丹每服七分薑湯送下

○詒按病象已劇用藥自須從猛但控涎丹藥力猛銳不宜過於多服須酌之病後脾虛氣滯浮腫食少大便溏泄法當溫運脾陽

黨參 茯苓 澤瀉 木香 冬朮 炮薑 苡仁 神麴 砂仁 穀芽

詒按病後浮腫屬虛故兼培補○以上諸案均屬浮腫之病與腹脹單腹脹諸證之關乎藏氣者輕重淺深迥乎不同臨證者當細意分別勿混視也其有脫腹堅硬結塊者須與積聚癰癖門各案參看

○溼熱內阻腸胃之間橫連膜原膜原者藏府之外肌肉之內隔膜之所舍三焦決瀆之道邪留不去是為腫脹脹屬氣腫屬水是必理氣而疏決瀆以杜腫脹之萌

黑白丑

銕五

萊菔子

兩砂仁

兩用陳葫蘆

一枚將上三味

納入再入陳酒

一大杯隔湯

燉

一炷香取葫蘆中藥炒研為末再以葫蘆炙灰共研和每服二錢

詒按立方取義頗佳凡腫脹初起者可以取用

○痢後陽虛水溼不化腹滿面浮足腫而色青黃脈細慮延鼓脹重證擬溫通脾腎之陽疏利決瀆之氣冀其脹消腫退為妙

川附

肉桂

白朮

澤瀉

茯苓

豬苓

川朴

陳皮

通草

冬瓜皮

詒按病後陽虛腫脹故用胃苓法加溫運之品

○腹暴脹而足腫納食則脹益甚溼熱挾氣填塞太陰鼓脹重證

川朴

赤苓

大腹皮

青皮

澤瀉

枳殼

查炭

黑丑

甘遂

煨通草

薑皮

再診 腹滿稍寬足仍浮腫運脾化溼冀其漸平

川樸 茯苓 大腹皮 椒目 澤瀉 通草 陳皮 黑丑 蒼朮 神麴
枳殼 薑皮

三診 腹滿月餘得食則脹甚兩進攻消運脾之法胃脘之脹已鬆大腹之滿未化再議
疏通消導

旋覆花 五茄皮 澤瀉 雞內金 赤苓皮 檳榔 木香 黑丑 通草 砂仁

詒按此三方治腹脹之由于溼積者初起通用之法

附錄葉天士按云徐姓小兒單脹數月百藥無效余用肥兒丸萬安散磨積丹雞肥藥
俱不效余謂氣分不效宜治血絡所謂絡瘀則脹也用歸鬚桃仁延胡山甲蜣螂麤蟲
靈脂山查之類為丸十日全愈

詒按此等證本不多見但已經治驗自可存之以備一格

附錄吳按云腫脹久延腰痛帶下濁陰尚盛元氣已衰補則恐其助脹滲則慮其傷元
擬早上服金匱炒焦方但取其氣不取其味亦有離照當空陰霾四散之義晚仍進清
滲之方以勝脫為氣化運行之府也表裏兼治漸次圖功庶本德盛行之候不致加劇耳
詒按病難著手者不可無此巧法有以五苓五皮煎湯送炒黑金匱腎氣丸者正與
此相似

○瘥後溼熱內蘊於脾胃之中熱上蒸而為口糜溼內蘊而為腹脹擬和中清化溼熱為法

川連炒酒 川朴 焦麴 赤苓 枳殼 大腹皮 澤瀉 陳皮 黑梔 砂仁

○詒按案方俱平正通達特未知能否奏效耳

○病由肝鬱木橫克土溼熱不化先有淋濁愈後漸漸腹脹左脇微覺隱痛身微有熱脈象細弦木鬱不達慮延鼓脹勿輕視之

柴胡 茯苓 白朮 香附 川芎 山梔 神麴 丹皮 白芍 青皮 川朴 香圓

另左金丸 詒按立方精當雖不見出色而已恰到好處

○氣鬱於胸為膈氣滯於腹為鼓飲食不納形肉頓瘦陰氣疑聚陽氣汨沒脈細如絲將何療治姑與扶正培土通陽化氣為法

黨參 熟附 肉桂 澤瀉 白朮 茯苓 大腹皮

另來復丹錢 詒按病已造乎極重此方藥力之猛足以制之從此得效尚可勉圖

○痞塊由大瘕日久而結多因水飲痰涎與氣相搏而成久則塊散腹滿變為臌脹所謂癖散成臌也脈細如絲重按至骨乃見弦象是肝木乘脾也口乾小便短少是溼熱不運也西月腹日加大急宜疏通水道泄木和中

五苓散 加川朴 川連薑汁 青皮 陳皮 大腹皮 木香 車前子 通草

另服古方厚朴散 川朴薑汁炒 枳殼三錢 合炒黃去巴豆 木香三錢 青皮醋炒 陳皮三錢

鹽水 甘草三錢 大戟水浸晒乾 乾薑三錢 共為末每服錢用砂仁車前子泡湯調下



治按此治癖散成膿之妙劑凡遇此等大證必乘早圖治若日久正虛便費周折矣
錄此以為臨證者一隅之取

○暑溼挾積阻滯腸胃中州不運大腹驟滿腹中時痛痛則大便黏膩色紅似痢米水短
少診脈沉而滑數是積之徵也擬大橘皮湯送下水香檳榔丸

橘紅 白朮 赤苓 澤瀉 猪苓 大腹皮 滑石 木香 砂仁 川朴

另木香檳榔丸錢三 治按病兼滯利故須先從腸府疎導

再診 氣與水相搏大腹驟滿小便不利大便欲泄而不泄法以疎氣逐水

香薷 茴香 澤瀉 枳殼 赤苓 萊菔子 甘遂 大戟 黑丑 白丑 生薑

治按此方專逐水積力量頗猛想其正氣尚旺故可放手用之

頭痛門

○情懷鬱勃肝膽風陽上升右目昏蒙左半頭痛心嘈不寐飢而善食內風掀旋不熄痛
勢倏忽無定營液消耗慮其瘕厥法以滋營養液清熄肝陽務宜暢抱庶克臻效

大生地 元精石 阿膠 天冬 羚羊角 石決明 女貞子 滁菊 鈎鈎

白芍

再診 服滋陰和陽法風陽稍熄第舌心無苔心嘈善飢究屬營陰消燂胃虛而求助於

食也議滋柔甘緩



安徽大學圖書館藏

大生地 石決明 麥冬 阿膠 大麻仁 女貞子 洋參 白芍 茯神 橘餅

詒按此養陰柔肝之正法與前人復脈定風阿膠雞黃等法用意相合

諸竅門

○鬱怒傷陰木火上乘竅絡耳生瘰癧內名曰耳菌最屬淹纏久久不已防有血出翻化之變

生地 丹皮 北沙參 元參 遠志 鈎鈎 羚羊角 石決明 刺蒺藜 滁菊

另用藜蘆 腰黃 硃砂

上三味皆少許為細末點入耳中立效

○膽熱移腦為鼻淵肝熱移肺為鼻痔病根日久難以卒效

羚羊角 丹皮 黑梔 甘菊 元參 辛夷 蒼耳子 石決明

另用雄黃月石水片研末搐鼻

詒按耳菌鼻痔均屬外證須另用專方治之先生長於外科故用藥自然絲絲入竅

○暑邪濕毒走入營中遍身驟發紫黑藍斑鼻血齩腐此屬發斑牙疳之險證倘至壯熱

神昏不可挽矣

羚羊角 犀角 黑梔 丹皮 銀花 連翹 鮮石斛 鮮生地 知母 蘆根

詒按此證於清營中宜稍參疏透之意



○少陰腎水不足陽明胃火有餘牙宣出血晡時微寒壯熱而其脈極細此素體之陰虧也當憑證論治用景岳玉女煎

生地 知母 牛膝 川連 石膏 麥冬 薄荷 蘆根

詒按此證之脈細想係素稟如是若云陰虛未必脈細也總之須見證確有可據乃可舍脈從證未可冒昧以將事也

痧疫門

○爛喉痧證來勢甚暴甫周一日丹疹密隱咽喉已腐壯熱無汗大便泄瀉煩躁渴飲腹按之痛邪不外達熾盛於裏燎原之勢不可嚮邇恐其遽爾內陷昏喘生變現在方法辛涼透散通同一律無所短長鄙見莫若且用涼膈散上者上達表者表達裏者下達庶幾熱從外出而痧透火從下洩而躁安按內經病機暴注下迫皆屬於熱仲景方論急下之法正以存陰幸勿拘現患泄瀉而遂謂不可再下也雖然智愚千慮各有得失尚祈高正是荷

涼膈散 加牛蒡子 桔梗 枳實

詒按既患丹痧則營絡中必有熱邪方中丹皮鮮地銀花元參等味斷不可少

再診 投涼膈散煩躁略安脫痛已止胸膈之燭稍衰其勢而咽喉紅腫乾效倉逆上炎之火未熄其威況丹痧一片點粒模糊證交三日正屬邪張之際尚在險途未歸坦境擬

方再望轉機為妙

犀角 連翹 元參 川貝 桔梗 鮮石斛 牛蒡子 鮮薄荷根 蘆根
○痧回熱減溫邪初退之餘咽喉反腐虛火又從而附之良由久患喉痺陰虛火亢熱淫
搖動元氣復張用方最宜加謹過清恐傷脾胃早滋恐戀餘邪姑擬甘涼法平調肺胃冀
得上焦清肅

鮮石斛 大貝 元參 生草 丹皮 沙參 羚羊角 扁豆 稽豆衣 雪梨
詒按看似平淡無奇實已斟酌盡善

腳氣門

○暑雨潮濕濕從下受入於經絡兩足腿股痠楚不能屈伸起卧轉側均覺艱難此屬腳
氣適值經行之際少腹室塞小便澀痛溼熱自氣傷營故舌苔白而底絳脈形濡身微寒
熱慮其有氣逆衝胸之變擬東垣防已飲加減

防已 薏仁 萆薢 秦艽 獨活 桑寄生 牛膝 木通 防風 歸尾 延胡
威靈仙 澤蘭 絲瓜絡

詒按此溼熱注於經絡之病與載入類傷寒中之腳氣宜用雞鳴散者不同

再診 兩足稍能行動溼熱有流通之機仍宗前法增損兼參健步丸意

防已 萆薢 獨活 牛膝 杜仲 晚蠶砂 木瓜 當歸 延胡 秦艽 桑枝

絲瓜絡

遺精門

○病由喪子悲憤抑鬱肝火偏盛小水淋濁漸至遺精一載有餘日無虛度今年新正加
以左少腹羣丸氣上攻胸心神狂亂齟血目青皆肝火亢盛莫制也經云腎主閉藏肝司
疏泄二藏皆有相火而其系上屬於心心為君火君不制相相火妄動雖不交合精亦暗
流而走泄矣治法當制肝之亢益腎之虛宗越人東實西虛瀉南補北例

川連

黑梔

延胡

赤苓

沙參

川棟子

鮮地

知母

黃柏

龜板

另當歸龍薈丸

錢一開水送下

詒按遺泄有專屬乎肝者此等證是也此方可引以為例

再丸方

川連

鹽水炒

苦參

煨二

白朮

米油浸

兩

牡蠣

煨三

共研末用雄豬肚

一個將藥末

納入肚中以綫紮好以水酒各半煮爛將酒藥末共打如嫌爛加建蓮粉拌乾作丸每

朝服三錢

詒按此劉松石豬脂丸方也加川連一味

○左尺極細寸關微而似數右三部俱絃滑下有遺精暗疾肛門癢而出水上則頭眩耳
鳴舌苔粉白以脈合證腎陰下虧而淫熱相火下淫上混淆竅為之蒙閉法當補腎之陰
以清相火清金和胃分利膀胱以化淫熱

大生地

蛤粉

龜板

牡蠣

懷山藥

麥冬

萆薢

澤瀉

赤苓

丹皮

知母

半夏 黃柏

詒按病源分析極清用藥亦熨貼周到

又九方

大生地

砂仁陳酒拌蒸

冬朮

土炒

黃連

鹽水炒

苦參

天麻

懷山藥

丹皮

鹽水炒

牡蠣

麥冬

元米炒

龜板

酥炙

川芎

半夏

芡實

草薢

鹽水炒

澤瀉

鹽水炒

赤苓

黃柏

鹽水炒

知母

鹽水炒

石藥

為末

用建蓮粉

四兩

神麴

四兩

煮糊

搗丸

詒按此方用丹溪大補陰丸合封髓猪脂分清等法而成腎虛有溼熱者用之頗合或乃以苦寒疑之是未識製方之妙義也

小便門

○先腹痛數日遂至小便不利少腹脹滿如鼓今已半月屢用通利之藥小便雖通不爽少腹脹滿益甚診脈絃緊舌苔白膩飲食少納身無寒熱大便頻泄黏膩如痰此中陽不足水溼泛溢膀胱氣化無權法當溫土以禦水寒通陽以化溼濁

乾薑

炒

肉桂

茯苓

澤瀉

茅朮

木香

茴香

詒按因舌膩便痰故知其為寒溼惟先曾腹痛則方中又宜兼通氣分擬再加牛膝烏藥再診張先生用平胃化胃中之溼濁五苓通膀胱之氣化簡淨的當無從增損愚意複

入半夏一味暗合通澈陰陽之路使水溼痰涎從小便出是亦古人加減成方之心法也

半夏

茅朮

川朴

陳皮

甘草

茯苓

猪苓

肉桂

澤瀉

○腎虛精關不固溼熱混於坎宮精從溺後而出左脈虛細右脈洪大陰虧而相火勝也
補腎陰化溼熱用涼八味法

涼八味湯加萆薢

另威喜丸錢淡鹽湯送下

再診 精濁稍止而兩足重墮無力欬胸痛金水兩虧溼熱不化擬清暑益氣以化溼
熱兼固腎陰

洋參 黃耆 茯苓 五味 神麴 麥冬 蒼朮 白朮 陳皮 前胡 通草

另知柏八味丸

三診 精濁已止腿足重墮無力舌苔白而惡心坎宮之溼熱雖清胃家之溼熱猶戀擬
和中化溼法

豆卷 半夏 茯苓 陳皮 麥冬 沙參 扁豆

另資生丸

四診 腎虛胃溼胸悶惡心口沃清水凡大便時則精竅自滲如膩濁擬滲胃溼固腎
精

熟地 五味 蒼朮 白茯苓 沙苑 炮薑 黃柏 建蓮

另威喜丸 詒按凡腎虛胃溼之病用藥甚難著手第一方專顧腎第二方腎胃兼顧

第三方專治胃第四方兩層合治從黑地黃丸加味最有巧思

○淋濁日久不痛口常甜膩此腎虛而有溼熱也

蒼朮

兩分

四分

酒炒一分

用米

油水

浸透

晒一分

用鹽

水炒一分

用

破故紙

三錢

研末

拌炒

去故紙

一分

用

黃柏

四分

作四分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

一分

鹽水

炒一分

生晒

一分

酒炒

一分

去

益智

仁

末

三錢

拌炒

去

益智

仁

蓮蕊

鬚

馬料

豆

製首烏

茯苓

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

生草

共研細末懷山藥粉煮糊為丸

詒按腎虛而兼溼熱者用藥甚難觀此方取意極佳惟於腎虛一面尚可增入沙苑

兔絲龜板之類

○腎開竅於二陰前有淋濁之新恙後有腸紅之舊疾皆由於陰虛而有溼熱也寓育陰於利水清熱之中猪苓湯合加味槐花散主之

茯苓

猪苓

阿膠

生地

槐米

枳殼

六一散

血餘炭

側柏炭

詒按兩證貫串一綫用藥自然親切

再診

便血已止淋濁未清今當固本

芡實

芡草

洋參

麥冬

黃柏

生地

茯苓

沙苑

砂仁

蓮肉

懷山藥

另八仙長壽丸每服三錢開水送下

○小便頻數溺後有血絲血塊此膀胱有熱腎虛有火逼衝任之血而下走前陰也法當通瀉兼行

生地炭 阿膠諸黃炒 川蓮 龜板 赤苓 黃柏鹽水炒 大黃醋炒 血餘 車前子 藕

另血餘炭二錢 血珀一錢 研末分兩服 雞子清調下

再診 血止小便頻數氣墮擬補陰升陽法

生地 牡蠣 茯苓 龜板 懷藥 丹皮 杜仲 黨參 建蓮 鹿角霜

詒按兩方用藥極為周到所嫌者平實而已

○淋濁三年不止腎虛溼熱不化陰頭碎癢筋骨微疼六味補腎能化溼熱耐久服莫

計效遲

大生地 懷藥 茯苓 萸肉 丹皮 澤瀉 五味 麥冬 益智仁 湘蓮肉

詒按六味能化溼熱其理頗精擬再加黃柏牡蠣又按此證陰頭碎癢筋骨微疼疑

有瘡毒內戀而然

○雜藥亂投諸病不除中氣早戕故腹中不和大便不暢至於本病精濁清混亦脾虛溼

熱所致

萸解 益智仁 半夏 陳皮 黨參 黃柏 烏藥 石菖蒲 兔絲子

詒按精濁清混四字將病情包括無遺用藥亦清靈不滯

痢疾門

○從來肺有積熱者大腸必燥以相為表裏故也三五年來屢發喉證肺熱可知今秋齧



腫出血多服涼藥及西瓜等物遂患下痢赤白常有乾糞夾雜其中延及百日近見醫藥而痢反更甚此必有故夫脾受瓜果之寒溼既下流於大腸而為痢則大腸之燥當除今獨不然竟若燥與溼各樹旗幟相為犄角之勢豈非以脾屬中土而主溼大腸屬燥金而主津津虧則燥益堅脾虛則溼愈甚耶昔秦氏論痢有溼火傷氣燥火傷血之分此則溼燥兩傷擬撰一方潤燥兼行氣血兼理或通或塞均非所宜

全瓜蒌

錢六

當歸

錢五

木香

錢五

川連

酒炒五分

甘草

四分

升麻

三分

陳火

腿足骨一錢

詒按論病切實不浮方亦穩適微嫌氣分藥尚少恐機關不能靈動耳

○伏暑溼熱之邪挾積內蘊胸痞嘔惡發熱舌燥通府之後變為下痢痢色紅白膩凍仍然痞塞嘔惡飲食不納勢成禁口重證須得胃開納穀痢減不嘔為妙閱諸高明方層次轉折各有主意姑擬一方商正

川連

酒炒五分

黃芩

酒炒八分

白芍

炒錢五分

青皮

八分

川朴

五分

陳皮

鹽水炒八分

神朮

三錢

茯苓

三錢

北沙參

四錢

砂仁

八分

生熟穀芽

各二錢

玫瑰花

二朵

原註此病嫌其兩脈虛濡脾胃元氣大弱似乎宜參入扶正為善然下痢一證古稱

滯下起於溼熱居多早補早飲往往受累此河間苦辛宣通府滯之法所以為痢門

必採之方若夫深刻工夫補陰補陽治脾治腎都為久痢而設尚非此時議論所以

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

甯落輕淺不用深重之劑蓋行遠自邇之意云爾

詒按閱是方者有病重藥輕之疑故方後申言其意

○奔走遠行傷飢飲酒脾胃受病病成休息下痢痢經兩載不愈許學士香茸丸最妙但嫌其價昂且藥肆無此現成丸料今姑師其意而變湯服

木香 丁香 杜仲 當歸 白芍 炮薑 茯苓 砂仁 鹿角霜 鬼絲解

詒按此脾腎兩治而專重於腎者○查原方皆用鹿茸沉香麝香無用丁香者煎劑中宜改用沉香為穩

○脈經云代則氣衰細則氣少多指陽氣而言今下痢而得是脈脾腎之陽微特著况形衰畏冷而小便清長乎惟下痢赤者屬血分腹中痛者為有積立方當從此設想蓋尋其鏘而通之補之亦治病之巧機也

附子枳實理中湯送下駐車丸

詒按看病於虛中求實極其精審方亦的當

○便痢白膩如水晶魚腦色小便不利少腹偏右板窒諸醫以為腸癰固亦近是然考腸癰為病有寒有熱金匱並出二方如大黃牡丹湯薏仁附子敗醬散概可見矣此證則屬寒積試觀脈絃緊而不數面色青而不渴是其徵也鄙意宜用溫通備候商訂

肉桂五苓散 加砂仁 查肉

再診 溫通已效仍從前法