

東
華
寶
鑑
十

東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉

教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。○傷寒汗不浮者蒼朮白虎湯主之。吐汗下後口乾

舌燥脈洪

大人參白虎湯主之。○凡得病五六日而渴欲飲水不能多者不當與之。何者以腹中

熱尚少

不能消故也。至七八日大渴欲飲水惟當少與之常令不足勿極意也。言能飲一斗只與五

升若腹滿小便不利若喘若癓者不可與

渴咽乾者少少潤之令胃氣和則愈。○渴欲飲水入卽吐名曰水逆五苓散主之。○渴欲飲水入裏則渴奪津液而然也。然有渴必有煩者

病渴欲飲水者少少與之愈。

○熱在表則不渴。○厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴。渴屬太陽宜白欲

腎主水熱

深入則渴深則水竭而渴肝木挾心火以生煩故者

水爲欲愈者傳經已盡也。○脉浮而渴屬太陽

宜白欲

虎湯汗多而渴屬少陰宜猪苓湯門○凡渴欲飲水常令不足爲善經云若還不能飲非其治強飲須教別病生醫○有熱宵中有寒也仲景

○不點陰盛隔陽之證亦漱口燥渴而漱水

五苓散

治太陽證

入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢半肉桂五分右

爲末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服○傷寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛

燥或飲水不散而反吐出爲水逆證或飲水雖多

而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓

散的藥也

門入

竹葉石膏湯

治傷寒解後餘熱及陽明證

自汗煩渴并差後虛煩等證石膏四錢人參二錢甘草七分右剉作一貼

麥門冬一錢半夏一錢甘草七分右剉作一貼

入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服人門

傷寒潮熱潮熱者若潮水之潮其來不失時也一日五發者是一日

即發熱非潮熱也。陽明之爲病，胃家實也。胃實則譫語，乃爲潮熱也。陽明之爲病，胃家實也。胃實則譫語。

日晡○

潮熱者，必於日晡時發者，謂之潮熱。一日一發，謂之潮熱。

而作陽明

旺於未申

故耳

諸承氣

湯選用下

理明

之或潮

於寅卯者

屬少陽

或潮於巳午者

屬太陽

之爲邪

未入胃

俱宜小柴胡湯和解之門○吐下後

爲邪

未入胃

俱宜小柴胡湯和解之門○吐下後

不大便

潮熱若劇則不識人循衣摸

床微喘直視脉弦者生脈濇者死

剝

傷寒發狂

發狂者

熱毒在胃

併入於心

使神昏不定

言妄笑甚則登高而歌棄衣而走

踰垣上屋不食不卧

非大吐下不止

表裏俱熱

宜大承氣湯加黃連

狂言譫語

三黃石膏湯裏熟盛

宜大承氣湯加黃連

狂言譫語

三黃砂五苓散門○如狂者

但睡中忽欲起行

錯言妄語非若發狂

莫能制也門○陽毒發狂

宜用妙香

語言宣辰

砂五苓散門○如狂者

但睡中忽欲起行

錯言妄語非若發狂

莫能制也門○陽毒發狂

宜用妙香

陽毒升

麻湯陽毒施子湯坊見

活龍散破棺湯水漬法火刲法○

凡發狂見陽證

○

喜忘如狂蓄血證也

活○凡發狂見陽證

門○

陽脉者順見陰脉舌卷囊縮者死

門○

陽脉者順見陰脉舌卷囊縮者死

門○

陽脉者順見陰脉舌卷囊縮者死

門○

陽脉者順見陰脉舌卷囊縮者死

門○

陽脉者順見陰脉舌卷囊縮者死

門○

陽脉者順見陰脉舌卷囊縮者死

門○

三白飲

治傷寒

熱病

極狂走雞子清一箇白蜜一

匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

大匙芒硝三錢右合作一處涼水調下

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事

徐徐灌盡漸次涼快若熟熾則

加片腦尤妙名曰地龍水門

水漬法

治發狂炭火二益置病人之前將醋一椀急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

火刲法

沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水漿亦可俗名野人乾水韓

細研如麵新汲水調下三

傷寒譖語

鄭聲實則譖語虛則鄭聲譖語者謂亂語無次第數數更端也鄭聲者謂鄭重頻煩

也只將一句舊言重疊言之也

○陽明病胃

○大小便利手足冷脈微細者必鄭

○陽明病胃

聲宜用白通湯大便秘小便赤手足溫脉洪數者

○譖語宜用調胃承氣湯活

○譖語有實有虛實

則可下虛不可爲實者胃實有燥屎可下之虛者
腸胃自利也難治門○傷寒大熱呻吟錯語不得
眠黃連解毒湯主之活○書丹明了夜則譖語如
見鬼乃婦人熟入血室證也人活○傷寒發熱譖語如
宣柴胡連翹湯醫

黃連解毒湯治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏梔子

剉子各一錢二分半右水煎服活

柴胡連翹湯治傷寒發熱譖語呻吟睡卧不得柴胡連翹黃連黃芩枳殼赤芍藥桔梗爪姜仁梔子仁

剉作一貼入薑三片水煎服醫

傷寒結膏傷寒若脉浮緊下之必結膏癰○病發於陽而反下之熱入因作結膏癰○傷寒表未解

醫反下之隔內拒痛手不可近一云心下滿而硬痛此爲結膏宜大陷膏湯肿○若按心下硬痛手不可近大陷膏湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者死膏

陷
醫
膏
湯
醫

○
寒
實
結
膏

者
正
在
心
下

按
之
則
痛
脉
浮
滑
宜
小

白
散

陷
膏
湯
醫

○
寒
實
結
膏

及
寒
實
結
膏

無
熱
證
者
宜
三
物

活
人
書
不
拘

陷
膏
湯
醫

○
寒
實
結
膏

及
寒
實
結
膏

活
人
書
不
拘

人
書
不
拘

陷
膏
湯
醫

○
寒
實
結
膏

及
寒
實
結
膏

活
人
書
不
拘

人
書
不
拘

陷
膏
湯
醫

○
寒
實
結
膏

及
寒
實
結
膏

活
人
書
不
拘

人
書
不
拘

大陷膏湯

治大結

膏大黃三錢芒硝二錢甘遂末五分二貼每取一貼先煎大黃至六

分納硝再煎一二沸去滓納甘

逐末攬服得快利止後服斂

小陷膏湯

治小結

膏半夏製五錢黃連二錢半瓜蔓一右剉作一貼水二盞先煎

瓜蔓至一盞乃入半夏黃連煎至半去滓溫服未

利再服利下黃連便安剉

一方加枳實黃芩桔梗

梗尤效入瓜蔓惟剉其殼勿剉其子剉其子者非也

而愈頭汗

只以小柴胡合小陷膏

三物白散

治寒實結膏桔梗貝母各三錢巴豆去皮心熬研如脂一錢右爲末和匀白湯和服

半錢弱人減半或吐或利不利進熟粥一椀利不止進冷粥一椀門

大陷胸丸

治熟實結膏大黃五錢葶苈子炒杏仁炒芒硝二錢半甘遂二字右爲末蜜丸彈子大每丸水一盞

前丸六分溫服未利再服四帖

灸法

詳見膏部

熨法

詳見膏部

傷寒藏結

病有結膏有藏結其狀何如答曰按之痛寸浮關脉沉名曰結膏也何謂藏結答曰如

結膏狀緊名曰藏結舌上白胎滑者難治

如故時時下利寸脉浮關脉細小沉

素有痞連死牽歌曰飲食如常時下利更

加舌上白胎滑者此名藏結元來死不醫

飲連膈痛引陰筋者藏結入素如結膏

有膏

痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不
通亦名藏結慎不可下止宜小柴胡加生薑以和不
表灸開元以回陽解陰結危哉○藏結與結膏者爲結
相似皆下後邪氣入裏與陽相結在膏者爲結膏
無陽證不往來寒熱或但寒不熱其人反靜飲食

傷寒痞氣

病發於陰而下滿而不痛此爲痞○傷寒嘔而半夏瀉心

筋俱痛者丹田有熱膏中有寒所以難治門
如常時時下利舌上白胎脇肋臍腹引八
筋俱痛者丹田有熱膏中有寒所以難治門

濡其脉關上浮者三黃瀉心湯主之○心下痞硬按之
關脉須沉若關脉浮者宣此湯剝○心下痞硬按之

惡寒汗出者附子瀉心湯主之○心下痞硬按之
數十行穀不化腹雷鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃

結熱乃胃中虛客氣上逆也甘草瀉心湯主之○心下痞硬按之
雷鳴○汗解後胃不和心下痞硬脇下有水氣腹中證

桂枝人參湯主之○利下利不止心下痞硬表裏不解
桂枝人參湯主之○利下利不止心下痞硬表裏不解

半夏瀉心湯

半夏製二錢黃芩人參甘草各一錢半乾薑一錢黃連五分右剉作一貼入薑

水煎服

三片棗二枚

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以麻沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫服

再剉

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮二錢別煮作汁右取百沸湯一盞入三味漬

之良久去滓納附子汁分溫再服剉

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩乾薑各一錢半半夏製人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

枳棗三枝

水煎服

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參乾薑各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一貼

貼入棗三枚

水煎服

桂枝人參湯

桂枝另剉一錢半
乾薑各一錢半

甘草炎各一錢八分
白朮人二盞

煎至一盞入桂枝煮取
七分去滓溫服日二劑

傷寒筋惕肉瞤

寒筋陽身瞤發汗太過所致也

古人以理明之。○傷

潤者動也。蓋汗多則傷血虛無以榮筋筋愈急

而四體百骸俱爲之瞤動宜以四物湯去地黃加

人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂爲佐入生薑

傷寒除中證

厥而利反能食者曰除中不

治。○邪在表則其死也可立待也。○厥

下利脉遲當不能食邪在裏則不能食今傷寒厥深

○試食而反能食者名曰除中中之

門食恐爲除中可再復門。厥利當不能食今反能

者非除中知胃氣尚在必愈也。

傷寒血證

太陽病六七日

袁證因在脉微

而沉反不結

其人如狂者以熱在下焦

小腹當滿

自利者

下血乃發狂

當利者

血證

亦當利也

傷寒小腹

硬滿應小便

不利今反利者

爲有血也當

當利者

似狂若血

自下者自愈

但小腹急結者

宜攻之宜

麻黃湯

桃仁承氣湯

附桂枝湯

附桂枝湯

附桂枝湯

附桂枝湯

浮緊身疼惡寒

發熱則汗之可也

汗則犀角地黃湯

主下

厥上

方瀕血門

少陰病強發汗

血出九竅

是名下

後脣沉耳聾

膾膾痛俗名血

汗病也犀角地黃湯合

午

合

小柴胡湯

主之

抵當湯

治一切瘀血結

膏譜語漱水等證

水輕炒寅

炒去足翹桃仁留尖各十枚大黃蒸三錢

右剉

作一貼

抵當丸

治蓄血在下而無身熱便黑喜忘飲狂等證

利者宜用此緩以之水蛭等證

蜜虫各七箇桃仁六箇大黃三錢右爲末蜜和分作二丸水一盞煎一大丸至七分頓服未效再服

桃仁承氣湯

治

宣此文之大黃三錢桂枝一錢芍藥三錢甘草一錢

芒硝一錢桃仁留尖十枚右剗作一貼

大黃小腹結急便黑譫語漱水

芒硝各二錢

傷寒自利

傷寒陰證溫服以痰血盡下爲度

玄武湯引

太陰證身痛脈沉大便自利或嘔

○太陰宜柴芩湯中湯引

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰也脾腹痛少陰也

柴芩湯

治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

○太陰發熱泄瀉柴胡一錢白朮

傷寒脅痛

傷寒脅痛

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

爲結膏若未經下者非結膏也乃邪氣

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

○太陰也脾腹痛少陰也

膏加枳桔一服如神醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

醫○若小腹硬痛小便不利則爲蓄血之證挑仁承氣湯下之若小便不

利則爲尿證之證正苓散利之若亦腹遠臍硬痛

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

小便澀大便實者有癰腫

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

傷寒吐蛔死蓋胃中有寒則蛔不安其所而上膈大齒

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

之兆也急用理中湯

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

煎服待蛔定却以小柴胡湯退熱

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

陰陽交證黃帝問曰有病溫者汗出輒復

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

名陰陽交交者死也帝曰願聞其說岐伯曰躁

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

肉而得汗者是邪氣也汗者精勝也精勝則當能食而

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

復熱者是邪勝也且夫熱論曰精無俾也汗出而

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

其壽可立而傾也

醫○若心下張滿而不痛者乃痞氣也宜瀉心湯加枳桔

者死狂言者是失志失志者死經○發汗後脉躁
疾狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不

可死證也

門八

病經汗下溫鍼不解及過經不解皆名壞證或

寒變爲溫瘧重感風變爲風溫

毒重感疫氣變爲溫疫又太陽

醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久

而不差視其犯胡湯餘熱以治之表證多者參

胡芍藥湯危

壞證

傷寒病未退爲溫瘧

變爲溫瘧

重感風變爲風溫

毒重感疫氣變爲溫疫又太陽

寒變爲溫瘧重感風變爲風溫

醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久

而不差視其犯胡湯餘熱以治之表證多者參

胡芍藥湯危

知母麻黃湯

治壞傷寒以傷寒差後經久

精神不守

錯謬或潮熱頰赤寒熱

如瘧皆由

汗下不盡毒留心胞間所致也

知母三錢

麻黃一錢

黃芩甘草各一錢右剉

作一貼水煎

參胡芍藥湯

治傷寒枝

不能安卧

十四日外餘熱未除或渴或煩

服微汗即愈

本去桂心代桂枝

一

小便不快

小便黃

赤此爲壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分右剉作

一貼入薑三片水煎服

奪命散

治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽一證不明過

及或因誤服藥因重垂死一切危急過

之證好人參一兩剉作一服水二升於銀石器內

煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻梁

上出涓涓如水是藥之效也一名獨參湯

鱉甲散

治壞證諸藥不效鱉甲二錢犀角前胡黃芩生地黃各一錢枳殼八分烏梅二箇右剉作

煎服水一貼

百合證

大病後未平復失於調理餘證在陽醫反

在陰醫反汗之以此百脉一宗悉致其病無復經絡故謂之百合傷寒其證常黑然欲食不能食欲行不能行或有時聞食臭下之或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能和其脉微能治藥入口卽吐利如有神靈身形雖似和其脉

不能復經絡故謂之百合傷寒其證常黑然欲食不能食欲行不能行或有時聞食臭下之或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能和其脉微能治藥入口卽吐利如有神靈身形雖似和其脉

數每尿

時輒

頭痛者

六日乃

愈若尿

時頭不痛

浙然者四

十日愈若尿

時快然

但頭眩者二

十日

愈若尿

時頭不痛

浙然者四

十日愈若尿

時快然

但頭眩者二

十日

愈若尿

時頭不痛

浙然者四

十日愈若尿

時快然

但頭眩者二

十日

愈若尿

時頭不痛

日愈宜

用陶氏

柴胡百合湯

百合知母湯

百合地黃湯

百合滑石散

百合洗方

百合煎

百合病

百合及勞復等證

百合地黃湯

百合陳皮

百合地黃湯

百合鱉甲醋煮

百合地黃湯

百合洗方

百合主

者以其能和合百脉也

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

門

陶氏柴胡百合湯

治百

合病

及勞復等證

知母生

地黃

陳皮

地黃

鱉甲

醋煮

地黃

百合知母湯

治汗後

百合證

知母一兩

白沫去其水

當白沫出

宿當白沫出

百合知母湯

治汗後

百合證

知母一兩

白沫去其水

當白沫出

宿當白沫出

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

百合滑石代赭湯

治下後

百合證

七枝雞子黃

一箇

滑石三

兩

右煎如上法

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

服

百合雞子湯

治吐後

百合病

百合七枝

雞子黃一箇

當白沫出

去其箇

當白沫出

當白沫出