

萬病回春

已 4

71-2

共 8 冊

新刊萬病回春原本卷之八

太醫院吏目金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

癰疽

脉癰疽脉數浮陽沉陰浮數不執但惡寒侵若知痛處急多或針洪數病進將有膿潰滑實緊促內消可禁宜托裏者脉虛濡遲或孔潰微潰後亦宜長緩易治短散則危結促代見必死無疑

瘡瘍之症當察經之傳受病之表裏人之虛實而攻補之假如腫痛熱渴大便閉結者邪在內也疎通之腫焮作痛寒熱頭疼者邪在表也宜發散之焮痛痛甚者邪在經絡也和解之微腫微痛而不作膿者氣血虛也補托之漫腫不痛或不作膿或膿成不潰者血氣虛甚也峻補之色黯而微腫痛或膿成不出或腐肉不潰者陽氣虛寒也溫補之若疑其未潰而禁用敗毒損脾胃不惟腫者不能成膿而潰者亦難收斂七惡之症蜂起多致不救經云諸痛癢瘡瘍皆屬心火若腫赤煩燥發熱引冷使閉作渴脉洪數實是其常也雖在嚴寒之時必用大苦寒之劑以瀉熱毒若脉微皮寒瀉痢腸鳴飲食不入嘔吐無時手足逆冷是變常也雖在盛暑之時必用大辛溫之劑以助陽氣經日用寒速寒用熱速熱有假者反之雖違其時必從其症

癰疽大按乃痛者病深小按便痛者病淺按之處陷不復者無膿按之處即復者有膿不復者可消若按之都牽強者未有膿也按之半軟者有膿也又手按上下不熱者無膿若熱甚者有膿凡覺有膿急當破之無膿但氣腫若有血憤之憤之不可針破也

癰者大而高起屬乎陽六腑之氣所生也

疽者平而內發屬乎陰五臟之氣所成也○癰疽未破毒攻臟腑一毫熱藥不敢用若已潰破臟腑既虧飲食

少進一毫冷藥不敢用也

瘍者癰疽未見膿而腫也○腫瘍內外皆變宜以散毒表散為主說欲行大黃者宜審其虛實之原

癰疽初起之時宜○灸法○治癰疽發背初生累試累効

凡人初覺癰疽發背已結未結赤熱腫痛先以濕紙覆其上立視候其欲先乾處即是結疽頭處取大蒜切成片如三個銅錢厚安在頭上用火艾壯灸之三壯換一蒜片痛者灸至不痛不痛者灸至痛時方住最要早覺早灸為上方發一二日者十灸十愈三四日者六七愈五六日者三四愈過七日則不可灸矣若有士數頭作一處生者用大蒜搗成膏作餅子鋪瘡頭上聚艾燒之亦能安也若背上初發赤腫內有一粒黃如粟米者即用獨蒜切片如前灸法治之次日去痂膿自潰也

○竹筒吸毒方 諸般惡瘡並治○用荅竹長一二寸用頭節妙刮去青皮似紙薄為佳其大小隨瘡斟酌應毒瘡初發時用 白蔹 藜 蒼朮 烏相皮 川厚朴 製五錢重○右四味剉片用水一碗同煎竹筒煎煮以

藥將乾為度乘竹筒熱以手按之於瘡上頂之其筒自粘在瘡上不必手按也仍更用前藥分兩再煮候竹筒冷以手拔去再換熱者如前法其膿自吸入筒中而愈

荊芥敗毒散○治癰疽疔腫發背乳癰等症壅塞壯熱甚者頭痛拘急狀似傷寒一二日至四五日者一二劑散其毒輕者內自散○防風 荊芥 羌活 獨活 柴胡 前胡 薄荷 連翹 桔梗 枳殼 川芎 茯苓 金銀花 甘草 大便不通加大黃芒硝熱甚痛急加黃芩黃連右剉生薑煎服瘡在上食

後服在下食前服

○千金漏蘆湯○治一切惡瘡腫毒丹瘤瘰癧疔腫魚睛互發癰疽初覺一二日便如傷寒頭痛煩渴拘急惡寒肢體痠痛四肢沉重恍惚悶亂坐卧不寧皮膚壯熱大便閉結小便赤黃並治姙婦勿用 漏蘆 白蘆 黃芩 麻黃 枳實 送炒 升麻 芍藥 甘草 炙 大黃 芒硝 連翹 右剉作劑水煎服

○追風通氣散○治癰疽發背腦疽流注腫毒救壞疾活死肌弭患於未萌之前拔根於既愈之後此藥順氣

勾血扶值胃本不傷元氣滌蕩邪穢自然通順不生變症兼治打破傷折症氣血症脚氣諸氣痞寒塊痛腰痛一切痰飲為患 當歸 何首烏銹脫木通去皮 赤芍 白芷 烏藥 小茴香 枳殼 炒 甘草○右判劑酒木各煎病在上食後服在下食前服

一癰疽初萌必氣血凝滯 為日既久則血積于所滯而後盛作故病人氣血盛者減當歸多 血發于

他所再結癰毒生生不絕矣○一腦疽皆發在上者去木 導虛下元為上盛下虛之病難於用藥○一

癰疽生痰有一二胃寒 加半夏健脾化痰痰乃鬱而成風痰加桔梗生薑○一流注可加獨活流注者

氣血凝滯故氣滯則血流而凝加獨活者可以動一身血脉血脉既動豈復有流注乎一方以醋濕熱貼痛處以妙鹽熨之即消

○一流注起於傷寒傷寒表未盡遺毒於四肢絡溢於所滯而後為流注也如病尚有潮熱則裏有寒而未盡散加升麻蘇葉熱不退加乾葛頭痛加川芎薑蔥無汗用酒水各半煎大能行血生氣故也○一發背

既久不愈乃前醫用涼藥過也涼藥內傷其脾外冰其血脾主肌肉脾既受傷飲食必減顏色痿痺肌肉不生血為脉絡血一受冰則氣不旺肌肉腐爛故必理脾健脾肉自生本方去木通少用當歸加厚朴陳皮盛

則加白豆蔻○一凡病癰疽之人有泄瀉者不可便服此藥宜先服蠟礬丸止瀉此後用○一腸肚內癰宜十

宣散與此方相間服之並宜加忍冬藤○一腫毒堅硬不穿加川芎獨活麻黃蓮鬚葱煎服出汗即穿○一

傷折在頭上去木通加川芎陳皮○一經年腰痛加草薢玄胡索酒煎○一脚氣加木瓜檳榔穿山甲水煎

○一痰飲為患或喘或咳或暈頭痛睛疼遍身拘急骨節痺疼腦背頭項腋腰腿手足緊結腫硬或痛或不痛按之無血潮雖或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿或有薄血或清水或如乳汁又有壞肉如破

絮或又如瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不硬破之亦無膿血針口營肉突出惟覺咽喉痰實結塞

作寒作熱加南星半夏

神功散 治癰疽發背一切疔毒并瘰癧等症已成未成患者神効○川芎 泡去皮尖 黃柏 炙去粗皮各

上海掃葉山房石印

癰疽

上海掃葉山房石印

等分○右為細末用唾調成膏如唾少漱口水亦可發背癰疽等瘡纔起者敷患處留頂候藥乾用淘米水時常潤濕每日藥敷一次如瘡已成重患將潰爛者先將槐枝艾葉煎湯頓溫將瘡洗淨用絹帛展去膿並其自自然流膿不可手擠如敷藥後病人瘡覺疼痛減熱即愈如生肌則瘡肉自落瘡如不落者剪割亦可最不宜用針發背不宜貼膏藥凡醫瘡屏去別醫止飲別藥方可治忌氣怒房事勞復并不服體氣飲酒之人飲食忌酒并雞羊魚肉及如薑辣之物若因氣怒反復發腫依前治之如治對口并腦胆不必洗去舊藥逐次添藥恐動瘡口惹風也一腫毒如南星亦小豈等分醋調塗即消薑汁亦可

○真人奪命飲 治一切癰疽疔腫不問陰陽虛實蓋惡腫潰大痛或不痛然當服於未潰之先與初潰之際如毒已失潰不可服仍用一劑大勢已退然後隨症調治其功其捷誠仙方也

皂角刺各五

穿山甲三大片切始

天花粉

甘草節

乳香

明透者

赤芍

白芷

各一

防風

貝母

各七

沒藥五分

陳皮一錢

歸尾一錢

金銀花

三錢

右剉一劑好酒煎空心熱服能飲者服後再飯酒三五

杯洋再煎服在背愈倍是角刺

在腹腰倍白芷

在胸次加瓜蒌仁

二錢

在四肢倍金銀花

○呂洞賓仙傳化毒湯

治癰疽發背乳癰一切無名腫毒初起服之立消已成已潰服之立愈○防風

甘草節

白芷

茯苓

貝母

連翹

黃芩

白芍

各一

天花粉

金銀花

各一錢

半夏

七分

乳香

沒藥各五分

○右剉一劑好酒煎胸前飯前服背上飯後服下部空心上部食後俱要出汗為度如無汗

用木香薑脚膝腕內被蓋汗出而愈

神仙排膿散一治惡瘡毒風毒疔瘡背花瘡小兒惡瘡膿血俱從大便中出亦治氣滯腹脹及婦人經閉不通此方壯實之人可用 弱者當忌之矣○大黃十二兩酒浸 白芷 沉香 木香 乳香 沒藥 穿山

甲

陳壁土炒

○右各為細末量入虛實體實者不過三錢虛者二錢半臨卧用好生酒調服服後禁

各五錢

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

食湯 每日五更覺腹內疼痛動二三次以稀米粥補之服此藥內有穿山甲恐令人作嘔須慎之即嚙生

葱可止凡修合此藥要誠意不可令婦人雞犬見又不可多合恐久故則不靈矣

○芙蓉膏

治癰疽發背諸毒

芙蓉葉或皮或根亦可

黃荊子○右各等分入石臼內搗極爛用雞子清調搽

於瘡上留頂不過二次收功頂如烟起立時止痛其効如神

一方治發背癰疽不問已潰未潰敷上立消止痛如神○白金鳳花科連根葉同搗爛先用陳米醋洗淨患

處後敷藥一日一換瘡將好用桑葉醋煮一滾即撈起貼瘡上即生肌收口而愈

潰瘍者癰疽之膿已潰出也○瘍潰內外皆虛宜以補劑為主誤欲行地收者生防其虛實之失由是言之則

癰疽之腫時與潰時不同

癰疽已潰之後宜後方

李氏云癰已月安生日常服十全大補湯以補氣血宜與千金內散相間服

○托裏消毒飲 治一切癰疽六七日未消者服此藥瘡未成即消已成即潰能壯氣血固脾胃使毒氣不能

內大防毒膿潰潰肌肉易生切不可早用生肌之藥恐毒未盡反潰爛難命 金銀花三錢 黃芪三錢 天花

粉銀二錢 防風 當歸酒洗

川芎 白芷 厚朴姜汁炒

桔梗 穿山甲炒成珠

皂角刺炒各錢 陳皮三錢

○右到一劑酒水各一盞煎服瘡在上食後服在下空心服後用水煎服

千金內托散 治癰疽瘡癰未成者涼敗已成者速潰敗膿自出不用手擠惡肉自去不用刀針服藥後疾

痛頓減此藥活血氣調胃補虛祛風邪辟穢氣乃王道之劑宜多服之大効 加金銀花亦可○黃芪三錢

炙人參

當歸酒洗各二錢

川芎 防風 桔梗 白芷 厚朴姜汁炒

官桂 甘草生用各一錢

○右為細末每服三錢黃酒調下不飲酒木香湯調下亦可或都作一劑用酒煎尤佳○癰疽腫痛倍白芷不腫痛倍

官桂○不進飲食加砂仁香附○痛甚加乳香沒藥○水不乾加知母貝母○瘡不穿加皂角刺咳加半夏

陳皮杏仁生薑五片○大便閉加大黃枳殼○小便澀加麥冬車前子木通燈草

○十全大補湯 治癰疽潰後補氣血進飲食實為切要凡膿血出多陰陽兩虛此藥有回生起死之功但不分經絡不載時令醫者觸類而長之可也或見腫平痛寬遂以為安慢不知省無補調養之功愈後虛症復見因而轉為他病而危劇者多矣

○神仙蠟磨丸 治癰疽及肺癰腸癰能消毒固臟腑止疼痛護脂膜止瀉漏化膿癰疽潰後宜○兼治諸瘡毒粉瘤瘰核三五年者牛料即消不問惡瘡新起者亦効 黃蠟二兩 白蜡三兩 ○右為末溶蠟為丸如梧桐子大每服三十九酒下不飲酒熟水下 一日服三次肺癰蜜湯下咳嗽姜湯下

五善七惡主治

大善者動息日寧飲食知味便利調合膿潰腫消水鮮不臭神彩精明語聲清朗體氣和平是也此屬腑症病微邪淺更能慎起居節飲食勿藥自愈

惡者乃五臟虧損之症或因汗下失宜榮衛消鑠或因寒涼克伐氣血不足或因峻厲之劑胃氣受傷以致真氣虛而邪氣實外似有餘而內實不足法當純補胃氣多有可生不可因其惡遂棄而不治

若大渴發熱或瀉泄淋閉者邪火內淫一惡也 五味子 山茱萸 人參 黃芪 湯藥 氣血 虛人 珍湯 加黃芪 麥門冬 腫痛尤甚膿色敗臭者胃氣虛而火盛二惡也 人參 黃芪 湯藥 氣血 虛人 珍湯 加黃芪 麥門冬 赤腫子上視者肝腎陰虛而目系急三惡也 六味丸 加砂山 茱萸 麥冬 五味子 如不

者脾肺虛火四惡也 六君子 加大棗 生薑 如不應 用八珍湯 加砂山 茱萸 麥冬 五味子 如不 重者脾腎虧損五惡也 補中益氣湯 加山 茱萸 麥冬 五味子 如不 虛弱六惡也 六君子 湯加木 香砂 若聲已雌則唇鼻青赤面目四肢浮腫者脾肺俱虛七惡也 補中益氣

生薑如不應 用六君子 湯加炮 姜更不 應急如附子 十全大 補湯加 附子炮 姜 若腹痛泄瀉咳逆昏憤者陽氣虛寒氣內淫之惡症也 溫中湯 後

子或加姜桂溫補 ○若有潰後發熱惡寒作渴或怔忡驚悸寤寐不常牙關緊急或頭目赤痛自汗盜汗寒

戰咬牙手撒身熱脉洪大按之如無或身熱惡衣欲投於水其脉浮大世之微細衣厚仍寒此氣虛極傳變之惡症也○若手足逆冷肚腹疼痛泄痢腸鳴飲食不入呢逆嘔吐此陽氣虛寒氣也○若有汗而又惡寒或無汗而惡寒口噤足冷腰背反張頸項強此血氣虛極變症之惡症也急用參芪歸木附子救之間有可生者

大抵五善見三則吉七惡見四必危虛中見惡症者難治實症無惡候一者易治

○六味丸又名六味地黃丸此壯水之劑夫人之生以腎為主凡病皆由腎虛而致此方乃天一生水之劑無

有不可用者世所罕知若腎虛發熱作渴小便淋閉痰氣壅盛咳嗽吐血頭目眩暈小便短少眼花耳聾咽候內燥口熱瘡裂齒不堅固腰腿痠軟五臟齊損肝經不足之病尤當用之水能生木故也若腎虛發熱自汗盜汗便血諸血失瘡水泛為痰之聖藥血虛發熱之神劑也 熟地黃用生者自製 山茱萸酒浸去核取肉 山

藥各四兩 白茯苓 去皮 牡丹皮 澤瀉各三兩 ○右地黃酒蒸黑杵膏餘為末煉蜜丸如梧子大每

服七八十九滾水下

○八味丸 治命門火衰不能生土以致脾土虛寒而患流注鶴膝等症不能消潰收斂或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺即六味丸加肉桂附子各一兩經云益火之源以消陰翳即此方也

加減八味丸 治癰疽瘡瘍瘰癧後及將痊口乾渴甚舌或生黃及未患先渴此腎水不能上潤致心火上炎水火不能既濟故心煩燥小便頻澀或白濁陰痿飲食減少肌膚瘦削諸症服此以生腎水降心火諸症頓

止及治口舌生瘡不絕 山藥一兩 山茱萸去核淨用 桂心去粗皮 澤瀉 白茯苓去皮各 牡丹皮五錢 熟地

黃用生者半斤酒拌 砂蒸半日搗膏 ○右為末入膏加蜜少許同丸如梧子大每服六七十九五更初未言語前或空心

用鹽湯送下

○補中益氣湯 治元氣虛損或因尅伐惡寒發熱肢體倦怠飲食少思或不能起發消散生肌收斂或兼飲

食勞倦頭疼身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱 黃芪密多人參 白朮去芦 甘草炙用一錢五分

食勞倦頭疼身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱 黃芪密多人參 白朮去芦 甘草炙用一錢五分

食勞倦頭疼身熱煩燥作渴脉洪大弦虛或微細軟弱 黃芪密多人參 白朮去芦 甘草炙用一錢五分

當歸一錢 陳皮五分 升麻 柴胡三分 右剉一劑 姜棗煎服

○四君子湯 治脾胃虛弱或因尅伐腫痛消不潰斂不能宜用此以補脾胃諸症自愈若誤用攻毒七惡隨至脾胃虛弱飲食少思或食而難化或欲作嘔或大便不實若脾胃氣虛瘡口出血吐血使血尤宜用之蓋氣能攝血故也凡氣血俱虛之症宜此湯但加當歸脾胃既壯飲食自進陰血自生若用四物湯沉陰之劑脾胃復傷諸症蜂起若命門火衰而脾土虛寒必用八味丸以補土母○人參 白朮 茯苓 甘草 各二錢

甘草 炙一錢 右剉一劑 姜棗水煎服

○六君子湯 治脾胃虛弱或寒涼尅伐腫痛不消或不潰斂宜服此湯以壯榮氣諸症自愈即四君子湯加陳皮半夏

○八珍湯 治脾胃虛損惡寒發熱煩燥作渴或瘡瘍潰後氣血虧損膿水清稀久不能愈即四物四君子合方

十全大補湯 治瘡瘍氣血虛弱腫痛不愈或瘍潰膿消寒熱自汗盜汗食少體倦發熱作渴頭痛眩暈似中風狀即八珍湯加黃芪肉桂

托裏溫中湯 治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏憤此寒變內陷緩則不治○羌活 乾薑 炒 附子 炮去皮臍 益智 丁香 沉香 木香 茴香 陳皮 各一錢 甘草 炙 三錢 右剉姜水煎服

○人參黃芪湯 治潰瘍飲食少思無腫發熱人參 陳皮 麥門冬 白朮 蒼朮 米泔浸 各五分 黃芪一錢 歸身 升麻 各五 黃柏 炒 四 右剉水煎服

○竹葉黃芪湯 治癰疽氣血虛胃火盛而作渴○淡竹葉 錢 芍藥 麥門冬 半夏 川芎 甘草 石膏 黃芪 炒 人參 當歸 各一 生地黃 錢 右剉作二劑水煎服

○人參平肺散 治心火剋肺傳為痘瘰咳嗽喘嘔痰涎壅盛胸膈痞滿咽嗑不利若因肝木太過而治當補肺若因腎水不足而患當補脾肺若因心火旺而目病當利小便 人參 茯苓 陳皮 地骨皮 甘草 各一錢 知母 炒 五味子 青皮 天門冬 各 桑白皮 炒 一錢 右剉一劑水煎服

一癰疽發背諸瘡出膿潰爛日久不愈飲食少思身體倦怠口舌乾燥或寒熱往來驚悸少睡用補中益氣湯去柴胡加蒼朮麥門冬神麴五味子黃柏少睡加炒酸棗仁瘡肉生遲加白薇一錢肉桂五分如膿多或清倍加黃芪人參當歸白朮

外治敷貼之藥

○琥珀膏 治癰疽發背諸般腫毒人年頭瘡○香油四兩下沉香一錢燂淳待油熟去之次下嫩松香八兩文武火不住手攪如琥珀色住火下乳香沒藥銀珠血竭各一錢為末攪入膏內令勻退火毒用油紙攤貼神効

○白龍膏 治背疽及腫瘡皆効○香油四兩煎數沸入官粉二兩研細次入黃蠟一兩鎔化攪勻退火待藥將皺面用厚連四紙剪大小下一施藥在上收候若貼時先將慈翳煎湯洗淨貼之

○治發背 官粉不拘多少研細用槐枝艾挺剉碎拌炒官粉黃色去槐枝每粉一兩入銀珠一錢研勻用淚蠟油調攤舊棉花上貼之

一瘡瘍肌肉不生若赤色而不生者血熱也四物湯加牡丹皮若膿水清稀氣血俱虛也十全大補湯食少體倦脾氣虛也補中益氣湯煩熱作渴起居如常胃火也竹葉黃芩湯煩熱作渴日晡熱甚腎虛也用加減

瘰癧

透項起核名曰蟠蛇瘰○延及胸前腋下者名曰瓜藤瘰○左耳根腫核者名曰魚袋瘰○右耳根腫核者名

曰蜂窩瘰

結核連續者為瘰癧也○形長如蛤者為馬刀也

瘰癧初發必起于少陽經不守禁戒必延及陽明經大抵飲食厚味鬱氣之積曰毒曰風曰熱皆此三端招引變換須分虛實彼實者故易必非痛斷厚味與發氣之物雖易亦難殊為可慮以其屬膽經主決斷有相火而且氣多血少婦人見此若月信不作寒熱可生稍久轉為潮熱其証危矣自非斷欲絕慮食淡安神不可治也

瘰癧先從結喉起者

紫蘇

烏藥

枳殼

桔梗

柴胡

前胡

防風

羌活

獨活

川芎

芍藥

茯苓

大腹皮

甘草

各等

右剉水煎食後服

瘰癧先從項後起者

紫蘇

連翹

桔梗

枳殼

防風

柴胡

羌活

獨活

白芷

當歸

川芎

芍藥

甘草○右剉水煎食後服

瘰癧先從左邊起者

紫蘇

厚朴

當歸

羌活

枳殼

桔梗

防風

川芎

前胡

芍藥

蘇子

蘿蔔子甘草○右剉水煎食後服

瘰癧先從右邊起者

紫蘇

香附

青皮

烏藥

半夏

厚朴

桔梗

茯苓

柴胡

防風

羌活

甘草○右剉水煎食後溫服

人稍吐者宜

○內消散

治瘰癧結核

○朱砂

血竭

斑蝥

去翅足三

○右為細末

每服一分

空心燒酒調服

一日

二服未破者三五服立消已成者內服此藥外用金頭蜈蚣一條焙研極細末用麻油一小鍾浸三日夜捺

患處其瘡即腫潰過一二日腫消可貼膏藥瘡勢大者二十日瘡小者十餘日可保平復

○琥珀散

治瘰癧結核內消神効

斑蝥

去翅足三錢

蠶蜋

一兩

枳殼

三錢

滑石

白牽牛

頭末各

錢各五

亦弓

柴胡

木通

連翹

各七

琥珀

二錢

黃芩

一兩

甘草

三錢

○右剉作六劑水煎服

此為試讀，需要完整PDF請訪問：

www.ertongbook.com

○斑猫散即神功散苦丁香 紅小豆 磨刀泥錢一 斑猫去翅足酒炒 穿山甲土炒 僵蚕去頭足酒炒 丁香

白丁香各一錢 ○右為細末每服一錢五更無根水調服至未時打下毒物其形如鼠後用田中野菊花瓣

黃色為末陳醋調貼瘡上一日一換七日全安

赤白丸 治瘰癧未破 白礬三兩 朱砂九錢 ○右為細末酒糊為丸如菉豆大每服二十九清茶送下

日進三服藥盡即消

人虛弱者宜

益氣養榮湯 治懷抱抑鬱瘰癧流注或四肢患腫肉色不變或曰脯發熱或潰不斂 黃芪 人參 白

朮炒各一錢 當歸 川芎 白朮 生地 陳皮 香附 貝母去心各一錢 柴胡 地骨皮 桔梗炒 甘草各一錢

○右剉一劑水煎食遠服○有痰加橘紅○脅下刺痛加青皮木香○午後有熱或頭微眩加炒黃連

膿水清倍參芪當歸○女人有鬱氣胸膈不利倍香附貝母月經不通加牡丹皮當歸

○益氣內消散 治瘰癧升諸癰結核 當歸 川芎 白芍酒炒 白朮去蘆 青皮去穢 陳皮 半夏姜炒

桔梗 羌活 白芷 獨活 厚朴姜汁炒 防風 黃芩 烏藥 香附 檳榔各一兩 蘇葉一兩

沉香二錢 木香 人參 粉草各五錢 ○右剉水煎溫服服十餘劑即消若再服照分兩製酒糊為丸如

梧桐子大每服七十九酒下

瘰癧外施之藥

○神品膏 歷年久不愈瘰癧瘡神功 黃蠟二兩 官粉二兩 真香油一斤 乳香 沒藥 孩兒茶 血竭各四兩

胡椒六錢 ○先將香油熬滴水不散方下官粉熬成膏下黃蠟再熬滴水成珠離火方入細藥瘡久者胡

椒加半匙勺入磁器內收貯退火毒油單紙攤貼每用先將葱鬚花椒艾槐條熬水洗瘡淨後貼之

奇効膏 貼瘰癧未破內消已破則合 真香油一斤二兩 大黃六兩 入油燂浮濾去渣慢火下淨黃丹半斤 慢火

再熬滴水成珠下古石灰炒過五錢乳香四錢沒藥四錢黃蠟二兩成膏用油單紙攤膏貼

治療瘰癧瘡甚効 嫩槐條一斤 斷文四兩 川椒三兩淨 右三味用新大砂鍋一箇盛水滿前至七

分去渣待溫將所患之瘡徐徐洗一炷香去膿水并甲用軟白布擦待乾至午時仍將藥渣入水一鍋又煎

至六分去渣照前洗一炷香午乾待晚仍將藥洗一炷香次日用大蒜瓣切薄片圍瘡上用麥子大艾炷灸

蒜上如痒再灸以痛為止漸漸自愈

○烏龍膏 治療瘰癧爛久不愈者神効 木鱉子帶殼炒存性去壳 柏葉焙 人中血即亂髮燒灰 青龍背即鍋脾面

紙錢灰 飛羅麩各一錢 右俱為末用好陳米醋調成膏塗瘡上外用紙貼

○瘰癧膏 直香油四兩象皮三錢熬熟去滓入黃蠟三錢官粉一兩五錢用火晾溫入乳香沒藥各三錢孩

兒茶一兩龍骨一錢五分血竭一錢攪勻以磁器收貯任意貼之

馬刀瘡者項側有瘡堅而不潰是也

○柴胡通經湯 柴胡 連翹 當歸尾 黃芩 桔梗二兩 三稜各一錢 牛勞子 生甘草錢

紅花炒 右剉水煎食後服忌苦藥泄大便

○散腫潰堅湯 治馬刀結核硬如石或在耳下至缺盆中或至肩土或于腋下皆屬手足少陽經及瘰癧遍

于頰下或至頰車堅而不潰在足陽明所出或瘡已破出水並皆治之兼治癰瘤大如升又不潰者 昆布

冷水洗 海藻微炒 黃柏酒炒 知母酒浸 天花粉 桔梗各五錢 連翹 三稜酒浸 莢各三錢

龍膽草酒炒 黃連 黃芩酒炒 乾葛 白芍酒炒 升麻 柴胡各五錢 甘草五錢 歸尾五分

右剉每二兩水二盞先浸半日煎至一盞去渣熟服于卧處伸足在馬處頭微低每噀一口作十次嚥下至

服畢依常安臥取藥在胸中停蓄之意也另棟半料作細末煉蜜為丸如菜豆大每服百丸或百五十丸用

此藥湯留一口送下

一婦人癰瘰後遍身作痒脉大按而虛以十全大補加香附治之而愈大凡潰後午前痒作氣虛午後痒作血虛若作風症治之必死 一儒者癰瘰愈後體瘦發熱晝夜無定此足三陰氣血俱虛八珍湯加麥門冬五味子二十餘劑又用補中益氣湯加麥門冬五味子及六味丸而愈

疔瘡

疔瘡皆生四肢發黃泡中或紫黑必先瘡後痛先寒後熱此即疔瘡也○其中或紫黑色有條加紅絲直上倉卒之際急以針於紅絲所至處必刺出毒血然後以蟾酥丹藥於刺處塗之針時以病者知痛者出血即好否則紅絲入腹攻心必至危矣
疔瘡者風邪熱毒相搏也

○退疔瘡丹專治疔瘡○防風八分 青皮七分 羌活一錢 獨活一錢 黃連一錢 赤芍六分 細

辛八分 僵蚕一錢 蟬退四分 澤蘭葉五分 金銀花七分 甘草節一錢 獨腳連七分 紫河

車一名金綿重七錢 ○右剉五錢先服倍金銀花一兩澤蘭一兩少用葉生薑十片同內搗爛好酒釀

熟泡之去渣熱服不飲酒者水煎亦可然後用酒水各一半煎生薑十片熱服出汗病退減後再加大黃五

錢同煎熱服以利二三次去餘毒若有膿如何首烏白芷稍○在脚加楮櫚木○要通利加青皮木香天

黃梔子牽牛

○治龍芽一醉飲 治疔瘡如神○龍芽草五月五日端午採收陰乾將好酒浸搗取汁量加乳香沒藥末豆

粉入汁內同飲將渣敷瘡上此日不許吃一些茶水只可飲酒就洗亦不角用水

○秘傳妙方 治誤食瘟牛馬羊肉生出疔瘡疔毒○用白油樹葉搗爛絞汁一二碗頓服得大瀉毒氣乃愈

如冬月無葉按取嫩根研水服之以利二三次為度

○神効丹 即點舌丹治傷寒初起諸般惡毒疔瘡發背一切腫毒遍身痒痛又治傷寒咳嗽鼻涕勞嗽又咳

小兒痘瘡黑陷不起喉閉腫痛又治蠱毒并破傷風 朱砂 雄黃 片腦角五分 乳香 沒藥 輕粉各

分 血竭三錢 真蟾酥一錢 麝香當門子者 右共為末用酥油或乳汁為丸如扁豆大每一丸噙化

用酒漱下

飛龍奪命丹 治疔瘡腦疽發背乳癰附骨疽一切無名腫毒惡瘡服之便有頭跡不痛者服之便痛已成

者服之立愈此皆惡瘡乃藥中至寶危者服之立安 雄黃二錢 蟾酥乾者二錢 銅綠 乳香 沒藥

膽礬 寒水石 血竭各三錢 朱砂一錢研 輕粉 片腦 麝香當門子者 蜈蚣一條酒浸炙 蟬

牛二十○ 右件俱為細末先將蝸牛連殼研如泥和藥為丸如菉豆大如丸不就入酒打麪糊丸之每服

二十九用葱白三寸令病人嚙爛吐於男左女右手心將丸藥放在內用無灰熱酒三四杯送下於避風處

以衣被蓋之約人行五里之久再用熱酒三四杯以助藥發熱大汗為度如重者無汗再進二九汗出即愈

如疔瘡走黃過心者 治病人不能嚙葱者研爛裹之與服瘡在上食後服在下食前服忌冷

水黃瓜茄子油膩雞魚肉濕麪一切發物不可食

神仙解毒丸 治一切疔瘡發背魚口諸般惡瘡無名腫毒初發一服即消腫白礬不拘多少鎔化作丸如

菉豆大朱砂為衣每服十九丸用連鬚葱七八根水煎至二碗送下汗出立愈已成者不傷未成者即消

疔瘡外施之藥

蟾酥丹 用大癩蝦蟇以針破眉棱上手捻出酥于油紙上或桑葉上用竹篾刮下然後插在背陰處自乾

取用 蟾酥以白麪黃丹等分拌和丸如麥粒狀針破患處以一粒內之

類聖散 治一切疔瘡惡毒腫痛如神 川烏 草烏 蒼朮 細辛 白芷 薄荷 防風 甘草各五

右為細末雞子清調塗患處留項

追毒膏 治諸般及瘡反無名腫毒 廣木香五分 芙蓉葉四兩 白芨四兩 乳香五分 沒藥二錢

兒茶三錢 血竭一分 青木香一錢 右各為細末勻在一處臨用時看瘡大小以生密調塗患處以綿紙附之不過三五次即消

○疔毒方 急將毒用針刺破葱白搗爛敷上手帕繫住人行五里之時其疔出然後用熱酒洗淨

○治疔瘡方 核桃仁一箇古銅錢一箇二者細嚼黃酒送下至重不過二服其効如神

○小奪命丹 治腦疽及疔瘡惡毒無名腫毒其効如神 槐花子 干項子神效 地丁 右三味各等分水煎通口溫服加蟾酥尤妙

○鐵柱杖 治疔瘡發背頭風 用草烏頭不拘多少去皮淨為末用葱白去其葉搗爛為丸豌豆大以雄黃為衣每一丸先將葱細嚼熱酒下或惡心吐三四口冷水一口止之即臥以被厚蓋汗出為度

男子患疔服奪命丹汗不止而瘡不痛熱不止而便不利此汗多亡陽毒氣盛而真氣傷矣用參芪歸朮芍藥防風五味子二劑諸症悉愈惟以小便不利為憂余曰汗出不宜利小便汗既止陽氣復而自利矣仍用前藥去防風加麥門冬用當歸黃芪四劑便行瘡潰而愈

灸法 治疔瘡惡毒用大蒜搗爛成膏塗腫處四圍留露腫頂以艾炷灸之以爆為度如不爆稍則難愈宜多灸百餘壯無不愈者

便毒

便毒一名駱馬癰此奇經衝任為病而癰見於厥陰經之分野其經少血又名血疔或先有疳瘡而發或卒然起核痠痛而發皆熱鬱血聚而成也初發宜疏利之即散成膿後如常用托裏內補之藥

便毒是厥陰濕熱因勞倦而發用射干三寸以生薑煎食前服得行三三次立効九射干用開紫花者是便毒者生兩腿合縫之間也 歸尾 赤芍 金銀花 天花粉 白芷稍斂 木鱉子十箇 殭蚕二錢

大黃三錢 芒硝二錢

穿山甲三片土

○右剉一劑好酒二碗煎至一碗次入硝黃再煎二沸連藥

雖露一宿五更溫服厚蓋出汗利一二次即愈

○神奇散 治便毒魚口 穿山甲^{三片} 木鱉子^{去殼三箇} 牡蠣 大黃錢 黃連 黃芩 黃柏 金銀花

連翹^{各半} 黃蠟 右剉一劑酒水各半煎空心服

○斑白散 斑貓^{去翅足} 白芷^分 右共為細末每服六分空心黃酒送下即刻立効

○龍膽瀉肝湯 治肝經溼熱或囊癰便毒下疳懸癰腫痛焮作小便澀滯或婦人陰癢痒痛或男子陽提腫

脹或出膿水○龍膽草^{酒洗} 澤瀉^{各半} 車前子 木通 黃芩 甘草 生地黃^酒 歸尾^{酒洗} 山梔

右剉一劑水煎空心溫服

便毒潰破即魚口瘡也 大黃錢 僵蚕 穿山甲^{炒成} 五靈脂^{炒各一錢} 金銀花錢○右為細末每服三錢

空心黃酒送下

○立消散 治魚口便毒 大蝦蟆一箇剉去皮連腸搗爛入葱五錢再搗軟腫處却用皮覆貼其上

下疳

下疳者陰頭腫痛而生瘡也^{乃厥陰肝經主病宜} 防風 獨活^{各六分} 連翹 荊芥 黃連 蒼朮 知母^{各七分} 黃

柏 赤芍 赤茯苓 木通 龍膽草^{各九分} 紫胡錢 甘草^{稍分}○右剉一劑燈草二十四根水煎空心

熱 如有便毒量入虛實^{加大黃二錢}

○涼血解毒丸 先用升麻葛根湯發其毒毒出後○苦參^{八兩} 黃連^{四兩} 連翹^{三兩} 牛旁子 生地黃 白芷

稍^{二兩} 防風 石膏^{各一兩} 大黃^{二兩}○右為末荊芥煎湯打糊為丸如梧桐子大每服百丸空心溫水

送下

下疳外治之藥

○珍珠散 治下疳瘡如神 珍珠 雄黃 黃柏 枯白礬 官粉^{煨過各等分} 右為末以米泔水洗瘡令淨