

枳朮丸 六

治食積痞滿及小兒腹大脹滿時常疼痛

脾胃不和等證○此方較之枳朮丸其效如神

白朮

二兩 麵炒

赤芍藥

二兩 酒炒

枳實

一兩 麵炒

陳皮

一兩

荷葉湯煮黃老米粥為丸桐子大米飲或滾白湯任下口餘

丸○如臟寒加乾薑炒黃者五錢或一二兩○如脾胃氣虛

加人參一二兩

蒼朮丸 十七

治寒濕在脾泄瀉久不能愈者

雲苓

四兩

白芍藥

炒黃 四兩

炙甘草

一兩

川椒

去閉口者 炒出汗

小茴香

炒各 一兩

厚朴

三兩 薑汁炒

真茅山蒼朮

八兩 米泔浸一宿 切炒如無即以好

白朮
代之

破故紙酒浸二日晒乾炒香四兩

右爲末糯米糊爲丸桐子大每食遠清湯送下七八十九

貝母丸十八

消痰熱潤肺止咳或肺癰肺痿乃治標之妙劑

貝母一兩爲末用沙糖或蜜和丸龍眼大或噙化或嚼服之

○若欲劫止久嗽每貝母一兩宜加百藥煎蓬砂天竺黃各

一錢佐之尤妙如無百藥煎卽醋炒文蛤一錢亦可或粟殼

亦可酌用○若治肺癰宜加白礬一錢同貝母丸服如前最

妙

止痰丸十九

治一切停痰積飲吞酸嘔酸胸脇脹悶疼痛等

半夏

製二兩

白芥子

二兩

乾薑

炒黃一兩

猪苓

二兩

炙甘草

五錢

陳皮

四兩切碎用鹽二錢入水中拌浸一宿曬乾

右為末湯浸蒸餅為丸綠豆大每服一錢許滾白湯送下○

如胸脇疼痛者加台烏藥二兩

神香散

十二

治胸脇胃脘逆氣難解疼痛嘔噦脹滿痰飲膈

噎諸藥不效者惟此最妙

丁香

白荳蔻

或砂仁亦可

二味等分為末清湯調下五七分甚者一錢日數服不拘○

若寒氣作痛者薑湯送下

攻陣

吐法

此方可代瓜蒂三聖散之屬凡邪實上焦或痰或食或氣逆不通等證皆可以此吐之

用蘿蔔子搗碎以溫湯和攪取淡湯徐徐飲之少頃卽當吐出卽有吐不盡者亦必從下行矣○又法以蘿蔔子爲末溫水調服一匙良久吐涎沫愈

一法用鹽少許於熱鍋中炒紅色乃入以水煮至將滾未滾

之際攪勻試其滋味稍淡乃可飲之每用半碗漸次增飲自然發吐以去病爲度而止○一法凡諸藥皆可取吐但隨證作湯劑換而吐之無不可也

赤金豆二

○亦名八仙丹○治諸積不行凡血凝氣滯疼痛

腫脹虫積結聚癥堅宜此主之此丸去病捷速較之硝黃稜莪之類過傷臟氣者大爲勝之

巴霜

去皮膜畧去油一錢半

生附子

切畧炒燥二錢

皂角

炒微焦二錢

輕粉一

錢

丁香

木香

天竺黃

各三錢

硃砂

二錢爲衣

攻陣

右爲末醋浸蒸餅爲丸蘿蔔子大硃砂爲衣欲漸去者每服
五七丸欲驟行者每服一二十丸用滾水或煎藥或薑醋茶
蜜茴香史君煎湯爲引送下若利多不止可飲冷水一二口
卽止蓋此藥得熱則行得冷則止也○如治氣濕實滯鼓脹
先用紅棗煮熟取肉一錢許隨用七八丸甚者一二十丸同
棗肉研爛以熱燒酒加白糖少許送下○如治虫痛亦用棗
肉加服止用清湯送下

太平丸 三

治胸腹疼痛脹滿及食積氣積血積氣痞血痞

邪實秘滯痛劇等證○此方借此二微巴豆以行群藥之力去

滯最妙如欲其峻須用巴豆二錢

陳皮

厚朴

木香

烏藥

白芥子

草豆蔻

三稜

蓬朮煨

乾薑

牙皂

炒斷
烟

澤瀉

各三錢

以上十一味俱爲細末

巴豆

用滾湯泡去皮心膜稱足一錢用水一碗微火煮

至半碗將巴豆撈起用乳鉢研極細仍將前湯攪入研
勻然後量藥多寡人蒸餅浸爛搗丸前藥如綠豆大每
用三分或五分甚者一錢

右隨證用湯引送下○凡傷食停滯卽以本物湯下○婦人血氣痛紅花湯或當歸湯下○氣痛陳皮湯○疝氣茴香湯○寒氣生薑湯○欲瀉者用熱薑湯送下一錢○未利再服○利多不止用冷水一二口卽止

敦阜丸

四

治堅頑食積停滯腸胃痛劇不行等證

木香

山查

麥芽

皂角

丁香

烏藥

青皮

陳皮

澤瀉

各五錢

巴霜

一錢

右共爲末用生蒜頭一兩研爛加熟水取汁浸蒸餅煨九緣

豆大每服二三十丸隨便用湯引送下如未愈徐徐漸加用之

獵虫丸 五

治諸虫積脹痛黃瘦等病

蕪荑

雷丸

桃仁

乾漆 炒烟盡

雄黃 微炒

錫灰

皂角 燒烟盡

棋榔

史君子 各等分

輕粉 減半

細穰肉 加倍

湯浸蒸餅爲丸綠豆大每服五七分滾白湯下陸續服之○如虫積堅固者加巴豆霜與輕粉同

百順丸 六

治一切陽邪積滯凡氣積血積蟲積食積傷寒

實熱秘結等證但各爲湯引隨宜送下無往不利

川大黃

錦紋者
一斤

牙皂角

炒微黃一
兩六錢

右爲末用湯浸蒸餅搗丸綠豆大每用五分或一錢或二三錢酌宜用引送下或用蜜爲丸亦可

散陣

一柴胡飲

一爲水數從寒散也○凡感四時不正之氣

或爲發熱或爲寒熱或因勞因怒或婦人熱入血室或產後經後因冒風寒以致寒熱如瘧等證但外有邪而內兼火者

須從涼散宜此主之

柴胡 二三錢

黃芩 一錢半

芍藥 二錢

生地 一錢半

陳皮 一錢半

甘草 八分

水一鍾半煎七八分溫服○如內熱甚者加連翹一二錢隨宜○如外邪甚者加防風一錢佐之○如邪結在胸而痞滿者去生地加枳實一二錢○如熱在陽明而兼渴者加天花粉或葛根一二錢熱甚者加知母石膏亦可

二柴胡飲

二為火數從溫散也○凡遇四時外感或其

人元氣充實臟氣素平無火或時逢寒勝之令本無內熱等

證者皆不宜妄用涼藥以致寒滯不散則爲害非淺宜此主之

陳皮 一錢半 半夏 二錢 細辛 一二錢 厚朴 一錢半

生薑 三五七片 柴胡 一錢半或二三錢 甘草 八分

水一鍾半煎七八分溫服○如邪盛者可加羌活白芷防風紫蘓之屬擇而用之○如頭痛不止者加川芎一二錢○如多濕者加蒼朮○如陰寒氣勝必加麻黃一二錢或兼桂枝不必疑也

三柴胡飲 三 三爲木數從肝經血分也○凡人素稟陰分

不足或肝經血少而偶感風寒者或感邪不深可兼補而散者或病後產後感冒有不得不從解散而血氣虛弱不能外達者宜此主之

柴胡

二三錢

芍藥

一錢半

炙甘草

一錢

陳皮

一錢

生薑

三五片

當歸

二錢 溏泄者易以熟地

水一鍾半煎七八分溫服○如微寒欬嘔者加半夏一二錢

四柴胡飲

四

四為金數從氣分也○凡人元氣不足或忍

饑勞倦而外感風寒或六脉緊數微細正不勝邪等證必須培助元氣兼之解散庶可保全宜此主之若但知散邪不顧

根本末有不元氣先敗者察之慎之

柴胡

一二三錢

炙甘草

一錢

生薑

三五七片

當歸

二三錢瀉者少用

人參

二三錢或五七錢酌而用之

水二鍾煎七八分溫服○如胸膈滯悶者加陳皮一錢

五柴胡飲

五

五為土數從脾胃也○脾土為五臟之本凡

中氣不足而外邪有不散者非此不可此與四柴胡飲相表

裏但四柴胡飲止調氣分此則兼培血氣以逐寒邪尤切於

時用者也神效不可盡述凡傷寒瘧疾痘瘡皆所宜用

柴胡

一二錢

當歸

二三錢

熟地

三五錢

白朮

二三錢

芍藥

錢半
炒用

炙甘草

錢一

陳皮

酌用或
不必用

水一鍾半煎七分食遠熱服○寒勝無火者減芍藥加生薑

三五七片或炮乾薑一二錢或再加桂枝一二錢則更妙○

脾滯者減白朮○氣虛者加人參隨宜○腰痛者加杜仲○

頭痛者加川芎○勞倦傷脾陽虛者加升麻一錢

正柴胡飲

六

凡外感風寒發熱惡寒頭疼身痛疹瘡初起

等證凡血氣平和宜從平散者此方主之

柴胡

一二錢

防風

一錢

陳皮

一錢半

芍藥

二錢

甘草

一錢

生薑

三五片

散陣

水一鍾半煎七八分熱服○如頭痛者加川芎一錢○如熱而兼渴者加葛根一二錢○如嘔惡者加半夏一錢五分○如濕勝者加蒼朮一錢○如胸腹有微滯者加厚朴一錢○如寒氣勝而邪不易解者加麻黃一二三錢去浮沫服之或蘓葉亦可

麻桂飲

七

治傷寒瘟疫陰暑瘧疾凡陰寒氣勝而邪有不

能散者非此不可無論諸經四季凡有是證卽宜是藥勿謂

夏月不可用也不必厚蓋但取津津微汗透徹爲度此實麻

黃桂枝二湯之變方而其神效則大有超出二方者不可不

爲細察

官桂

一二錢

當歸

三四錢

炙甘草

一錢

陳皮

隨宜用或不用亦可

麻黃

二三錢

水一鍾半加生薑五七片或十片煎八分去浮沫不拘時服

○若陰氣不足者加熟地黃三五錢○若三陽併病者加柴

胡二三錢○若元氣大虛陰邪難解者當以大溫中飲更迭

爲用

大溫中飲

人

凡患陽虛傷寒及一切四時勞倦寒疫陰暑

之氣身雖熾熱時猶畏寒卽在夏月亦欲衣被覆蓋或喜熱