

東醫寶鑑

十三

東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰太陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及

風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨搖併○霍亂之病皆因飲食非關鬼邪針○內有所積外

有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲食所致此先哲確論也明○霍亂者揮霍變亂也

凡人為系有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病本因食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失

運不能升降是以上吐下瀉○霍亂或因飲冷或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人

吐瀉併作用藥遲緩須臾不救○霍亂多責於熱故夏秋為盛○霍亂之病由風濕喝三氣之

合筋故也風者肝木也濕者脾土也喝者心火也肝主筋故風急甚則轉筋也吐者喝也心火炎上故

嘔吐泄世者脾土也脾濕下流故泄瀉也
啓玄子曰皆脾熱所生也斯言爲正

霍亂形證

霍亂證心腹痛卒痛嘔吐先腹下利增寒壯熱頭痛
眩暈先心痛則先吐先腹痛則先利心腹俱

痛吐利並作甚則轉筋入腹即死傳正○三焦爲水
穀之道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清
濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂

乃曰霍亂因邪入脾胃故發爲吐利○霍亂
證夏秋爲多寒月亦有之蓋有伏暑而作○入

之藏府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居
失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾胃

脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變
亂於腸胃之間心腹疼痛發作吐利有二三痛而先

吐者有腹痛而先利虛煩者有吐利俱發者有發熱頭
痛體疼而復吐利者或但吐利心腹刺痛者

或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或
四肢逆冷煩悶昏塞而欲死者隨證治之

脉法

霍亂脉浮洪可救脉微遲而不語氣少則難差
○脉多伏或絕研○脉代者霍亂代而亂者亦霍

亂又關脉滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂吐瀉之候脉代勿訝鑿鑿○滑數為嘔代者霍亂微滑者生澁數凶斷脉○脉微而澁或代而散或隱而伏或大而虛或結或促或代皆不可斷以死脉可救故也傷○脉浮大而洪

霍亂有乾有濕此病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂乾霍亂死者多

以也泄出雖甚重胃中水穀泄盡則止矣所以死者少也乾霍亂死者多者以其上不得吐下不得利則所傷之物不得出泄壅閉正氣隔絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死矣理

乾霍亂治法吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然

頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯熱見倍加橘紅與之或藿香正氣散熱見加官桂

赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香元尤妙○乾霍亂最難治死在須臾升降不通故也當先

吐以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯痰門見加解散藥川芎蒼朮防風白芷之類無用薑鹽湯

研手足。絞腸沙者乃乾霍亂一名也。腹痛不可忍或

正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急用鹽湯吐之。或

中欲出血無服治中湯。或藿香正氣散必效。見方

薑鹽湯。治乾霍亂。欲死。鹽一兩生薑切半兩。右同炒

濕霍亂治法。上吐下瀉。謂之濕霍亂。凡霍亂吐瀉渴

散寒多不飲水。宜理中湯。寒濕霍亂。熱多欲飲水。宜五苓

用藿香正氣散。寒月虛冷。用理中湯。寒方見暑

以分消。上下更合益元散。香黃連散。加火。左妙。附湯。回

生煎加減正氣散。中暑霍亂。宜香薷散。附桂

事南星末三錢。棗三枚。薑五片。煎極熱。服一服。可

效。或半夏末。薑汁點服。或白礬末。一大錢。沸湯點

服亦效

木萸散

治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷木瓜吳茱萸食鹽各五錢右同炒令焦餅盛百沸水三升入

藥同煎至二升冷煖任意服即效○如無前藥枯白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一捻醋

一盞同煎服或鹽梅酸等物皆可煮服

二香黃連散

治伏暑霍亂腹痛躁悶脉沉手足冷藿香厚朴半夏赤茯苓陳皮白扁豆香薷

各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右剉作一貼水煎入薑汁一匙溫服

加味薑附湯

治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語六脉沉伏附子炮乾薑炮人參各一錢

半甘草炙七分右剉作一貼水煎服○一名四順附子湯

回生散

治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回生藿香陳皮各五錢右剉作一貼水煎溫服

門入

加減正氣散

或異鄉人初到他方不伏水土遂成霍亂

砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼

香薷散

治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷

益元散

一名六一散治霍亂吐瀉取此

霍亂後轉筋

陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉津

而已重者遍體轉筋入腹手足厥冷危甚風燭矣

倉卒之際以鹽填臍中灼艾不計壯數雖已死而

胃中有煖氣者立甦急用木萸散坊見加苗香甘

草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩脚掌心則雖昏危

入腹者亦效門霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足

厥冷氣欲絕者急灸臍中又取夢一把煎湯泡洗

次投附子理中湯寒門即效細細霍亂後轉筋理

中湯麝香加石膏一兩煎服一法理中湯去

白朮加生附子一箇人活轉筋屬血熱四物湯方

血加酒茶酒花蒼朮南星煎服心丹吐瀉脇痛轉

筋脉弦者木克土也平胃散方加木瓜五錢煎服

木瓜湯

治霍亂轉筋木瓜四分右剉作一貼入薑三片紫

蘇一十葉鹽一撮烏梅一箇同煎服

一法

治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也

霍亂後煩渴

吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓散以寒方

冬湯加減薤苓湯止渴湯

桂苓白朮散

治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓

人參桂枝各二錢半右為末每三錢白湯或新汲水調下生薑湯亦可

麥門冬湯

治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半合人參甘草各

五分右剉作一貼入薑三片烏梅一箇水煎服

椒豆散

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入口者胡椒菜豆各四十粒右研為末新汲

水調下或水煎服門○一名胡椒湯調下胡椒

加減薤苓湯

治霍亂熱渴天花粉二錢赤茯苓一錢猪苓澤瀉香薷乾葛各七分黃連白朮

甘草各五分右剉作貼入薑三片水煎服

止渴湯

治同上人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜蒌根澤瀉葛根甘草各五錢右為末蜜水調二錢服

心丹

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉石膏湯寒方門參胡三白湯既濟湯

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛柴胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門

冬梔子仁甘草各八分一人參五分五味子十粒右剉作一貼入棗二枚一燈心一團煎服

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參治霍亂後虛煩不得眠麥門冬二錢人參

入薑五片粳米百粒水煎服

霍亂吐法

治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不得氣欲絕

飲以理中湯藿香正氣散款緩調治大勝諸治吐

以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐

霍亂熨法

霍亂吐瀉心腹肚上不可忍炒鹽二碗紙包紗

則又熨續以炒鹽熨其背則十分無事效

霍亂鍼法

乾霍亂刺委中絞腸沙證手足厥冷腹痛不

可忍以手蘸溫水即愈者膝腕上拍打有紫黑

點處以鍼刺去惡血即愈者膝腕上拍打有紫黑

霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣被鬱而

不能行所以卒痛而手足厥冷俗名絞腸沙者蓋

言痛之甚也北方刺青筋以出氣血南方刮胃背

手足以行氣血俱能散病然出血法詳見救急門

門

霍亂灸法

霍亂轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍

死而腹中有煖氣者依上法灸之亦甦又法
灸氣海二七壯妙氣者依上法灸之亦甦又法
樞氣海中脘立愈但傳有煖氣者灸承筋七壯立甦
效
綱目

禁忌法

霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽

漸而將息○霍亂吐瀉時慎勿與粟米粥湯入

胃必死矣○霍亂不可遽與米飲粥飯以助邪

氣必所傷物盡然後稀粥漸養之○霍亂時

大忌飲食入腹則死只喫水不妨不可飲熱湯

切不可飲熱
酒燒酒刷

不治證治霍亂如轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脈洪大

煩躁者不治得乾霍亂吐瀉不得胃腹脹硬面

唇青黑者不足冷過肘膝六脈伏絕氣喘急舌短囊

水疾吐瀉已乘船亦好嘔吐○枯白礬末一錢飲童尿最好服

亦好嘔吐○枯白礬末一錢飲童尿最好服

單方一丸二十

鹽尿治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童

鍋底墨投治霍亂中急攪服錢百沸湯一盞

甘爛水治霍亂入藥煎

生熟湯一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取牛屎一升同煎取汁服即效

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

便省神妙

蘆花

取一把蓬蘽煎治霍亂氣息危急者

皂角

乾霍亂許調服探吐即效

木瓜

治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之

烏梅

治霍亂煩渴水漬和蜜飲之妙

林檎

青色者治霍亂吐瀉甚妙

秫藷葉

治霍亂轉筋大如桃李

粟米

治霍亂煩渴飲數升立差

糯米

治霍亂取汁任意飲之

麥洗

治霍亂轉筋濃煎乘熱熏

香薷

治霍亂吐瀉轉筋濃煎飲之

小蒜

治霍亂吐瀉

牛糞

治霍亂吐瀉四肢逆冷黃牛糞以

烟鹿皮

或烟瘴皮熏烟最多黃色者水浸揉

醋衣

治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取

牛涎

小兒霍亂牛涎一

嘔吐

嘔吐之因

內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○火○胃膈熱

俱屬於胃胃者總司也以其氣血多少為異耳嘔
者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病
也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血
病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主噦者
少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以
半夏為主究其三者之源皆因脾氣虛弱或因寒
氣客胃或因飲食所傷而致宜以丁香藿香半夏
茯苓陳皮生薑之類主之燥○濕嘔者有物有聲
食已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血俱病
故嘔比吐為重也○劉河間謂嘔者火氣炎上
此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者
有寒氣鬱於胃口者有食滯心脾之分新食不得
下而反出者有胃中火與痰而嘔者○
嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也○

脉法

寸口永數其人即吐○寸口脉細而數數則為熱
細則為寒數為人嘔吐○問曰病人脉數數為熱
當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令陽
氣微膈氣虛脉乃數數為客熱不能消穀胃中虛
冷故吐也○脾○陽脉緊陰脉數其人食已即吐○
寸緊尺濇其人胃滿不能食而吐○脉滑為嘔○

吐衄有痰最忌滑數跌陽脉浮而澀浮則爲

弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐暮食朝吐
噎膈反胃脉浮緩者生沉反

吐

湯梗○
熱者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和
黃連竹茹湯清熱二陳湯或葛根竹茹湯

水或
白乃
藥迤
升自
麻下
神涌
麴上
麥者
芽脾
乾熱
生所
薑致
土也
炒二
苓陳
連湯
梔加
子白

若胃虛而嘔者宜推揚穀氣四味藿香湯加減
 君子湯主之睪○久病胃虛嘔吐宜藿香安胃散

藿香平胃散比和飲湯。痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯。小半夏湯。水如神效。水停而嘔者心下怔忡先渴後嘔。者宜赤茯苓湯。先嘔後渴者宜猪苓散。水入即吐者宜五苓散。防風先嘔後渴者宜猪苓散。千金之說信矣。然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔。半夏逐之生薑於寒證最佳。若遇熱嘔不可無烏梅也。醫○嘔吐宜服薤白粥。○嘔家有不須自愈矣。膿盡。

加味二陳湯

治胃冷嘔吐二陳湯。加縮砂一錢。丁香五分。也。一貼。

丁香安胃湯

治嘔吐噦胃寒所致。黃芪二錢。吳茱萸。草豆蔻。參。蒼朮。各一錢。丁香。柴胡。升。

麻當歸身。陳皮。甘草。各一貼。水煎服。黃。

加減理中湯

治胃寒冷嘔吐。清水。冷。涎。脉。沉。遲。人。參。白。朮。赤。茯苓。乾。薑。炮。陳。皮。藿。香。丁。香。半。

夏。縮。砂。研。桂。皮。各。一。錢。右。剉。作。一。貼。水。煎。服。春。

貼入薑三片。烏梅一箇。水煎服。春。