

傷寒縣解卷九

少陽經下篇 十六章

少陽壞病

少陽在半表裏之間故宜小柴胡半表裏治之而半表之陽盛則小柴胡之黃芩不足以清表陽而人參反益半表之熱服柴胡湯已渴者屬陽明是也半裏之陰盛則小柴胡之人參不足以溫裏陰而黃芩反益半裏之寒與柴胡湯後必下重是也小柴胡未嘗犯本經之禁而於陰陽偏盛者猶有助虛之弊况乎汗下溫鍼倒行逆施陽盛而泄其陰陰盛而伐其陽則人陰人陽壞病百出矣仲景于是有救逆之法補且挽回使之離陽明之府而出太陽之藏所謂明輔造化也神者也

少陽壞病提綱 一少陽二十

太陽表證不解傳於少陽之經脇下硬滿乾嘔不食往來寒熱譫語是其府病而經鬱也若汗下溫鍼一經逆治陽盛則入陽明之府陰盛則入三陰之藏少陽之證已罷他經之證遂生病自少陽而壞是謂少陽之壞病其逆犯不同則病壞非一知其所犯治之以法法在則人存病雖壞而人不壞是貴乎良工也

本太陽病不解轉入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者與小柴胡若已吐下發汗溫鍼譫語柴胡證罷此為壞病知犯何逆以法治之

夫太陽表證不解傳入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱此皆柴胡本證少陽之脈弦細沈緊若尚未吐下而脈候沉緊者又有柴胡本脈與小柴胡湯病自解矣若已經吐下發汗溫鍼譫語不明柴胡證罷非入陽明之府即入三陰之藏此為少陽壞病柴胡少陽之方不中與也審犯何逆以法治之

少陽壞病入陽明去路證語煩悻證 一少陽二十四

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則譫語此屬胃胃和則愈胃不和則煩而悻

少陽為三陽之始陽氣未盛故脈弦細少陽經脈自頭走足病則經氣逆升壅於頭上故善頭痛少陽從相火化氣病則相火鬱蒸故善發熱相火重燔津液既損故不可發汗汗之津亡上燥則作譫語此屬胃病蓋君相下根全由胃土之降津亡津液主燥胃逆二火飛騰神明擾亂故作譫語胃津續復行其清降之令二火漸下不至為病若胃燥而不和二火拔根則心家煩生而風木鬱衝必作悻衝也法詳下章

小建中證 二少陽二十五 傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 方在少陽九

昌邑黃元御坤載著



傷寒懸解卷九

昌邑黃元御坤載著

少陽經下篇 十六章

少陽壞病

少陽在半表裏之間故宜小柴胡半表裏治之而半表之陽盛則小柴胡之黃芩不足以清表陽而人參反益半表之熱服柴胡湯已渴者屬陽明是也半裏之陰盛則小柴胡之人參不足以溫裏陰而黃芩反益半裏之寒與柴胡湯後必不重是也小柴胡未嘗犯本經之禁而於陰陽偏盛者猶有助虛之弊況乎汗下溫鍼倒行逆施陽盛而泄其陰陰盛而伐其陽則入陰入陽壞病自出矣仲景于是有救逆之法補其挽回使之離陽明之府而出太陽之藏所謂明輔造化者也神者也

少陽壞病提綱 一少陽二十

太陽表證不解傳於少陽之經脇下硬滿乾嘔不食往來寒熱證語是其府病而經鬱也若汗

下溫鍼一經逆治陽盛則入陽明之府陰盛則入三陰之藏少陽之證已罷他經之證遂生病自少陽而壞是謂少陽之壞病其逆犯不同則病壞非一如其所犯治之以法法在則人存病雖壞而人不壞是貴乎良工也

本太陽病不解轉入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱尚未吐下脈沈緊者與小柴胡若已吐下發汗溫鍼證語柴胡證罷此為壞病知犯何逆以法治之

夫太陽表證不解傳入少陽者脇下硬滿乾嘔不能食往來寒熱此皆柴胡本證少陽之脈弦細沈緊若尚未吐下而脈候沉緊者又有柴胡本脈與小柴胡湯病自解矣若已經吐下發汗溫鍼證語不明柴胡證罷非入陽明之府即入三陰之藏此為少陽壞病柴胡少陽之方不中與也審犯何逆以法治之

少陽壞病入陽明去路證語煩傳證 一少陽二十四

傷寒脈弦細頭痛發熱者屬少陽少陽不可發汗發汗則證語此屬胃

胃和則愈胃不和則煩而悸

少陽為三陽之始陽氣未盛故脈弦細少陽經脈自頭走足病則經氣逆并壅於頭上故善頭痛少陽從相火化氣病則相火鬱蒸故善發熱相火重燔津液既損故不可發汗汗之津亡上燥則作證語此屬胃病蓋君相下根全由胃土之降津亡津液上燥胃逆二火飛騰神明擾亂故作證語胃津續復行其清降令二火漸下不至為病若胃燥而不和二火拔根則

心家煩生而風木鬱衝必作悸衝也法詳下章

小建中證 二少陽二十五

傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之 方在少陽九



少陽甲木化氣於相火隨戊土下行而交癸水與少陽君火並根攻府是以神宇清寧不生煩亂汗泄中脫津亡土燥胃逆不能降蟄相火相火蒸炎消燦心液故生煩擾膽胃兩經痞塞心脇阻隔厥陰升達之路風木鬱衝振搖不已是以動燥風火交熾傷耗胃脫津液小建中湯膠飴甘棗補脾精而生胃液薑桂芍藥疎甲木而清相火也

炙甘草湯三少陽二十六

傷寒脈結代心動悸者炙甘草湯主之

少陽經脈自頭走足循胃口而下兩脇病則經氣上逆衝逼戊土胃氣鬱滿橫隔膈經燄道是以心脇痞硬經絡壅塞營血不得暢流相火升炎漸而榮血消亡經絡梗澀是以經脈結代血亡木燥風燥鬱衝而升路阻隔未能順達是以悸動相火上蟠辛金受刑甲木上鬱戊土被尅土金俱敗則病傳陽明而中氣傷矣炙甘草湯參甘大棗益胃氣而補脾精膠飴滋經脈而澤枯槁薑桂行榮血之瘀溫麥冬清肺金之燥熱也

炙甘草湯七十二

甘草四兩

人參二兩

大棗十二枚

生地黃一斤

阿膠二兩

三升去滓內膠烱燂盡溫服一升日三服一名復脈湯

右九味以清酒七升水八升先煮八味取

煩滿證證四少陽二十七

少陽中風兩耳無所聞目赤胸中滿而煩者不可吐下吐下則悸而驚

太陽中風而傳少陽是謂少陽中風少陽脈循兩耳病則經脈逆行濁氣上填是以耳聾少陽脈起目之銳眥相火升炎是以目赤少陽脈循胸膈而下兩脇經氣壅阻肺胃不降是以胸中煩滿如此者不可吐下吐下則悸而且驚蓋耳聾目赤胸滿心煩膽胃兩經已自不降再以吐下傷其胃氣胃氣愈逆甲木拔根是以膽怯而神驚膽胃鬱胸膈閉塞風木鬱衝并路壅塞是以悸作

柴胡龍骨牡蠣證五少陽二十八

傷寒八九日下之胸滿煩驚小便利不利證語一身盡重不可轉側者柴胡龍骨牡蠣湯主之

下傷中氣胃逆而為胸滿膽木拔根而為煩驚心神擾亂而為證語主本營過疏泄不行則小便利已土濕動機開壅滯則一身盡重不可轉側柴胡龍骨牡蠣湯大棗炙甘草補土而泄濕大黃柴胡桂枝泄火而疏木生薑半夏下衝而降濁龍骨牡蠣鉛丹鎮魂而鎮逆也

柴胡加龍骨牡蠣湯七十二

柴胡四兩

半夏二升

人參二兩

大棗十二枚

生薑半斤

桂枝二兩

茯苓半斤

大黃二兩

鉛丹半斤

八升煮取四升大黃切如棋子大更煮一二沸去滓溫服一升



小柴胡證六少陽二十九

凡柴胡湯病證而下之者柴胡證不能者復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解

柴胡證本不宜下而誤下之柴胡證能此為壞病者其證不能復與柴胡湯必蒸蒸而振却發熱汗出而解陽氣發為陰邪所束鬱勃鼓動故振慄逆項之透發肌表則汗而解矣

大柴胡證七少陽三十

太陽病過經十餘日反二三下之後四五日柴胡證仍在者先與小柴胡湯

嘔者為未解也大柴胡下之則愈

下後柴胡證仍在若但有少陽經證而無陽明府證先與小柴胡湯應當解矣若嘔不止心上急鬱亡微煩者是經迫而府鬱未為解也與大柴胡湯下之經府雙解則愈矣

大柴胡湯八少陽三十一

傷寒十三日不解胸脇滿而嘔日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下之而不利者反利者知

醫以丸藥下之非其治也潮熱者實也先宜小柴胡湯以解外後以柴胡加芒硝主之

十三日不解已過再經之期胸脇滿而嘔是少陽經證日晡時發潮熱是陽明府證府病則大便續硬乃已而微利定脈丸

藥矣少陽而兼陽明此本大柴胡證下之當府熱清而不和利者知醫以丸藥下之後不及事而又遺其經證裏復

未罷經邪束迫府熱日增故雖利不愈此非其治也潮熱者胃家之實也是固宜下而胸脇之滿尚有少陽證先宜小柴胡

易以解其外後宜柴胡加芒硝湯主之解外而並清其裏也但加芒硝而不用大黃者以丸藥下後宿物去而府熱未清也

柴胡加芒硝湯七十三

柴胡半斤黃芩二兩

半夏半升生薑三兩人參三兩甘草三兩大棗十二枚芒硝六兩

於小柴胡湯內加芒硝六兩餘依前法不解更服

少陽壞病入太陰去路柴胡桂枝乾薑證一少陽三十二

傷寒五六日已發汗而復下之胸脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩此為未解也柴胡桂枝乾薑湯主

之傷寒五六日已發汗而復下之傷其中氣脾胃俱逆胸脇滿結脾濕肝遏小便不利膽火利肺是以渴生胃逆未甚不至作

嘔相火逆升故頭上汗出榮衛交爭故往來寒熱君相升泄是以心煩此為少陽之經而傳太陰之藏裏裏俱未解也柴胡

桂枝乾薑湯柴胡黃芩疏甲木而清相火桂枝枳實達乙木而清燥金乾薑甘草溫中而培土牡蠣除滿而消結也

柴胡桂枝乾薑湯七十四

柴胡半斤黃芩三兩甘草二兩乾薑二兩桂枝三兩牡蠣二兩枳實六兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日

三服初服微煩復汗出使愈

誤下身黃證二少陽三十三

得病六七日脈遲浮弱惡風寒手足溫醫二三下之不能食而脇下滿痛面目及身黃頸項強

小便難者與柴胡湯從必下重本渴而飲水嘔者柴胡湯不中與也食穀者噦

得病六七日脈遲浮弱而惡風寒是太陽中風脈證手足溫是少陽證而亦陽明太陰中氣之未敗也醫乃二三下之傷其

中氣脾胃俱逆故不能食而脇下滿痛濁氣衝塞頸項亦強脾濕肝遏遍身發黃而小便難者與柴胡湯黃食寒中肝脾

陷後必下重本來作渴而飲水則嘔者此土濕中寒柴胡不中與也不能容水亦當不能納食飲水既嘔食穀亦噦也

少陽壞病結胸痞證

病在少陽或入陽明之府或入太陰之藏將入陽明而經證未罷下早則為結胸將入太陰誤下則為痞與太陽之結胸痞

證由來正同也

少陽壞病結胸初證一少陽三十四

太陽與少陽併病頭項強痛或發熱時如結胸心下痞硬者當刺大椎第一間肺俞

俞慎不可發汗發汗則譫語脈弦五六日證語不止當刺期門

太陽傳少陽兩經並病太陽則頭項強痛少陽則或覺眩冒時如結胸心下痞硬者此已是結胸初證當刺大椎第一間之

肺俞肝俞刺肺俞以泄太陰之鬱刺肝俞以泄少陽之鬱緣肺與太陽同主衛氣而司皮毛肝與少陽同藏榮血而司筋脈

也慎不可發汗以傷少陽津液發汗則土燥而為證語太枯而為脈弦蓋其胸膈痞硬已是脾胃俱逆再發其汗大烈土焦

遂入陽明而為證語脾胃愈逆則時如結胸者當不止如是而已若五六日證語不止則脾胃之津益耗當刺厥陰之期門

以泄少陽而救陽明也

結胸初證二少陽三十五

太陽少陽並病心下硬頸項強而弦者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之

頸項強太陽之證而少陽自頭下耳循頸而入缺盆亦當有之心硬目眩則純是少陽證大椎脊骨第二節正當項後肺

俞在第三椎兩旁肝俞在第九椎兩旁皆足太陽之經穴靈樞背俞篇作膈經氣之所輸泄也義與輸同汗之藏陰外亡則

為證語上章是也下之表陽內陷則成結胸下章是也

結胸證三少陽三十六

太陽少陽並病而反下之成結胸心下硬下利不止水漿不下其人煩

太少並病不解經邪而反下之因成結胸心下硬者下而下利不止上而水漿不入清陷濁逆相火鬱升其人必心煩也

結胸證四少陽三十七

傷寒十餘日熱結在裏復往來寒熱者與大柴胡湯但結胸無大熱者此謂水結在胸脇也但頭微

汗出者大陷胸湯主之方在太陽百

傷寒十餘日熱結在陽明之裏復往來寒熱大鬱于少陽之表者與大柴胡湯雙解表裏之邪若但是結胸而裏無邪者此為陰陽逼熱而生水飲結在胸膈之間也但頭上微汗出者緣於膈熱薰蒸且大陷胸湯泄其胸膈之結水也太陽陽明結胸必兼少陽之邪緣胆胃兩經鬱迫不降而胸膈硬滿是為結胸之根下之太早裏陰上逆表陽內陷則成結胸而少陽脈循脇助故有脇下硬滿之證也

結胸痞證五少陽三十八

傷寒

五六日嘔而發熱者柴胡湯證具而以此藥下之柴胡證仍在者復與柴胡湯此雖已下之不為逆必蒸蒸而振却發熱汗出而解若心下滿而硬痛者此為結胸也大陷胸湯主之方在太陽

胡湯不中與也宜半夏瀉心湯

嘔而發熱柴胡證具不解經邪而以此藥下之柴胡證仍在是表陽未陷邪猶在經宜復與柴胡湯以解經邪此雖已下不至為逆必蒸蒸而振燥却發熱汗出而解若下後經證已罷心下滿而硬痛者此表陽內陷熱入而為結胸也宜大陷胸湯但滿而不痛者此裏陰上逆而為痞也柴胡湯不中與也宜半夏瀉心湯參甘草薑棗溫補中皖之虛寒黃芩連清泄上焦之鬱熱半夏降濁陰而消痞滿也方以半夏名因原有嘔證下後氣愈逆而嘔愈增也

半夏瀉心湯七十五

半夏半斤 人參二兩 太棗十二枚 乾薑三兩 甘草三兩 黃芩三兩 連翹二兩 右七味水十升煮六升去滓再煎三升溫服一升日三服

傷寒懸解卷十

太陰全篇

太陰藏病

太陰以濕土主令故太陰脾藏不病則已病則是濕土之所以尅水也以其燥也濕則反被水侮少陰寒水之氣傳之于土是以此其藏有寒濕者太陰之主氣寒者少陰之客氣也而太陰之病寒濕者總因陽明之虛脾為濕土胃為燥土陽明之陽盛則濕為燥奪而化熱太陰之陰盛則燥為濕奪而生寒而陰陽虛實之權在乎中氣中氣旺則脾家實太陰從化于陽明中氣衰則胃氣逆陽明從化于太陰陽明下篇諸證皆陽明入太陽之病也未入太陰陰氣外侵猶俟漸奪故太陰之病象頗多半寓於陽明之內已入太陰陰邪內傳勢不久駐故太陰之病條甚少全見于少陰之中蓋脾陽虧虛則水侮而木賊少厥之陰邪勃起而內應於是未去太陰已傳少厥自此少厥告急而太陰之病俱附於少厥之篇矣大凡少厥之死病皆

由脾陽之類敗少厥之生證悉因脾陽之來復太陰一藏是存亡生死之關仲景四逆之垂法大黃芍藥之示戒不可不詳思而熟味也

太陰經提綱一太陰一

太陰濕土氣本上行素問脾胃氣散精上歸于肺是藏行之上行也足之三陰自足走胸是經氣之土行也病則濕盛氣滯陷而不升脾陷則胃逆而不降矣蓋燥為陽而濕為陰陽本于天而親上陰本于地而親下故陽明燥土病則氣逆太陰濕土病則氣陷自然之性也太陰提綱腹滿而吐食不下者太陰之累及陽明而氣逆也自利者太陰之痛者太陰之傷於厥陰而氣陷也脾陷而不升胃逆而不降病見于上下而根在乎中官以中官樞軸之不運也上下之樞軸敗折陷者益陷而逆者益逆逆之至則胸下結硬而不止于腹滿陷之極不過于自利之益甚無以加矣故但言其逆而不言其陷非省文也無庸言也

太陰之為病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛若下之必胸下結硬

太陰脾之經也脾主升清胃主降濁清升濁降腹中中和是以不滿脾病則清陽不升脾病累胃胃病則濁陰不降中氣凝滯故腹滿也吐者胃氣之上逆逆而不納故食不下也利者脾氣之下陷清陽不升寒坐于下水穀不消故自利益甚也濕寒鬱塞木氣不舒侵剋脾土故時腹自痛也若下之土愈敗而胃愈逆甲木壅礙不得下行痞鬱胃氣故胸下結硬即痛發于陰而反下因作痞也 程氏曰太陰濕土其藏有寒則病自是寒豈有傳經為熱之理使陽入陰能化陰為陽則火入水亦能變水為火必無之事也吐利痛滿純是陰邪用事下之陰邪入于陽位究與結胸之邪高下稍異彼因陽從上陷而阻留此緣陰從下逆而不歸寒熱大別 三陰篇言藏病非經病也經病而不入于藏傷寒不過六日中風不過七日無不汗解之理三陰經病總統于太陽一經四日太陰未可曰太陰之為病亦不必痛滿吐利藏寒而用四逆五日少陰未可曰少陰之為病亦不必厥冷吐利水盛而用真武六日厥陰未可曰厥陰之為病亦不必此厥吐利風動而用烏梅不拘其何經其在六日之內者悉宜麻桂發表無異法也至于自經而全藏然後太陽有痛滿吐利之證而用四逆少陰有厥冷吐利之證而用真武厥陰有此厥吐利之證而用烏梅以其一藏之為病如此用藥不得不如此也而桂枝麻黃之法不可用矣昔人傳經為熱真中為寒之說固屬庸妄之胡設程氏乃以藏病為經病且謂傷寒不傳經亦悖謬不通蓋詳少陽傳經中

太陰經病桂枝證一太陰二

太陰病脈浮者可發汗宜桂枝

此在太陽五

太陰病已傳脾藏宜見腹滿吐利腹滿不食諸證若不見諸證而脈浮者是藏病未盛而但見經病也宜桂枝發汗

此在太陽五

太陰藏病四逆證二太陰三

病發熱頭痛脈反沈不差身體疼痛當溫其裏宜四逆湯

發熱頭痛是太陽表證脈應見浮乃脈反沈是已入太陰之藏若脈遲不差雖身體疼痛表證未解然當先溫其裏宜四逆湯甘草培其土乾薑溫其中附子溫其下也

四逆湯七十六

甘草二兩 乾薑兩附子一枚生去皮

踏破八片

右三味以水三升煮取一升二合去滓溫再服強人可大附子一枚乾薑三兩

下利清穀證三太陰四

下利清穀不可攻表汗出必脹滿

脈沈已當溫裏不可發表若見下利清穀之症則藏病益顯不可攻表汗出亡陽必生脹滿

四逆桂枝證四太陰五

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏宜四逆湯取表宜桂枝湯方在太

下利而腹又脹滿是太陰藏病腹滿自利之證俱見矣而其身體疼痛者又有太陰經病是當先溫其裏乃攻其表溫裏宜

四逆湯以驅寒攻表宜桂枝湯以驅風裏溫則發汗不慮其亡陽矣此與太陽傷寒證下之續得下利清穀證法同

四逆證五太陰六 自利不渴者屬太陰以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩

三陽之利津亡裏燥多見渴證自利而不渴者此屬太陰以其藏有寒故也是當溫之宜四逆輩也

黃連證六太陽七 傷寒胸中有熱胃中有邪氣腹中痛欲嘔吐者黃連湯主之

傷寒胸中有熱而胃中有肝膽之邪氣肝邪起脾腹中疼痛胆邪克胃欲作嘔吐者是土氣濕寒而木氣鬱遏也黃連湯黃

連半夏清上熱而止嘔吐參甘草薑棗溫中寒而止疼痛桂枝疏木而通經也

黃連湯七十七

黃連三兩 半夏半升 人參二兩 甘草二兩 大棗十二枚 乾薑二兩 桂枝二兩 右七味以水十升煮取六升去滓溫服一升日三服一日夜

二服

桂枝芍藥證七太陰八 本太陽病醫反下之因而腹滿時痛者屬太陰也桂枝芍藥湯主之

本太陽表證醫不辭表而反下之脾敗肝鬱因而腹滿時痛者此屬太陰也桂枝芍藥湯桂枝解太陽之表邪芍藥清乙

木之風燥也

桂枝芍藥湯七十八



北京中醫藥大學圖書館藏

桂枝兩甘草二兩大棗十二枚生薑二兩於桂枝湯方更加芍藥三兩隨前六兩餘依桂枝湯法

桂枝大黃證八太陰九太實痛者桂枝加大黃湯主之

滿痛而加大黃非瀉不可桂枝加大黃湯倍芍藥以清木燥加大黃以泄土鬱

桂枝加大黃湯七十九

桂枝兩甘草二兩大棗十二枚生薑二兩芍藥六兩右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

芍藥大黃證九太陰十太陰為病脈弱其人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其胃氣弱易動故也

太陰為病其脈軟弱其人當續自便利設腹滿時痛以至大實當行大黃芍藥者宜稍減之以其人太陰既病胃氣必弱易

於傷動故也

暴煩下利證十太陰十一傷寒脈浮而緩手足自溫者係在太陰太陰身當發黃若小便不利者不能發黃至七八日雖暴

煩下利日十餘行必自止以脾家實腐穢當去故也

傷寒浮緩之脈而見手足自溫浮為太陽緩為陽明太陰脾胃同主四肢中焦陽旺四肢自溫其為陽明太陰無以辨也且

以係在太陰太陰濕土表病濕鬱身當發黃若小便不利者濕氣下泄又不能發黃何以別之必驗之太陰陽明則大便自

硬太陰則大便自利候至續自便利則係在太陰確矣然手足溫而小便利則脾家未衰至七八日雖暴煩下利日十餘行

必當自止以此之自利乃脾家之實腐穢當去之故非益甚之自利也此與陽明至七八日大便秘重後此文提下發黃

諸章之綱

茵陳蒿證十一太陰十二傷寒七八日身黃如橘子色小便不利腹微滿者茵陳蒿湯主之

傷寒七八日表寒鬱其裏而內熱熱蒸於身身發黃如橘子色小便不利腹微滿者以土濕木鬱疏泄不行則小便

不利木鬱剋土脾氣脹塞則腹裏微急脾被肝刑土色外見則皮膚重黃緣木主五色入土化黃故也茵陳蒿湯茵陳利水

而除濕梔子大黃泄熱而湯療也

茵陳蒿湯八十

茵陳蒿兩梔子十四枚大黃三兩去皮右三味以水一斗先煮茵陳減六升內二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如皂角

汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

麻黃連翹赤小豆證十二太陰十三傷寒瘀熱在裏身必發黃麻黃連翹赤小豆湯主之



傷寒表病濕熱而生裏熱不得汗尿疏泄身必發黃麻黃連翹赤小豆湯麻黃泄皮毛之鬱杏仁降肺氣之逆生梓白皮清相火而疏木連翹赤小豆泄濕熱而利水薑甘大棗和中氣而補脾緩也以濕旺腹滿脾胃逆升相火鬱遏濕化為熱外無出路是以發黃發汗利水使濕氣滲泄則黃消矣

麻黃連翹赤小豆湯八十一

麻黃二杏仁

四十枚

去皮尖生薑

兩生梓白皮

升連翹

兩甘草

二兩

太棗

十二枚

赤小豆

升

以上八味以潦水一斗先煮麻黃

沸去

上沫內諸藥煮取三分

溫三服半日盡服

梔子蘗皮證十三

太陰十四

傷寒身黃發熱者

梔子蘗皮湯主之

梔子蘗皮湯八十二

梔子十五

甘草

二兩

黃蘗皮

兩

右三味以水四升煮取一升去滓分溫再服

寒濕發黃證十四

太陰十五

傷寒發汗已身目為黃所以然者以寒濕在裏不解故也以為不可下也當于寒濕中求之

黃緣濕熱裏寒者發汗以後身目為黃則是濕寒而非濕熱以汗後熱泄而寒生陽消而濕長也寒濕不可下當于寒濕中求之用溫寒去濕法也

中風欲愈十五

太陰十六

太陰中風四肢煩疼陽微陰澀而長者為欲愈

太陽中風而傳太陰是謂太陰中風脾主四肢脾病不能行氣于四肢氣血壅塞故四肢煩疼并微則陽不上格八澀則陰不下盛脾陽續復脈漸舒長是為欲愈也

太陰解期

太陰病欲解時從亥至丑上

亥子丑太陰得令之時故解于此

傷寒懸解卷十一

少陰經全篇

四十六章

少陰藏病

少陰以陰水而化氣於君火無病之時丁火下降而交水癸水上升而交火水火互根陰陽交濟二氣合為一氣故火不上



熱而水不下寒及其一病丁大上炎而為熱癸水下潤而為寒遂成冰炭矣少陰病但見其下寒而不現其上熱者以水能勝火而大不勝水病則水勝而火負一定之理也水之所以不勝火者全賴乎土水雖有勝火之權而中州之土防其陰邪則寒水不至過濫而君火不至漸亡蓋土旺則水邪不作少陰不病也中氣一敗則脾陽潰寒水無制侵凌君火土之則癸炭不燃下之則堅冰不解雖有四逆真武之法第恐陽神已去陰魄徒存挽之末路桑榆難追故少陰之外證總因土氣之敗也其惡寒此則有少陰之本病其厥逆吐利者水土之合病以水邪侮土脾胃虛寒不能溫養四肢則手足逆冷胃寒而氣逆則吐脾寒而氣陷則利脾胃之寒腎氣之所移也仲景于少陰之病而曰少陰負跌陽者為順也少陰之數妙具此語無餘蘊矣

少陰提綱一少陰一少陰雖從君火化氣病則還其本原寒水司權有陰無陽寒主蟄藏藏氣當今而無微陽以鼓之是以脈微細而善寐陽明之病脈實大而不得寐者少陰之負跌傷也少陰之病脈微細而但欲寐者跌陽之負少陰也蓋主脈則不眠水旺則善眠自然之性如此少陰提綱揭此一語而少陰之性情體狀傳具如畫則扶跌陽而泄少陰自是為第一要義於此而稍事滋潤將使之千古寒寐矣少陰醒夢之關不可不急講也

少陰之為病脈微細但欲寐也

少陰腎之經也陰盛于水獨陰無陽故脈微細陽動而陰靜靜則善眠故但欲寐而脈法浮為在表沈為在裏數為在府遲為在臟少陰之脈微細必兼沈也

少陰藏病連經麻附細年證一少陰二少陰病始得之反發熱脈沈者麻黃附子細辛湯主之

少陰水藏其脈自沈乃始得病時反發熱而脈沉者是以傳腎藏而猶帶表寒內有少陰則宜溫裏外有太陽則宜發表麻黃附子細辛湯麻黃散太陽之外寒附子溫少陰之內寒細辛降陰邪之衝逆也溫裏以發表少陰之汗法如此此與太陽病發熱頭痛脈反沈者同

麻黃附子細辛湯八十三

麻黃二附子一枚炮去皮細辛兩右三味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服麻黃甘草證二少陰三少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏證故微發汗也

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發其汗麻黃發太陽之表附子甘草溫癸水而培己土少陰禁汗此微發汗者以二三日內尚無少陽之裏證故微發汗也此推原上章之義無裏證何以知為少陰是必脈已見沈沈為在裏何以宜汗是

必發熱也

麻黃附子甘草湯八十四

麻黃二兩附子一枚炮去皮甘草二兩

少陰藏病汗證三少陰四少陰病脈細沈數病為在裏不可發汗

少陰病發熱脈沈猶可微汗若身無發熱而沈甚細數此為病已在裏不可發汗蓋大旺土燥寒水不能獨成水盛而寒作

者由大土俱敗也再汗之以泄陰中絲微陽根則純陽而無陽大事壞矣故不可汗少陰藏病連經者云云麻黃附子二

方是也自此章之下悉是藏病並無一字言經病者藏寒水動乃可曰少陰病若五日經傳少陰未入腎藏以陰諸證發熱

髮未形而此時三陽太陰經證俱在何得曰少陰病乎曰少陰病者少陰盛極獨自為病也陽明三陰俱同

四逆證四少陰五少陰病脈沈者急溫之宜四逆湯方在太

陽消陰長則人衰陽虛陰旺則人病陽絕陰孤則人死陽盛于大陰盛于小水人性浮而水性少陰水藏病見沈脈則經陽却

事藏陰司權死機低伏法當急溫宜用四逆遲則水動寒則死證蜂生溫之無及矣腎水有泄而無補凡人之死死于水寒

之盛也仲景傷寒少陰但有泄水補火之法而無泄火補水之方其餘六經以及金匱雜證泄火則有之補水則未有後世

庸愚妄議乃有泄火補水之法俗子腐生屢而效之者作紛紛以為天下後世禍今日遂成海內惡風江河日下不可挽也

附子證五少陰六少陰病身體疼手足寒骨節痛脈沈者附子湯主之

少陰水旺陰凝氣滯故骨節痠痛土敗水侮四肢失溫故手足寒冷水寒木陷生氣欲絕故脈沈細附子湯附子溫於水之

寒芍藥清己木之風參朮培土而泄水也

附子湯八十五

附子一枚去皮茯苓三兩人參二兩白朮四兩芍藥三兩右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服

附子證六少陰七少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附子湯主之

一二日中背惡寒者督脈之陽衰太陽寒水之旺當灸之以溫外寒附子湯以溫內寒也後章口燥咽乾者急下之此曰口

中和則純是濕寒而非燥熱也互觀自明

效利證語證七少陰八少陰病欲下利證語者被大氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

少陰寒水之盛下利則有之不應證語效而下利證語者此被大氣逼劫發汗耗其心液陽隨汗泄神明氣亂故也其小便



必難以少陰陽弱不宜發汗太過而強責之泄其血中溫氣濕旺木鬱不能疏泄也

發汗動血證少陰九少陰病但厥無汗而強發之必動其血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上竭為難治

汗生於血而釀于氣譬之釜水騰沸氣蒸為露也少陰病氣虛血寒但有厥逆而無汗而強發之必動其血血之所止

溢者氣斂之也氣根于水強發其汗泄其陽根衛虛不斂榮血失統上走七竅未知從何道而出或從口鼻或從目出是名

下厥上竭最為難治以陰盛于下陽盛于上下之陰盛故見厥逆上之陽盛故見血脫血中溫氣絕根外亡則陽竭矣

發汗亡陽證少陰十少陰病脈微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脈弱者復不可下之

陽虛故脈微脈微發汗則陽根亦亡是以不可發汗陽氣已虛而尺脈弱者則血中之溫氣非旺復不可下之也

咽痛吐利證少陰十一病人脈陰陽俱緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而後吐利

陰陽俱緊陰陽即傷寒之脈不應有汗反汗出者陽亡于外也則此之脈緊乃裏陰之內盛非表寒之外來矣此屬少陰法

當咽痛而後吐利水旺火盛則咽痛水旺土濕則吐利也此提少陰咽痛吐利之綱下分應之

甘草桔梗證十一少陰十二少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差與桔梗湯

二三日初覺咽痛者可與甘草湯以少陰水旺君相皆騰之火逆衝是以咽痛甘草泄熱而緩急迫也不差者與桔梗湯甘

草泄熱而緩急迫桔梗降逆而開結滯也

甘草湯八十六甘草二兩以水三升煮取一升半去滓溫服七合日三服

桔梗湯八十七桔梗兩甘草二兩以水三升煮取一升去滓分溫再服

半夏散證十二少陰十三少陰病咽中痛半夏散及湯主之

濁陰上逆衝咽喉因而作痛半夏桂枝降其衝氣甘草緩其急迫也

半夏散八十八

半夏洗桂枝去甘草以上等分

散兩方寸匕更煎三沸下火令小冷少少服之

苦酒湯證十三少陰十四少陰病中咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主之

右三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸匕日三服若不能服散者以水一升煮七沸內

寒水下旺火盛咽傷故生瘡不能言語金被火刑故聲不出苦酒湯苦酒散結而消腫寒更降逆而驅濁雞子白清肺而發

半夏十四雞子一枚去黃內苦

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鏤中安火上令三沸去滓少少含之不寒更作

三劑服之苦酒即

猪膚湯證十四少陰十五少陰病下利咽痛胸滿心煩者猪膚湯主之

寒水侮土肝脾鬱陷而為下利胆胃俱逆相火升故咽喉腫痛胸滿心煩猪膚白蜜清金而止痛潤燥而除煩白粉收澀利而滑滑澆也

猪膚湯九寸

猪膚斤右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白粉五合熬者和令相得溫分六服猪膚即猪皮能清熱潤燥

四逆證十五少陰十六少陰病飲食入口即吐心中溫溫欲吐復不能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也當

吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜四逆湯方在太陰

入口即吐者新入之飲食心中溫溫欲吐復不能吐者舊日之痰涎此先有痰涎在胸故食入即吐而宿痰膠滯故不能吐

溫溫者痰阻清道居火鬱遏濁氣翻騰之象也手足寒者陽鬱不能四達也陽衰濕旺是以脈遲土濕木鬱是以脈弦此胸

中邪實不可下也腐敗壅塞法當吐之若膈上有寒飲乾嘔則主敗胃逆不可吐也當急溫之宜四逆湯

下利煩渴證十六少陰十七少陰欲吐不吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故飲水自救若小便赤色白者

少陰病形悉具小便白者以下焦虛有寒不能制水故令色白也

心火上騰則生煩腎水下旺故欲寐五六日自利而渴者此屬少陰也利亡津液於是作渴津愈亡而陽愈泄口雖作渴而

實陽虛陽虛則津亡故飲水自救若小便色白則少陰病形悉具矣小便之白者以下焦陽虛而有寒不能制水故令色白

也制水者土土鬱則冠水濕熱鬱蒸而小便黃者土色之下傳也土敗陽亡不能制水故小便色白

吳茱萸證十七少陰十八少陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之方在陽明六十

吐利厥逆煩躁欲死則中氣頗敗微陽離根矣吳茱萸湯象太寒培土而補中吳茱萸生薑溫胃而回陽也

真武湯證十八少陰十九少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重痠痛自下利者此為有水氣其人或欬

或小便利或不利或嘔者真武湯主之



北京中医药大学图书馆藏

二三日不已以至四五日寒水泛濫土濕木鬱風木賊土是以腹痛去濕而木不能泄故小便不利濕流關節淫四肢故沈重痠痛寒水侮土故自下利凡此諸證為土病不能制水有水氣停聚故也其人或肺氣衝逆而為欬或木不能疏泄而小便不利或土濕木鬱而不便利或胃氣上逆而作嘔者皆緣水氣之阻隔真武湯苓朮泄水而燥土生薑止嘔而降濁附子溫參水之寒芍藥清乙木之風也

真武湯九十一

茯苓兩白朮兩生薑兩附子一枚炮去右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三服若欬者加五味半升

細辛乾薑各一兩五味乾姜細辛各一兩若小便不利者去茯苓利小便若下利者去芍藥加乾薑三兩利濕

嘔利汗出證十九少陰二十少陰病下利脈微瀉嘔而汗出必數更衣凡少者當溫其上灸之

脾陽則為利利亡血中溫氣是以脈瀉胃逆則為嘔陽氣升泄是以汗出陽氣愈升則下愈寒而利愈多必數更衣乃利反

猪苓證二十少陰二十一少陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之方在陽明六十

脾陽而為利胃逆而為嘔肺逆而為欬火升而為煩渴陽泄而廢臥眠是皆水泛而土濕故也宜猪苓湯三苓滑澤瀉已土

而泄濕阿膠滋乙木而潤燥也

四逆散證二十一少陰二十二少陰病四逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下重者四逆散主之

寒水侮土四肢厥逆其人或肺逆而為欬或木鬱而為悸或土濕木鬱而為小便不利或寒氣凝滯而腹中痛或清氣沈陷而泄利下重者是皆土鬱而木賊也宜四逆散甘草枳實芍藥培土而泄滯柴胡芍藥疏木而清風也

四逆散九十二

甘草炙枳實破水柴胡芍藥右四味各十分搗篩自飲和服方寸匕日三服欬者加五味子乾薑各五分並主下利

姜溫中則陽者自升逆者自降也悸者加桂枝五分土濕木鬱則為悸動小便不利者加茯苓五分枳實腹中痛者加附

子一枚炮令碎附子水而溫藥木而舒肝嘔利下重者先以水五升入薤白三升煮取三升去滓以散方寸匕內湯中

煮取一升半分溫再服而升陽也

通脈四逆證二十二少陰二十三少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾

通脈四逆證二十二少陰二十三

少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面色赤或腹痛或乾



嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆湯主之其脈即出者愈

下利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕陰旺陽虛是見惡寒則陽敗而無生望若身反不惡寒其人面見赤色或風木賊土而腹痛或瀉氣上逆而乾嘔或滯氣衝擊而咽痛或下利雖止而脈微欲絕不出者是陽弱而氣鬱也通脈四逆湯主之溫中而培土附子後下而回陽服之其脈即出者是陽回而氣達其病當愈以其陽微欲絕而實原本常絕也

甘草三兩 乾薑三兩 附子大者一枚 炙甘草三兩 乾薑三兩 附子大者一枚

則面赤如紅腹中痛者去葱加芍藥二兩以充經脈利止脈不出者去桔梗加人參二兩以充經脈

白通湯證二十三少陰二十四少陰病下利白通湯主之

少陰病下利氣虛陽陷則脈絕不出白通湯主之

白通湯九十四

葱白四兩 乾薑二兩 附子一枚 炙甘草三兩 乾薑二兩 附子一枚

白通湯證二十四少陰二十五少陰病下利脈微者與白通湯利不止尿逆無脈乾嘔煩者白通加豬膽汁湯主之服

湯服暴出者死微續者生

白通湯原為下利脈微故以葱白通其脈也乃下利脈微者與白通湯而下利不止尿逆無脈加以乾嘔而心煩者此以陰

盛陽格薑附不得下達愈增上熱故下利脈微依然而嘔煩並作宜白通加豬膽汁湯人尿猪膽清相而除煩嘔薑附下

行而溫水土葱白上達而通經脈脈應出矣而出不宜驟湯服而脈暴出者陽根已絕而外脫則死脈微續者陽根未斷而

徐回則生矣

白通加豬膽汁湯九十五

葱白四兩 乾薑二兩 附子一枚 炙甘草三兩 乾薑二兩 附子一枚

若無膽亦可用人尿合猪膽汁合以上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁人尿和令相得分溫再服

桃花湯證二十五少陰二十六少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止便膿血者桃花湯主之

二三日以至四五日水寒土濕愈久愈盛脾陽肝鬱二氣逼迫是以腹痛未鬱不能行水故小便不利木愈鬱而愈泄水道

傷寒懸解

卷十一

不通則設道不飲故下利不止太鬱血陷寒濕腐敗風木推剝故便膿血桃花湯粳米補土而泄濕乾薑溫中驅寒石脂斂陽而固脫也

桃花湯 九十六

粳米升乾薑三兩亦石脂一斤一半煮

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內石脂末方寸匕日三服若二服愈者勿服

桃花湯證二十六少陰二十七少陰病下利便膿血者桃花湯主之

少陰水藏下利而便膿血總是濕寒為無濕熱之理桃花湯實為主方不可見也

下利膿血證二十七少陰二十八少陰病下利便膿血者可刺

靈樞脈度盛者泄之虛者飲藥以補之桃花湯之治便膿血之虛者也若稍盛而生熱者可刺經穴以泄之

身數便血證二十八少陰二十九少陰病八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱膀胱太陽之經為諸陽主氣總統皮毛故府熱則一身俱熱是

少陰與太陽為表裏八九日一身手足盡熱者以熱在膀胱膀胱太陽之經為諸陽主氣總統皮毛故府熱則一身俱熱是

必病便血素問五藏別論五藏者藏精氣而不瀉六府者傳化物而不藏腎藏也膀胱府也腎溫則陽氣秘藏而血不流溢

腎寒則藏中之陽散于膀胱之府府熱故血海不秘隨膀胱而輸泄必便血也 癸水上升而化丁火故少陽水大同經而

獨以君火主令水升而火化則癸水不寒丙火下降而化壬水故太陽水大同氣而獨以寒水司權火降而化水則丙火不

熱病則癸水不化丁火故少陰腎善于病寒丙火不化壬水故太陽膀胱善于病熱此其中有甲乙之木邪為肝以風木而

主疏泄膽以相火而主秘藏腎之溫煖而蟄封者相火之秘藏也膀胱之清涼而通利者風木之疏泄也病而風木不能疏

泄故水道不通相火不能秘藏故膀胱有熱足少陽自頭走足病則上逆手少陽自手走頭病則下陷膀胱之熱者手少陽

三焦之相火離腎藏而泄于膀胱一身手足之熱者足少陽膽經之相火離腎藏而泄於肢體也肝木藏血而其性疏泄木

陷于水疏泄不行怒而生風愈欲疏泄泄而不暢其輕則為水淋其重則為血淋淋血之家痛澀而頻數者風木強泄而不

暢也便血之證數在膀胱而腎藏則寒蓋腎寒不能生木而後木鬱而生風風性善泄泄而愈陷愈陷而愈泄故血不上

行而病下脫其膽火之逆于肢體者風木之疏泄也其三焦之泄于膀胱者風木之鬱陷也

少陰亡陽死證少陰三十 少陰病脈微沉細但欲卧汗出不煩自欲吐至五六日自利復煩燥不得臥寐者死

脈微沉細但欲卧者水旺而陰盛也汗出自欲吐者火泄而陽升也微陽上越而根本未拔是以不煩至五六日寒水愈旺下見自利復煩不得卧寐則陽根脫泄必死無救也

