



御纂醫宗金鑑卷六十六



編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹

紫舌脹屬心經火熱盛血壅腫硬疼舌腫滿口宜
鍼刺血色紫重色紅輕

註

此證由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬
疼痛宜用衣鍼紫筋頭上露鋒分許當舌刺
數十刺令血出紅色者輕紫色者重隨以溫



御纂醫宗金鑑卷六十六

編輯外科心法要訣目錄

舌部

紫舌脹

痰包

舌衄

重舌

痰核

重腭



舌疔

舌疔

附療癰風

喉部

緊喉風

附纏喉風

慢喉風

喉閉

附酒毒喉閉

啞瘡喉風

弄舌喉風

喉疔



南京中醫藥大學圖書館版權所有

喉癰

上腭癰

鎖喉毒

乳蛾

喉瘤

胸乳部

甘疽

膈中疽

脾發疽

印集安言天全益
卷之六
口錄



南京中医药大学图书馆版权所有

井疽

蜂窩疽

蠹疽

癰疽

內外吹乳

乳疽

乳癰

乳發

乳漏



南京中醫藥大學圖書館版權所有



乳中結核

乳勞

乳岩



御纂醫宗金鑑卷六十六



編輯外科心法要訣

舌部

紫舌脹

紫舌脹屬心經火熱盛血壅腫硬疼舌腫滿口宜
鍼刺血色紫重色紅輕

註

此證由心經火盛血壅以致舌腫滿口堅硬
疼痛宜用衣鍼紮筋頭上露鋒分許當舌刺
數十刺令血出紅色者輕紫色者重隨以溫



水漱口搽水礪散內用涼膈散去朴消大黃

加牛蒡子荊芥倍用梔子服之甚效

永礪散

見口部
驚口瘡

涼膈散

見面部
面發毒

痰包

痰包每在舌下生結腫綿軟似匏形痛脹舌下妨

食語火稽痰涎流注成

註

此證生於舌下結腫如匏光軟如綿塞脹舌

下有妨飲食言語色黃木痛由火稽痰涎流



南京中醫藥大學圖書館版權所有

注而成宜用立剪當包上剪破出痰涎如雞
子清稠黏不斷拭淨搽冰硼散服加味二
湯忌煎炒火酒等物

加味二陳湯

陳皮

半夏

製

白茯苓

黃芩

各八分

黃連

薄荷

甘草

各五分

水二鍾薑三片煎八分食前服

方歌加味二陳療痰包結腫舌下形如匏二陳湯

加苓連薄薑煎服下自然消

永礪散

見口部
驚口瘡

舌衄

舌衄心火血分炎舌上生孔似鐵尖或如筋頭其
色紫甚黑腐爛血出泉

註此證係舌上忽生孔小者如鍼尖大者如筋

頭其孔色紫屬熱甚色黑防腐爛血出如泉
湧由心火上炎以致血熱妄行而成宜服升



南京中醫藥大學圖書館版權所有

脉湯兼搽必勝散甚效

升麻湯

升麻

小薊根

茜根

各一兩五錢

艾葉

七錢五分

寒水石

三兩

共研每三錢水一鍾煎七分澄去渣入生地

黃汁一羹匙再煎二滾溫服或加炒側柏葉

五錢亦可

方歌升麻舌衄心火炎小薊茜根各兩半艾葉七



錢五分加寒水三兩同研爛

必勝散

螺青

另研

蒲黃

各一錢炒

共合一處研細搽於患處後用溫鹽湯漱口

方歌必勝心熱血妄行舌生小孔湧血紅螺青研

末蒲黃炒同勻搽之自歸經

重舌

痰核

重腭

舌疔

舌證發於心脾經其證皆由積熱成重舌舌下血
齰脹痰核舌上一核生重腭生於口上腭時覺心



南京中醫藥大學圖書館版權所有

煩梅子形舌疔舌上生紫炮其形如豆寒熱增

註

此證無論大人小兒俱可以生重舌者由

脾蘊熱循經上冲舌本遂令舌下血脈脹

大

如小舌狀故名重舌宜用冰硼散搽之痰核

者心脾痰涎鬱熱舌上生核強硬作痛宜用

衣鍼點破搽冰硼散內服加味二陳湯重膠

者心脾有熱以致上腭生瘡形如梅子外無

寒熱內時作煩此屬熱極禁用鍼刺宜服黃

連解毒湯加桔梗不時用紫雪散噙化舌疔



者心脾火毒舌生紫皰其形如豆堅硬寒熱
疼痛應心初起宜用蟾酥丸含於舌下隨
隨嚥或再服三粒以解內毒甚者刺之服
連解毒湯兼搽紫雪散及徐徐嚥之即愈

紫雪散

犀角 鎊

羚羊角 鎊

石膏

寒水石

升麻

各一兩

元參

二兩

甘草

八錢

沉香 剉



木香

各五錢

水五盃煎藥剩湯一盃將渣用絹濾去將再煎滾投提淨朴消三兩六錢文火慢煎

氣將盡欲凝結之時傾入盃內下硃砂冰片

各三錢金鉚一百張各預研細和勻將藥盃

安入涼水盆中候冷凝如雪爲度大人每用

一錢小兒二分十歲者五分徐徐嚥之卽效

或用淡竹葉燈心煎湯化服亦可咽喉腫痛

等證吹之亦效



方歌紫雪散醫積熱效沉木犀鈴元參草寒水升

膏朴消加硃鉞冰研入內攪

冰硼散

見口部
鵞口瘡

加味二陳湯

見痰包

黃連解毒湯

見耳部
黑疥

蟾酥丸

見疥瘡門

舌疳

附療癰風

舌疳心脾毒火成如豆如菌痛爛紅漸若泛蓮難

飲食綿潰久變癰癰風



南京中醫藥大學圖書館版權所有

註此證由心脾毒火所致其證最惡初如豆次

如菌頭大蒂小又名舌菌疼痛紅爛無皮

輕暮重急用北庭丹點之自然消縮而愈

失於調治以致癰腫突如泛蓮或有狀如鷄

冠舌本短縮不能伸舒妨礙飲食言語時津

臭涎再因怒氣上冲忽然崩裂血出不止久

久延及項領腫如結核堅硬聾痛皮色如常

頂輒一點色暗木紅破後時津臭水腐如爛

棉其證雖破堅硬腫痛仍前不退此爲綿潰

