

臨證指南醫案卷八

滸關李大蟾翰圃

古吳葉 桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九全較

朱參 邵 銘新甫

衄

溫邪

某

溫邪衄血

石膏

天冬

半夏

附註

某

連翹

蒸水

元參

贈血

淡黃芩

黑山梔皮

杏仁

鬱金

某

風溫衄血

葛根

赤芍

附註

南京中醫藥大學圖書館版權所有



臨證指南醫案目

卷八

効

症

頭痛

心痛

胃脘痛

脇痛

腹痛

肩臂背痛

腰腿足痛

諸痛

耳

目

鼻

牙

咽喉

瘡瘍



南京中医药大学图书馆版权所有

臨證指南醫案卷八

滸關李大蟾翰圃

古吳葉 桂天士先生著

錫山鄒錦畹滋九全較

朱參 邵 銘新甫

衄

溫邪

某

溫邪衄血

石膏

天冬

半夏

附註

某

連翹

蒸水

元參

贈血

淡黃芩

紫草

黑山梔皮

附註

杏仁

鬱金

某

風溫衄血

葛根

赤芍

附註

附註

附註

丹皮

元參

連翹

赤芍

茅花

黑梔皮

濕熱胃
火上蒸

膽火上
升心營
熱

某三此熱蒸於水穀之濕齶血。斂納穀如昔。治在陽明。

四

熟地

知母

石膏

元參

牛膝

陳女常有衄血。今夏忽起神識如呆。診脈直上魚際。大忌驚恐惱怒。天癸得通可愈。

犀角

丹參

元參

生地

連翹

知母

甘草

全草

林六陽升。鼻衄不止。

細生地

烏犀角

炒知母

牛膝

黑山梔

某

川斛 努力傷陽逆鼻衄。

丹皮

芩

炒黑側柏葉

犀角

二錢

細生地

三錢

炒丹皮

一錢

元參

一錢

炒牛膝

半錢

黑山梔

一錢

炒黑側柏葉

五錢

臨服冲鮮荷葉汁一小杯

趙十脉左數。衄血火升。

生地

阿膠

天冬

麥冬

淡菜

生白芍

茯神

炒山藥

程從前衄血都以養陰益氣而愈。知非實熱皆勞役陽
冒以致陰血之動也。今壯年肌肉不充。身動氣促如喘。

冒
陰虛陽

口中膩涎濁沫。竟是腎精帶傷。收納失職之象。急急保
養。遠戒酒色。猶可向安。

當用生地

熟地

人參

萸肉

湖蓮

芡實

補骨脂

山藥粉丸

朱七脈數。陰虧陽升。頭暈心中煩雜。鼻衄。

生地

元參

金銀花

川斛

丹皮

石決明

炒黑附子

正雞

某咳逆失音。衄血。

止血

炒丹皮

正參

生地

龜板

丹皮

牛膝

山藥

茯苓

炒黑附子

正雞

某歲鼻衄時發

生地

元參

丹皮

山藥

茯苓

澤瀉

黃柏

人中白

胃
酒熱傷

菜

食燒酒辛熱及青梅酸泄遂衄血咳嗽心腹極熱五

味偏勝。腑陽臟陰爲傷。此病以養胃陰和法。

生白扁豆

北沙參

麥冬

白梗米

治衄諸方為最
甲最穩當

血行清道從鼻而出古名曰衄與濁道之吐咯者不同清道卽指至高之分由山根以上睛明之次而來也其穴乃手足太陽足陽明陰陽蹻五脈之會及衝脈交會其間可見諸經皆能爲衄不獨肺胃而然諸



南京中医药大学图书馆版权所有

書雖已詳明。惟景岳辨之尤切。但訥之爲患。總由乎火外爲六淫之變化。內因五志之掀騰。氣血日爲錯亂。陰陽爲之相乘。天人交感之處。虛實攸分矣。若風寒壅盛於經。陽氣鬱而迫營者。宜參麻黃桂枝症之大意。若溫風暑熱怫鬱而動血外溢者。用辛涼清潤等劑認定經絡之高下。若火邪極甚。而載血上泛者。有苦寒鹹寒之法。審其原委之淺深。此外因主治法也。至於煩冗曲運。耗及木火之營。肝臟厥陽化火。風上灼者。甘鹹柔碗理所必需。多勞過慾。病及天一之真。陽浮引陰血以冒上竅者。滋潛厚味。法從峻補。血

脫則挽回元氣。格陽則導火歸源。因酒用和陽消毒之劑。因努力用培中益下之方。此內因主治法也。學者惟審內外兩因。庶乎施治無誤矣。邵新甫



南京中医药大学图书馆版权所有

督任陽虛

某

疝

七疝治法最詳子和其旨辛香以泄肝得氣疏泄而病緩矣。按法調理不愈七味導引納腎益氣升舉脾陽而墜氣仍然艾炙蒸臍原得小安內經任脈爲病。男子內結七疝女子帶下瘕聚同爲奇經主之故疎泄諸方能治氣實參术升補僅治中虛下陷與元海奇經中病無補壯歲至老病根不輟下焦日衰可知升陽一法體症頗合衰年僅可擇持勿使病加可矣。

方不切疝

生鹿茸

三錢

鹿角霜

一錢

當歸

二錢

生菟絲子

五錢

濁陰凝
聚肝絡

沙蒺藜一錢

川桂枝尖五分

飢時服

朱二勞傷溫裏已效。躋旁動氣少腹結疝。睾丸偏墜。皆陽氣不自復。濁陰聚絡。不宜急於育子。

當歸

舶茴香

淡蕘蓉

枸杞子

安息香

茯苓

孫疵墜於右筋縮連小腹痛此寒主收引議進溫通厥陰之絡。

川棟子二兩

穿山甲二兩

炮黑川烏五錢

去皮

炒黑小茴香一兩

橘核二兩

乳香五錢

用老韭白根汁泛丸飢時服二錢五分

明

臍下少腹形象橫梗發必痛達脇腰以及陰囊此乃

厥陰肝氣不宣議以苦辛加左金佐通經脈之凝濤。

川連

吳萸

穿山甲

青木香

金鈴子

延胡

青橘葉湯丸

郁十肝病絡虛氣聚少腹滯脹前用河間金鈴子散加牡蠣橘葉合鹹苦辛勝法小效加食述飢則脇腹鳴盛而濁氣下泄頗安乃絡虛不足中之有餘形質瘦怯不可純攻

桃仁

當歸稍

炒小茴

橘核

郁李仁

南山楂

蔥白汁丸

謝五七疝皆肝少腹堅聚有形是閉塞不通之象百日久
恙血絡必傷古人治疝必用辛香助燥氣勝之品宜緩
商矣。

歸鬚杜牛膝根小茴香川棟子

穿山甲柏子仁

林脈右弦左濇當臍痛連少腹已屬凝聚有形嘔吐黃

濁大便欲解不通若患處漉漉有聲痛勢稍減惟臥著
體不轉移其痛更加此屬肝氣疝瘕辛香流氣所稱通
則不痛耳。

炒桃仁炒橘核金鈴子炒延胡

味切病製方
本宜如是古人

韭白汁

兩頭尖

小茴

青皮

此通泄厥陰氣血方也。痛甚於下。濁結有形。非辛香無以入絡。非穢濁無以直走至陰之域。以子和方合奉議意。

施四

立冬前一日。寒戰後熱屬厥陰。食蠍鹹寒沉墜。浮腫囊大。洩溺甚少。至晚腫脹愈加。顯然陽微濁聚。治從氣分開泄冷溼。

粗桂枝

吳萸

川棟子

茯苓

生牡蠣

澤鴻

磨青皮汁十匙

膀胱寒
溼凝滯

唐三六寒溼已入太陽之裏。膀胱之氣不利。陰囊脹腫。

五苓散加獨活漢防已

筋瘤

某

肝風筋瘤。怒勞致傷。宜通補熄風。

蕤蓉

補骨脂

歸鬚

小茴

韭子

奇脈陽虛

朱

動氣瘤痕。達臍汨汨有聲。男子精氣不充。是下焦損

傷。溫補勿過剛燥。須察八脈以推病情。

淡蕤蓉

歸身

炒枸杞

小茴

炒沙苑

茯苓

紅棗肉

鬱怒肝
疝腫脹

汪

自云鬱怒不已。夏季忽起腹脹。醫以快氣疎滯湯藥。其脹竟入小腹下墜。青筋外突。脹甚延及腎囊。乃肝疝