

辨證錄卷之七

山陰陳士鐸敬之甫號遠公又號朱華子著述

會稽陶式古號甫號存齋又號

參

痲痺門

一感溼熱之氣忽又傷風口噤不能言項背幾幾脚手攣

急角弓反張人以為太陽之傷寒也誰知是太陽之痲

病乎夫痲病亦有三陽三陰之殊亦能傳經與傷寒之

症無異但傷寒單傷於風而痲病則合溼熱而成之也

似乎治傷寒可單治風而無難痲病宜兼治溼熱而不



易也誰知邪之所奏其氣必虛一邪犯之已足正氣之
虧况三邪之同犯乎補正以祛邪治瘕無難速愈或謂
一邪相犯尚須祛邪爲先三邪並犯則邪氣熾漫非用
祛邪之藥安能濟哉不知一邪之犯其力專衆邪之犯
其勢散力專者宜攻勢散者可補於補之中而行其攻
之法何不濟之有無如其症同於傷寒不啻驟用補也
所以殺人苟知可補之法分症以治之實易易也如此
症見太陽之徵不可徑治太陽之邪宜補太陽之正太
陽之正氣旺而風溼熱之邪不必攻而自散矣方用五

苓散加減治之白朮一兩茯苓一兩澤瀉三錢猪苓一錢羌活五分桂枝三分水煎服一劑而角弓反張之疾定二劑而口不噤脚手不攣急也三劑諸症盡痊五苓散專利膀胱之水三邪之中至難去者溼耳先利其溼則火隨水泄而風邪無黨矣故少用羌活桂枝以祛風則風自易解况五苓散亦非單利濕之藥也其白朮茯苓原能健脾生胃今多加爲君則補重而利輕所以能建功之速倘少少用之則攻多於補反無益矣

此症用桂苓薏苳湯亦效

茯苓一兩羌活二錢薏苳仁一兩桂枝三分水煎服



感溼熱之氣又感風邪頸項強直一目或左右視手足
搐搦人以爲少陽之傷寒也誰知是少陽之瘕病乎夫
少陽居於半表半裏之間其勢將欲入肝也而尚留於
陽明故三邪同感目所以左右視亦現證於二者之間
耳手足搐搦者風性動而溼性靜兩相違背風欲動而
溼挽之溼欲靜而風激之熱邪又從中沖擊此搐搦之
所以起也搐搦不已又風引而上行於是頸項不利而
溼氣留中遂至強直不搖矣治法必須和少陽之正氣
少用散邪之品易於解紛也方用小柴胡加減治之柴

胡二錢白芍五錢當歸三錢茯苓五錢黃芩一錢甘草

一錢水煎服一劑病減再劑病全愈小柴胡湯和

之聖藥也今又加入白芍當歸以補其肝中之氣使肝

旺而邪不敢遁於肝加茯苓五錢以健胃而利溼則邪

不敢回於胃茯苓且同柴胡以祛風熱引之而共入於

膀胱尤易下走此又法之至神者也

此症用龍車

散亦效

柴胡甘草各一錢白芍茯苓各五錢

車前子三錢龍膽草五分水煎服

一感溼熱之氣復感風邪手足牽引肉瞶胸脹低頭視下



肘膝相構人以爲陽明之傷寒也誰知是陽明之瘧症
乎夫陽明胃土也風入於胃必變爲熱况原感熱氣則
熱以濟熱宜至發汗亾陽何肉暱胸脹而不發狂乎
牽引而不出汗反低頭視下無登高而呼之症肘膝相
構無棄衣而走之疴正以溼邪混之也蓋陽明之火最
惡者燥耳今有溼氣在胃雖侮胃中之土亦益胃中之
燥卽發汗而不至亾陽發狂之禍也若妄用風藥以散
其表必至汗出而不可止仲景張夫子曾用大承氣湯
以下其邪然而脾旺者尚不致損傷脾氣否則下之亾



陰恐有意外之虞也然則風溼熱既同入於胃中則治法不可不治胃而又不可傷胃也方用全陰救胃湯參五錢茯苓五錢桃仁一錢葛根一錢人參一錢麥冬五錢水煎服一劑病半痊二劑病全愈方中資胃中之陰而不損其胃中之氣玄參去熱葛根去風茯苓去濕三邪皆去而又得人參以生胃麥冬以生肺則桃仁不亦可以已乎不知桃仁最動之味三邪併入於胃中而補藥多於攻藥則邪得補而反流連不去加入桃仁性急之物補既不滯而攻亦不緩始能相濟以有成也

此症用二苓槐

膏湯亦妙

石膏猪苓槐米各三錢茯苓

錢防已五分黃芩一錢水煎服

一感溼熱之氣復感風邪發熱腹痛肌肉顫動四支攣

人以為太陰之傷寒也誰知是太陰之痙症乎太陰者

脾經也脾土溼土也溼土何堪溼邪之再犯乎溼入於

脾最難分消溼邪去而溼之根尚在一再感溼仍如前

溼之病矣况加熱以發其炎蒸加風以生其波浪自然

中州反亂而四境騷然堅急之勢成顫動之形兆倘用

安土之品則土旺而水無泛濫之虞水乾而土無鬱勃



之氣風節欲作祟而平成既奏亦可以解慍矣無如
入動輒言下詎識下多亡陰無陰以灌注於五臟
胸腹手足何所資以爲養哉勢必堅急顫動有亡陰而

死者矣方用安土散白朮一兩茯苓五錢車前子三錢

薏仁五錢赤小豆一錢通草一錢柴胡五分石斛三錢

水煎服此方以利水之藥爲君仍是健脾之藥蓋土旺

自能制水況又有利之者乎此症原是溼邪之難治卑

去攻溼而風與熱邪自易吹散所謂攻邪必攻其堅也

譬如大敵在前滿山遍野俱是賊黨倘止從偏旁掠陣



則賊且全營俱來死鬪反至敗衄不若竟攻中堅突圍
直入搗擒巨魁則餘氛不戰而自遁瘧病之重治瘧邪
亦正此意可借敵而作鑒也

此症用薏米定

瘧湯亦效

白朮一兩薏仁芡實各五錢柴胡知母
甘草天花粉各一錢神麩二錢水煎服

感溼熱又且感風遂成癘瘧身蹠足彎不能俛仰人以
為少陰之傷寒也誰知是少陰之瘧病乎夫少陰者足
少陰腎也腎宜熱不宜寒宜濕不宜燥何以瘧病有濕
有熱反成癘瘧蹠彎不能俛仰之症耶不知腎最惡風



而喜熱者喜真火之生也喜邪火之尅也喜真水之
非喜邪水之傷也蓋邪少助燥邪水增溼耳既有
入於腎中又益之以風安能無癩癧蹇彎不能俛仰之
苦哉然則治法仍須治溼熱少佐以祛風爲得也方用
助腎辟邪丹茯苓五錢薏仁五錢防己一錢稀薺草一
錢玄參三錢水煎服此方用防己以治腎中之風用薏
仁茯苓以去腎中之溼用玄參稀薺草以治腎中之熱
是風熱溼三者均治何病之不可去哉夫腎宜補而不
宜瀉今去風去溼去熱得非瀉腎之藥乎然而薏仁茯

苓雖利溼而不損其陰防已雖去風而不傷其氣玄參
菴蓂雖去火而不滅其光非瀉腎而仍是補腎若單瀉
而不補則誤矣

此症用散瘧

湯亦佳

防已一錢白朮一兩澤瀉菴蓂草炒
黑荆芥各二錢薏仁三錢水煎服

一感溼熱又感風邪厥逆下利舌卷囊縮背曲肩垂項似
拔腰似折手足俱冷其腹脹大人以為厥陰之傷寒也
誰知是厥陰之瘧症乎夫風溼熱三合而成瘧邪傳入
厥陰乃入肝木之經也其勢更急世人誤發其汗必致



動溼溼雖陰類然是外受之陰邪非肝中之真血也所
動之陽奔入溼中為溼所沒必至亡陽蓋脫出之陽不
啻如龍之出谷其體輕矯飛騰而不可止過今為溼所
滯留則如蛇行匍匐儘力奔越究難飛去故此等痙病
皆誤汗而成之也治法又不可拘於散邪仍須補正惟
救其亡陽而亟使其回陽耳雖然陽之所以亡者終由
於陰虛之不能攝陽故補陽必須補陰而補厥陰之陰
仍從少陰腎經以補之也方用回陰散痙湯巴戟天五
錢茯苓一兩山藥五錢防風五分炒梔子一錢白芍五



錢當歸三錢白朮一兩甘草一錢水煎服此方補肝經
之血而佐之去溼去火去風之味自是正治之法而又
補腎中之火益之巴戟天何居正補少陰之謂也葉厥
陰之本非少陰之水不生何必補腎中之火詎知汗發
亡陽陽氣盡從外泄腎中已無真火單用寒涼以祛熱
則脾胃不勝其寒矣巴戟天溫腎不至大熱腎溫而陽
回肝清而陰足陰陽和合內之正氣既固風熱溼之外
邪不必攻而自破况原有攻之者乎此有益無損之治
法又何患厥陰瘕症之無傳久哉

此症用 黃白茵

陳湯 少效

白芍花苓各一兩 猪苓三錢 茵陳一錢 白朮五錢 甘草一錢 黃連半 夏各五分 水煎服

小兒頭搖手勁眼目上視身體發顫或吐而不瀉或瀉而

不吐人以爲驚風之抽掣也誰知是風熱溼三者合之

以成瘕乎小兒純陽原不宜虛然而多食瓜果溼留於

胃溼久則變熱熱極則生風此風起於內而不來於外

也人見小兒頭搖手勁等症毋論其虛實投以抱龍丸

不效改用牛黃丸又不效乃用金石腦麝香竄之藥以

開其竅而頓其驚無不立亡嗟嗟驚風二字自創立以



來殺小兒者不啻數百萬矣並無有一醫闢其非者南
昌喻嘉言頗知其失大聲告誡無如傳世既久一時不
可轉移且嘉言有論無方世亦不識治法鐸聞師言甚
悉因暢論之而且傳其方也小兒之易於成瘥者因其
骨脆皮薄不耐風邪故邪一入腠理便入臟腑况其飲
食喜寒而不喜熱以致損傷脾胃而成吐瀉之症上吐
下瀉則陰陽兩虧平日所受之溼盡行越出溼出而熱
留臟腑之中無陰相養遂變成風象以惑人人亦卽爲
其所惑但治風而不治正所以十人十死也故見此等



之症斷不可祛風一作風治去生便遠蓋其身中實
無風無風而妄用風藥以倍耗其損傷之氣安得不速
其死哉治法惟補其脾胃而止其吐瀉則十人十生也
方用救兒回生湯人參二錢白朮三錢茯苓一錢砂仁
三粒炒黑乾姜五分山查五粒蘿蔔子五分車前子一
錢厚朴三分神麩三分半夏五分水煎服此方以十歲
為準五歲者減半一劑即吐瀉止二劑即抽掣定三劑
即全愈此方補中有利調和於脾胃之內則陰陽有既
濟之歡自然無變動之害矣或曰補之是矣少加去風