

孫氏醫學叢書

傷寒雜病論章句

冊五

S294

1158

1部5



傷寒雜病論章句類方卷十二

湘潭孫鼎宜撰

【柴胡輩】

小柴胡湯

柴胡半斤

唐云柴胡當用四川產者一莖直上中通有白氣瓢故能通三焦之膜膈色青氣香春日生成恰得少陽之氣非別省

紅軟銀白等柴胡也

黃芩

人蔘

甘草炙

生薑切各叁兩

一作生薑伍兩

半夏半升洗

外臺一斤洗一引又云湯洗作半

大棗拾貳枚擘

右七味㕮咀以水一斗二升煮取六升去滓再煮

徐云此又一法顧云凡和解藥皆去



一滓再煮者欲使藥性合取三升溫服一升日三服徐云此湯除大

較今亦伍兩陸錢零雖分三分已為重齊蓋少陽介於兩陽之間

性合能經氣相融不復往來出入○若方中煩而不歐者去半

夏人獲徐千金本此別立法俱有精義○若方中煩而不歐者去半

實除徐云此小○若渴者去半夏徐云即能耗津液痰加人獲徐云生

合前成肆兩半是加壹栝樓根肆兩徐云治消渴○若腹中痛者

去黃芩徐云苦寒加芍藥叁兩徐云除○若脅下否堅者去大棗徐云以

胃加牡蠣肆兩翼方治脅下否熱○若心下悸外臺小便不利

者去黃芩加茯苓肆兩徐云利○若不渴外有微熱者去人獲徐云不渴

則津液加桂枝叁兩翼方作貳兩徐云溫覆取微似汗外臺無○若

效者去人獲大棗徐云二味生薑徐云加乾薑加五味子半升乾薑

貳兩治嗽五引甄權下有忌羊肉散寒邪一以斂正氣從無單用五

肺之證又法後人不知獨用五味有收斂風火痰涎深入肺藏永難救療

矣又云論中凡柴胡通與桂枝方二方有加減法此方加減法須細審

少陽病小柴胡湯證三章外已解也設匈滿脅痛者與此湯

身熱惡風頸項強不能食往來手足溫而渴者與此湯

少陽病下陽堅滿明病大發潮熱而大舌便溏白胎者可與此湯上焦得通津液得下

服小胃氣柴胡因湯和身渴然汗出解也治之

匈反脅利滿者知醫以圓所藥下熱非已而微利此本柴胡證先宜服此以利解今

三陽外合病有柴胡證但見一證便是不必悉具也

脈弦浮大短氣腹滿脅下及心痛久按之氣不通或不痛鼻乾小

陽脈差外陰解病過十日脈續浮者與此湯中湯不差者此主之

但欲飲柴胡證中痛微瀉者先與此本柴胡證小安故知也

脈遲浮弱惡風寒手足溫醫再下重不能食脅下滿痛面目及身

歐與也食穀者噦湯證具而以此他藥下之柴胡證仍在者復與柴胡

少陰湯此雖已下之而發熱者主之

傷寒雜病論章句

卷十一

柴胡輩

二中華書局聚



頭汗必出微惡寒手足冷心下滿口不欲食大便秘堅脈細者此為陽微

雖純陰結不得復有外證悉入在于裏矣此為汗今在表汗出故知非

差少陰發熱者主之湯設不了了者得矢而解

諸黃腹滿而主之宜服在黃瘰

婦人中風七八日續得寒熱發作有時經適斷者此為熱入血室其

產後大便堅露得風四肢苦煩之熱頭痛者與此湯

柴〔胡〕桂〔枝〕乾薑湯

一引仲景稱小柴胡湯按此即小柴胡去人
後生薑半夏大棗加桂枝乾薑牡蠣桂樓也

柴胡半斤

黃芩

桂枝各參兩

所謂人病加煩外有微熱

枳樓根肆兩

此所謂去人病加煩心煩故也

乾薑

易生薑而歐故半夏也



牡蠣熬所謂脅下否堅去大棗加牡蠣

甘草炙各貳兩

右七味煮服法同○初服微煩復服仲景則一引仲景作溫覆二卷引

葱海藻菰
七字

大少合病已發汗而復下之匈脅滿微結小便不利渴而不飲但頭
汗出往來寒熱心下煩者主之
身熱惡風頭項強脅下滿手足溫而渴者主之
瘧寒多微有熱或但寒不熱此主之

〔柴胡桂枝湯〕在合方輦

柴胡去半夏加栝樓根湯

栝樓根肆兩

加入小柴胡湯中 去半夏同治病發渴而此

右七味煮服法同外臺五引仲景下有

瘧發渴者主之亦治勞瘧

柴胡加龍〔骨牡〕蠣湯即小柴胡去甘

傷寒雜病論章句

卷十二

柴胡輩

三中華書局聚

柴胡肆兩

減肆兩

黃芩

一本無黃芩共十一味

人蔘

生薑

以上各減壹兩半

龍骨

牡蠣煨

趙校云成本作熬

桂枝去皮

茯苓

鉛丹各壹兩半

半夏貳合

減陸合○翼方作壹合半

大棗陸枚

減陸枚

大黃貳兩切如棊子大

右十二味㕮咀以水八升煮取四升

是不去滓

內大黃更煮一二沸

徐云大黃



珍傲宋版印
中國醫藥大學圖書館版

只煮一二沸取其生而流利也顧云不欲盡出大黃之味按外臺一

引作取二分去滓溫服一升外臺下有忌羊肉字

也三陽合病下之旬滿煩驚小便不利譫語一身盡重不可轉側者主

大柴胡湯即小柴胡去人蔘甘草加枳實芍藥大黃于

柴胡半斤

半夏半升一作半斤

黃芩

芍藥各叁兩肆兩崔氏用

枳實肆枚炙崔氏用

生薑伍兩

大黃貳兩兩大黃據金匱腹滿內補傷寒大陽中云此方本有大黃貳

和語柯云條中不言便大柴胡且有下利證仲景不用大黃之意曉然况

柴胡證有云熱結在裏有云心下否堅有云大棗之甘膩邪若云心下滿痛一味枳

傷寒雜病論章句卷十一柴胡輩四中華書局聚



禁用以惡叔和之故通用有斥亦無以服叔和之心也

大棗拾貳枚

右八味咬咀以水一斗二升煮取六升去滓再煮取三升温服一升

日三服

羊外臺一引仲景下有忌

少陽陽明病發熱汗出不解心下煩否堅歐吐而下利者主之

三陽合病再下之歐者不止心下急鬱鬱微煩者與此下之則愈

差後脈沈者內實也宜服

柴胡加芒硝湯

徐承云即小柴胡加芒硝分兩各不同迺合用小承

氣也皆少陽陽明合治之方按此湯

柴胡貳兩拾陸銖

減伍兩

黃芩

人蔘

甘草炙

生薑各壹兩

各減貳兩

半夏貳拾銖

外臺一作伍枚

大棗肆枚

減捌枚

芒硝貳兩

右八味呖咀以水四升

以分兩輕減八升

煮七味取二升去滓內芒硝更上

火煮一二沸

一作更沸

分溫再服

○不解

徐云大便不解

更作

謂再服之後也徐云此藥

齊之最輕者以今秤計之約貳兩分二服則一服止壹兩耳○外臺一引仲景下有忌海藻菰菜羊肉錫等九字

又方

芒硝陸兩

宋本作貳兩

加入小柴胡湯中

右八味煮服法同

傷寒趙校云三及十卷用此法

不解更服

林校云金匱玉函方中無芒硝

別一方云以水七升下芒硝貳合大黃肆兩桑螵蛸伍枚煮取二升半服五合微下即愈

經一方芒硝叁合餘同

傷寒雜病論章句

卷十二

柴胡輩

五中華書局聚

珍做宋版印

少陽陽明病旬脅滿而歎日晡所發潮熱已而微利此本柴胡證下
之不得利今反利者知醫以圓藥下之非其治也潮熱者實也先
芒再服小柴胡湯亦以解外後以柴胡加芒硝湯主之柴胡加大黃
芒硝桑螵蛸湯

柴胡加〔芒〕硝〔大〕黃桑螵蛸湯
林本有本刪

大黃肆兩酒洗

芒硝叁合

桑螵蛸伍枚

加入小柴胡湯中

右十味餘依前法
謂煮服同小柴胡也微下即愈

又方

以水七升煮芒硝大黃桑螵蛸三味取二升半去滓溫服五合微下

即愈
本云猶言別小柴胡湯再服以解外餘一服加大黃芒硝桑

螵蛸
疑是以小柴胡後服一升加入此三味煎成取五合也此又一

定法大陽麻桂諸方未有加硝黃者而小柴胡有之何也曰少陽近
於陽明且過經不解寒漸化熱故可用兩解之法也讀仲景書死於



南京中医药大学图书馆藏

句下者過溫熱病亦用先表後裏之法則緩不及事矣按仲景自有桂枝加大黃湯顧未察也
少陽陽明病中藥證一章見上方下

四時加減柴胡飲子

柴胡

尤各捌分

大腹檳榔肆枚併皮子用

橘皮

生薑各伍分

桔梗柒分

右六味咬咀分爲三貼

貼猶齊也

一貼以水三升煮取二升去滓分溫三

服

此法一

如人行四五里進一服△如四體壅

壅腫

添甘草少許

謂不

可用甘草也

○或每貼分作三小貼每小貼以水一升煮取七合溫服

七

二升再合滓

合三小貼

爲一服重煮

不著水數

都成四服

此又一

傷寒雜病論章句

卷十二

柴胡輩

六中華書局聚



中醫藥大學圖書館藏

冬三月柴胡稍多不著

春三月去朮加枳實不著

夏三月加甘草枳實仍用朮

秋三月橘皮稍多共六

寒熱五臧寒熱此主之

【治中輩】

治中湯 一名人蓂湯

人蓂

乾薑

甘草炙翼方注以上三

朮各叁兩

右四味呶咀以水八升煮取三升去滓溫服一升日三服徐云急則

臺三十一引仲景○若齊上築者腎氣動也去朮加桂肆兩也加桂枝

注一作參兩徐云即欲○吐多者去朮加生薑叁兩注一作貳兩翼方

云有乾薑復加生薑○下多者還用朮翼方注還一作倍○悸者加



南京中医药大学图书馆藏

茯苓貳兩

徐云悸爲心下○渴欲飲水者翼方作先時渴喜得水者加

尤壹兩半

外臺作合成肆兩○腹中痛者加人葠合成肆兩半

亦加壹兩半徐云此痛因心氣不○惡寒者惡字據加乾薑至肆兩

半陽虛惡寒與外感別○腹滿者去朮加附子壹枚炮去皮破陸

片徐云此充之故○服湯後此總論不拘何法如食頃飲熱粥一升

許微自溫助藥力桂枝湯飲熱粥欲其助藥力以外散此飲熱粥欲其

勿揭衣被此微自溫之法外臺作勿發揭衣被發撥假

霍亂吐利發熱身疼痛寒多不用水者主之

霍亂吐利霍亂吐利發熱身疼痛寒多不用水者主之

霍亂吐利霍亂吐利發熱身疼痛寒多不用水者主之

霍亂吐利霍亂吐利發熱身疼痛寒多不用水者主之

霍亂吐利霍亂吐利發熱身疼痛寒多不用水者主之

霍亂吐利霍亂吐利發熱身疼痛寒多不用水者主之

傷寒雜病論章句

卷十一

治中輩

七

中華書局聚

中醫藥大學圖書館藏

治中圓

以四物依兩數擣篩為末蜜和圓如雞子黃大以沸湯數合和一圓

研碎溫服日三夜二服○腹中未熱

據此知腹中寒冷者用圓為宜益至三四圓

為然不及湯

徐云治中圓及湯本屬一方○外臺三十一引仲景治中圓作右四味擣篩蜜和如梧子空腹以飲汁服十五

圓忌桃李雀肉海藻菰菜

差後喜唾久不了了者胃上有寒飲也當以圓溫之宜此圓

治中去朮加桂〔枝〕湯

桂枝肆兩

加入治中湯中 去朮

右四味煮服法同

霍亂不渴者即齊上築齊上築者腎氣動也當先治氣此主之已

桂枝人蔘湯

此治合病與合方通但意重在治中故次於此

桂枝去皮肆兩

翼方作兩



加入人蓂湯中

右五味以水九升先煮四味

人蓂乾薑甘草尤

取五升去滓

一無去滓二字

內桂更

煮取三升

徐云桂獨後煮欲其於去裏證藥中越出於表以散其邪也

去滓溫服一升日再夜一

服

大陰兼陽經病外證未除而數下之遂協熱而利利下不止心下否
堅表裏不解者主之

〔厚〕樸〔生〕薑〔草半〕夏人蓂湯

徐屬寫心

厚樸炙去皮

生薑切各半斤

甘草炙貳兩

半夏洗半升

人蓂壹兩

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

二陽併病發汗後腹張滿者主之



枳〔實〕朮湯

枳實柒枚炙

朮貳兩

外臺八
作叁兩

右二味咬咀以水五升

外臺七作一斗

亦作一斗

煮取三升去滓分温三服○

腹中輒

一作冥論中
多以濡字代

即當散也

外臺七作即散下有忌桃李肉等
物七字八卷引備急下有桃李雀出姚

大夫方蓋姚集驗收此方
也熏注此本仲景方可證

氣分心下堅大如盤邊如旋盤水飲所作此主之

枳〔實〕芍〔藥〕散

枳實燒令黑勿大過

芍藥各等分

右二味杵爲散服方寸匕日三服○并主癰腫△大麥湯下之

此總
腹痛

言也湯一作
粥一無大字

癰腫主之
產後腹痛煩滿不得臥此主之

珍傲宋版印



南京中医药大学图书馆藏