

新刊醫林狀元壽世保元丙集三卷

太醫院吏目金谿雲林龔延賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

痰飲

脉雙弦者寒飲也○其脉偏弦者飲也○肺飲不弦但喘短氣○交云脉浮而細滑傷飲○脉弦數有寒飲春夏難治○脉沉而弦者懸飲內痰○其人短氣四肢慳節走痛脉沉者有留飲○左右手關前脉浮弦大而實膈上有稠痰也宜吐之○病人百藥不効關上脉伏而大者痰也眼胞及眼下如炭烟薰黑者亦痰也○久得瀆脉痰飲膠固脉道阻滯也卒難得開必費調理痰者病名也生於脾胃然脾胃氣盛飲食易化何痰之有或食後因之氣惱勞碌驚恐風邪致飲食之精華不能傳化而成痰飲矣有流乎經絡皮膚者有鬱于臟腑支節者游溢遍身無所不至痰氣既盛客必勝主或奪於脾之大絡也氣則倏然仆地此痰厥也升於肺者則喘急咳嗽迷於心者則怔忡恍

惚走於肝則眩暈不仁脇肋脹滿關於腎則冷而多痰涎流於中脘則則嘔瀉而作寒熱注於胸則咽膈不利眉稜骨痛人於腸漉漉有聲散於胸背則揪觸一點疼痛或寒於手足或背痺一邊散則有聲聚則不利一身上下變化百病治當各從所因是以虛宜補之火宜降之氣宜順之鬱宜開之食宜導之風寒濕熱宜發散清燥以除之故曰治病必求其本

○一論有 濕痰 熱痰 風痰 老痰 寒痰 食積痰 宜後方加減

二陳湯

陳氏 主白 一錢 半夏 湯淘 二錢 白茯苓 去皮 一錢 甘草 五分

右剉一劑生薑三片水煎溫服

一濕痰盛者身軟而重加蒼朮白朮

一熱痰加黃連黃芩痰因火盛逆上降火為先加白朮黃芩軟石膏黃連

一眩暈嘈雜者火動其痰也亦加山梔黃連黃芩

一風痰加天麻枳殼南星白附子僵蚕牙皂之類氣虛者加竹瀝氣實者加荆

瀝俱用薑汁

一者痰用海石半夏薑香附連翹之類五倍子佐此藥大治頑痰宜丸藥喉中有物咯不出嚥不下此痰結也用藥化之加鹹藥軟堅之類宜瓜蒌杏仁海石桔梗連翹香附少佐朴硝薑汁煉蜜和丸噙服之脈滿者卒難得開必費調理氣實痰熱結者吐難得出或成塊吐咯不出氣滯者難治

一寒痰痞塞胸中倍加半夏甚者加麻黃細辛烏頭之類痰厥頭痛亦加半夏一食積痰加神曲麥芽山查炒黃連枳實以消之甚者必用攻之宜丸藥兼血虛者用補血藥送下中焦有痰者食積也胃氣亦賴所養卒不便虛若攻之盡則虛矣○噫氣吞酸此係食積而鬱有熱火氣動上加黃芩南星

一血虛有痰加天門冬知母瓜蒌仁香附米竹瀝薑汁帶血者更加黃芩白芍桑白皮血滯不行中焦有飲者取竹瀝加生薑汁韭汁飲三五盞必胸中煩燥不寧後愈

一氣虛有痰加人參白朮脾虛者宜補中氣以運痰降下白朮加白芍神曲麥芽兼用升麻提起內傷夾痰加人參黃芪白朮之類薑汁傳送或加竹瀝尤

妙

一痰在膈上必用吐法瀉之不去膠固稠濁者必用吐脉浮者宜吐痰在經絡間非吐不可吐中就有發散之義凡用吐藥宜升提其氣便吐加防風川芎桔梗茶芽生薑蘘汁之類或瓜蒂散凡吐用布繫勒肚於不通風處行之

一痰在腸胃間可下而愈枳實甘遂巴豆大黃芒硝之類凡痰用利藥過多脾氣易虛則痰易生而多

一痰在脇下非白芥子不能達

一痰在皮裏膜外非薑汁竹瀝不可及在四肢非竹瀝不開在經絡中亦用竹瀝必佐以生薑韭汁膈間有痰或癲狂或健忘或風痰俱在竹瀝與荆瀝同功氣虛少食用竹瀝氣實能食用荆瀝

一凡人身上中下有塊是痰也問其平日好食何物吐下後方用藥

一凡人頭面頸賴身中有結核不痛不紅不作膿者皆痰注也宜隨處用藥消

一凡痰之爲物無處不到爲隨氣升降故也

○一論竹瀝大治熱痰及能養血清熱有痰厥不省人事幾死者得竹瀝灌之

遂甦誠起死回生藥也

用水竹旱筆竹截長二尺許小者每段劈作二片大者劈作四片入井水浸一時許以薄磚二塊排定將竹片架於磚上兩頭露一二寸下以烈火迫之兩頭以盆盛灑每六分中加薑汁一分服之痰熱甚者止可加半分耳用以竹灑加入湯藥內服之尤妙取荆灑亦治熱痰亦照此法取之

○一論痰屬濕乃津液所化因風寒濕熱之感或七情飲食所傷以致氣逆液濁變為痰飲故曰痰因火動降火為先火因氣逆順氣為要

加減二陳湯

橘紅

去白一錢

半夏

製一錢半

白茯苓

去皮一錢

貝母

半錢

枳實

炒一錢

白朮

去共一錢二分

連翹

五分

黃芩

酒炒一錢

防風

去芦五分

天花粉

七分

香附

便炒一錢

甘草

三分

右劉生薑三片水煎溫服

○一論熱痰在胸膈間不化吐咯不出寒熱氣急滿悶作痛者名曰痰結

開結化痰湯

陳皮

半夏製

茯苓

桔梗

枳殼

貝母

瓜蒌仁

黃連

黃芩

梔子

蘇子

桑皮

朴硝

杏仁

甘草

右剉水煎入薑汁磨木香服

○一論遍身四肢骨節走注疼痛牽引胸背亦作寒熱喘咳煩悶或作腫塊痛難轉側或四肢麻痺不仁或背心一點如冰冷脉來沉滑乃是濕痰流注經絡關節不利故也

清濕化痰湯

南星泡

半夏製

陳皮

去白

茯苓

去皮

蒼朮

米泔炒

羌活

酒芩

白芷

白芥子

甘草

右剉水煎入竹瀝薑汁磨木香溫服○骨體痛甚及有腫塊作痛者名曰痰塊加乳香沒藥海石朴硝○頭頂痛加川芎威靈仙○手臂膊痛加薄桂引南星至痛處

○一論所傷七情痰迷心竅神不守舍神出舍空空則痰生以致增寒壯熱頭

痛昏沉迷悶上氣喘急口出涎沫證類傷寒兼治中風痰厥氣厥不省人事
清熱導痰湯

人參 白朮去芦 茯苓去皮 陳皮去白 半夏薑製 南星薑製 枳實麩炒

桔梗 黃連 黃芩 瓜蒌仁 甘草

右劉生薑煎入竹瀝薑汁同服

家傳清氣化痰丸 製造甚得法化痰清火開膈順氣消痞除脹醒酒消食殊効

大南星四兩 大半夏四兩 二味先用米泔水各浸三五日以透為度

洗淨切片以礬一個盛貯晒乾先薑汁次皂汁又次礬汁又取硝水晒乾

一用生薑汁浸一日夕晒乾

一用皂角煎水去渣浸一日夕晒乾

一用白礬一兩煎水浸一日夕晒乾

一用朴硝一兩煮水浸一日夕多晒乾

青皮去穢 陳皮去白 枳殼去穢 枳實麩炒 白朮去芦 白茯苓去皮 蘇子炒

白芥子炒 蘿蔔子炒 香附鹽水炒 瓜蒌仁 乾葛 桔梗去芦 杏仁去皮

黃芩酒炒

神曲炒

麥芽炒

山楂蒸去

白豆蔻去殼

前胡去苦

甘草各一兩

右為細末用前浸四味藥水加竹瀝一碗泡蒸餅為丸如梧子大每服五七

十丸或茶或姜湯任下

一論健脾胃清火化痰頑痰能軟結痰能開疎風養血清上焦之火除胸膈之痰清頭目止眩暈

千金化痰丸

胆星四兩

半夏姜礬牙卑同煮半日用四兩

陳皮去白三兩

白茯苓去皮二兩

枳實一兩

海石二兩

天花粉二兩

片苓酒炒二兩

黃柏酒炒二兩

知母酒炒一兩

當歸酒炒四兩

天麻火燻三兩

防風去片二兩

白附子煨二兩

甘草生三兩

大黃酒蒸九兩

白朮米泔浸二兩

氣虛加人參八錢

右為細末神曲二兩打糊為丸如梧子大每服七八十丸茶水下

○一秤金一名金珠化痰丸治痰嗽如神又治痰嗽

用半夏十斤米泔水浸十日換水三次取出切作兩半曬乾用白礬五斤

水一桶入鐵鍋內化開將半夏入礬水內浸二十日取出切作四瓣曬乾

用生薑十斤另研取汁再入半夏浸二十日取出曬乾為細末聽用粉草十斤去皮為粗入鍋內添水煮數沸取出以布濾去渣將淨水仍入鍋內熬成膏子和成劑每病重者用藥二錢半輕者二錢金箔十張和一大丸與病人噙化忌房事此藥神効不可輕忽

○一治痰壅方

梨汁一鐘

生薑汁半鐘

蜜半鐘

南薄荷末三兩

右和勻重湯煮十餘沸任意食降痰驗如奔馬

○一論痰飲為病或狂或眩暈等症無不奏効

白丸子 中州傳明岐傳

川南星 四兩

半夏 十兩

白附子 五兩

小川烏 三兩

右俱切片春七夏三秋八冬十日水浸一日一換日晒夜露其星半夏放磁器內少加薑汁同浸去麻性次將前藥磨又將絹巾濾去渣澄白粉曬乾白米糊為丸如梧子大每服五六十丸薑湯滾水任下其藥放舌上不麻為度方妙

釣痰仙方 魯府秘方

礪砂 一錢

白礬 半生半

磁青 上細磁器打下

青研細一錢

瓜蒂 五

青蒙石

煨紅萍姜汁內一錢

右共研細末每用二釐薄荷濃湯調入鼻內即愈

○一人氣短有痰小便赤澁足眼作痛尺脉浮大按之則濇此腎氣丸補飲也用四物送六味丸不月而康仲景先生云氣虛有飲用腎氣丸補而逐之誠開後學之蒙賸濟無窮之天枉腎氣丸即六味丸也

○一儒者體肥善飲仲秋痰喘用二陳苓連益甚加桑皮杏仁盜汗氣促加知母枳殼不時發熱余以為脾肺虛寒用八味丸以補土母補中益氣以安中氣而愈

○一婦人因怒吐痰胸滿作痛服四物二陳苓連枳殼之類不應更加祛風之劑半食不遂筋漸攣縮四肢痿軟日晡益甚內熱口乾形體倦怠余以為鬱怒傷脾肝氣血復損而然遂用逍遙散補中益氣湯六味地黃丸調治喜其謹疾年餘悉愈形體康健

補中益氣湯 見內傷

六味丸

八味丸 俱見益補

咳嗽

脉咳嗽所因浮風緊寒數熱細濕房勞瀆澁亡閉濡者飲食傷脾左關弦短疲
極肝衰浮短肺傷法當咳嗽五臟之嗽各視本部浮緊虛寒沉數實熱洪滑
多痰弦澹少血形盛脉細不足以息沉小伏匿皆是死脉惟有浮大而嗽者
夫痰謂有聲肺氣傷而不清嗽謂有痰脾濕動而生痰咳嗽者因傷肺氣而動
脾濕也病本須分六氣五臟之殊而其要皆主於肺蓋肺主氣而聲出也戴
云因風寒者鼻塞聲重惡寒者是也因火者有聲痰小而赤者是也因勞者
盜汗出兼痰者多作惡熱肺脹者動則喘滿氣急息重痰者嗽動便有痰聲
痰出嗽止五者大概耳亦當明其是否也治法須分新久虛實新病風寒則
散之火熱則清之痰涎則化之濕熱則瀉之久病便屬虛屬鬱氣虛則補氣
血虛則補血兼鬱則開鬱滋之潤之斂之降之則治虛之法也
一論四時感冒發熱頭痛咳嗽聲重涕唾稠粘中脘痞滿嘔吐痰水寬中快
膈不致傷脾此藥大解肌熱將欲成勞痰嗽喘熱並効用

參蘇飲

紫蘇

前胡

桔梗

枳殼去穢

乾葛

陳皮

半夏湯泡

白茯苓

去皮各一錢

甘草三分

人參五分

木香

三分初病熱嗽去之

右剉一劑薑枣煎服

○若天寒感冒惡寒無汗咳嗽喘急或傷風無汗鼻塞

聲重加麻黃一錢

杏仁一錢

金沸草一錢

以汗散之○若初感冒肺多有熱

加杏仁桑皮黃芩烏梅

○胸滿痰多加瓜蒌仁○氣促喘嗽加知母貝母肺

寒咳嗽加五味乾薑○心下痞悶煩熱譫譫惡心或停酒不散加薑炒黃連

枳實乾葛陳皮倍用之○鼻衄加烏梅麥門冬白茅根○心盛發熱加柴胡

黃芩○頭痛加川芎細辛○咳嗽吐血加升麻牡丹皮生地黄○入熱咳嗽

久不愈加知母貝母麥冬門○見血加阿膠生地黃烏梅赤芍牡丹皮○吐

血痰嗽加四物湯名茯苓補心湯○妊娠傷寒去半夏加香附子

○一論上氣喘逆咽喉不利痰滯咳嗽口舌乾渴

三母清順湯

天門冬

主心

麥門冬

去心

知母

蜜湯浸二錢

貝母

甘草湯洗二錢

人參

五分

當歸身

一錢

桔芩

一錢

山梔子

炒一錢

玄參

一錢

桔梗

一錢

天花粉

一錢

薄荷

七分

生甘草

三分

右劉水煎服

清熱寧嗽化痰定喘丸

橘紅

五錢

青礬

三錢

貝母

七錢

胆星

一兩

天花粉

七錢

桑白皮

七錢

杏仁

七錢

桔梗

七錢

黃芩

五錢

前胡

七錢

甘草

三錢

右為細末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸淡薑湯化下

○一論痰嗽服前方不効者多屬氣血虛弱四肢沉困宜入物湯加黃柏知母

貝母門冬五味苈葶蘇陳皮等分薑棗煎服

○一論咳嗽早間吐痰甚多夜間喘急不寐然早間多痰乃脾虛飲食所化夜

間喘急乃肺虛陰火上衝以後方服之

補中益氣湯

方見內傷

依本方加麥門冬五味子

六味地黃丸

方見補益

依

本方加麥門冬五味子

○一論傷風寒鼻流清涕寒禁噴嚏此脾肺氣虛不能實腠理以補中益氣湯
主之

○一論咳嗽面白鼻流清涕此脾肺虛而兼外邪

補中益氣湯加茯苓半夏五味而愈

○一論咳嗽吐痰失音聲啞此元氣虛弱而致也

補中益氣湯加黃柏知母天門冬麥門冬五味杏仁黃芩灰萸仁

○一論咳嗽吐痰手足時冷此脾肺虛寒以補中益氣湯加炮乾薑半夏

○一論聲音不出用新槐花不拘多少瓦上慢火炒焦置懷中補中時時將一

二粒口中咀嚼嚥之使喉中常有味久聲自出

○一治語言不出用

真蘇子二錢 訶子三箇

杏仁二十 百藥煎二兩

右爲末每服二錢熱酒調服

○一治久嗽語音不出

訶子去核一兩

杏仁泡去皮通草二錢

右劉每服四錢煨薑五片水煎食後溫服

○一論年老人日久咳嗽不能臥者多年不愈用

猪板油

四兩

蜂窠

四兩

米糖

四兩

右三味熬化成膏時時刻刻挑一匙口中噙化三五日其嗽即止

○一論久年咳嗽吐痰

銀杏膏

陳細茶

四兩 另焙 爲細末

白果肉

四兩 一半去白膜 一半去紅膜 精爛 核桃肉 四兩

家蜜

一斤

右藥入內煉成膏不拘時服

○一治久嗽不瘥并虛勞喘嗽

紫苑

去片

款冬花

各二兩

百部

五錢

右爲末每服三錢生姜三片烏梅一箇同煎湯調下食後臨卧各一

○一論久嗽并連嗽四五十聲者用連皮生姜自然汁一勾加白蜜二茶匙同

放茶碗內煎一滾溫服三四次即止

○一切咳嗽上氣者一道土專賣此藥不拘新久皆効

乾姜

桂心紫色辛辣者去皮

皂莢泡去皮子肥人無孔者

右三味並另搗下篩了各秤分兩和合後更搗篩一遍煉白蜜搜和又搗一二千杵每服三丸如梧桐子大不限食之先後嗽發即服日進三五服忌葱蒜油膩麵食

○一論年久近日咳嗽吼喘急等症

神吸散 國子博士顏心吾傳

鵝管石

火煨好醋淬七急一錢

餘糧石火煨醋淬七次一錢

粉草

三分

枯白礬分五

欬冬花分五

石膏煨分五

右爲細末每服三分二厘準秤至夜食後靜坐片時將藥放紙上以竹筒五

寸長直插喉內用力吸藥速亦不怕吸藥令盡爲度以細茶一口嗽而嚥之

忌雞魚羊鵝一切動風發物并生冷諸物惟食白煮猪肉雞子戒三七日日

宜用公猪肺一副加肉半斤梔子一歲一箇炒成炭桑白皮不拘多少用

同炒至熟爛去藥至五更病人不要開口言語令人將湯肺喂之病人嚼吃

任用餘者過時再食効

○一論久嗽痰喘百藥不効并年久不痊者或能飲酒人久嗽尤効

清金膏 曲草合孔桂窗傳

天門冬

去心八兩

麥門冬

去心四兩

貝母

四兩

杏仁

去皮四兩

半夏

姜製四兩

右五味切片水熬去渣取汁五碗入白粉葛末四兩蜜一斤共前汁入罈內重湯煮一日成膏取出每日無時頻頻服之

○一人時唾痰涎內熱作渴肢體倦怠勞而足熱用清氣化痰益甚余曰此腎水泛而為痰法當補腎不信另進滋痰丸一服吐瀉不止飲食不入頭暈眼閉始信余用六君子湯數劑胃氣漸復却用六味丸月餘諸症悉愈

○一人咳嗽氣喘鼻塞流涕余用參蘇飲一劑以散寒邪更用補中益氣以實腠理而愈後因勞怒仍作自用前飲益甚加黃連枳實腹脹不食小便短少二陳四苓前症愈劇小便不通余曰腹脹不食脾胃虛也小便短少肺腎虛也悉因攻伐所致投以六君子加黃芪炮姜五味二劑諸症頓退再用補中益氣加炮姜五味數劑全愈