

保嬰撮要卷之三

薛氏醫按

吳郡薛鑑集

薛已驗

江都

吳中珩校

急驚

錢仲陽云急驚者因聞大聲或驚而發搐搐止如故此熱生於心身熱面赤引飲口中氣熱二便黃赤甚則發搐蓋熱盛生風陽盛而陰虛也宜以利驚丸除其痰熱不可用巴豆之藥蓋急驚者陽症也俱府受病而屬實乃少陽相火旺經曰熱則生風風生痰痰熱客於心膈間則風火相搏故抽搐發動經所謂木

太過曰發生其動掉眩顛疾是也當用利驚丸導赤
散瀉青丸等藥搐止與安神鎮驚丸婁全善亦曰急
驚屬木火土實木實則搐而有力及目上視動劄頻
睫土實則身熱面赤而不吐瀉偃卧合睛治法宜涼
宜瀉而用涼驚利驚等丸亦有因驚而發者牙關緊
急壯熱涎潮竄視反張搐搦顛動唇口眉眼眨引口
中熱氣頰赤唇紅二便秘結脉浮洪數緊此內有實
熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚作仍微下之痰
熱既泄急宜調養胃氣搐定而痰熱少退卽宜調補
脾氣東垣云若因外物驚者宜黃連安神丸因氣動

所驚者宜安神鎮驚丸之類大忌防風丸如因驚而
瀉青色宜朱砂丸大忌涼驚丸蓋急驚者風木旺也
風木屬肝盛則必傳射於脾欲治其肝當先實脾後
瀉風木若用益黃散則誤矣經曰邪氣盛則實正氣
奪則虛前所云實者乃病氣有餘而形氣不足也當
先瀉而後補虛甚急當補脾爲先少以攻邪之藥佐
之其所云虛者乃病氣形氣俱不足也當純補真氣
爲要若肝經風火相搏抽搐目瞶筋急痰盛者常用
四物湯以生肝血加釣藤鈎山梔以清肝火更用四
君子以補脾六味丸以滋腎若肺金尅木而兼呵欠

者用瀉白散以泄肺邪地黄丸以益肝血若邪入肝則用柴胡清肝散加龍膽草亦可邪入心用梔子清肝散加炒黃連亦通邪入腎用六味地黃丸邪入肺用地骨皮散邪入脾用六君子加柴胡山梔大抵此症屬肝膽經血虛風火相搏而善行數變者爲多若不養肝血不補脾氣純用祛風化痰之藥則脾益虛血益損邪氣延綿必傳慢驚矣

治驗

一 小兒九歲因驚發熱抽搐頓悶咬牙作渴飲冷便秘面色青赤而印堂左腮尤赤此心脾二經風

熱相搏乃形疾俱實之症也先用瀉青丸料炒苗
連一劑大使隨利熱搐頓減繼用抑青丸一服諸
症悉退但面色痿黃肢體倦怠飲食少思此病氣
去而脾氣未復也用補中益氣湯及地黃丸而全

安

一小兒發熱抽搐口噤痰湧此膽經實火爲驚風
也先用瀉青丸一服六味丸二服諸症卽退又用
小柴胡湯加芍歸山梔釣藤鈎次以補中益氣湯
而愈

一小兒忽然發熱口動咬牙驚搐痰盛或與祛風

化痰藥益甚而色青黃乃肝木剋脾脾之液爲涎
虛則涎不能攝上湧而似痰也法當生肝補脾則
風自息痰自愈矣遂用六味丸及六君子湯而愈
一女子十二歲善怒輒中抽搐遍身作痒飲食少
思此肝經風熱脾土受剋也用參耒柴苓湯以清
肝健脾而愈

一小兒三歲患急驚面赤發熱作渴飲冷用瀉青
丸一服熱衰大半因見得効翌早又自製一服反
加吐瀉發搐面色青白手足指冷此熱旣去而妄
自傷脾也用六君子薑桂升麻柴胡一劑得安是

以前哲謂小兒易爲虛實攻伐之藥衰其大半乃止不可過之羅謙甫約方約囊之論恪矣

一小兒三歲因驚抽搐發熱痰盛久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心肝二經血虛風熱生痰也用六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安

一小兒潮熱發熱左腮青赤此心肝二經血虛之症也用秘旨安神丸及四物湯加防風酸棗仁治之而愈

一小兒潮熱發熱痰涎上湧手足指冷申酉時左

腮青色隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋
養肝腎而痊

嘉興王一山女七歲因跌傷腿膝兩腠腫潰面色
青潔左關無脉余謂驚則氣散而風熱鬱滯於肝
故其脉隱伏用四君升麻柴胡釣藤鈎一劑脉至
隨愈

藥小兒叩堂青黑至夜啼搐余謂脾土虛寒也用
釣藤飲而安後因驚發搐夜啼仍用前藥一劑諸
症復愈又用異功散而痊

一小兒七歲患急驚將愈而發熱驚悸悞服祛風

化痰之劑更加驚搐吐痰喘嗽腹脹少食惡寒再用抱龍丸大便似痢寒熱往來殊類風症先君治之以爲脾氣虧損諸經無所滋養而然用四君子湯爲主少加升麻柴胡以升補陽氣而愈

一小兒驚風後痰嗽不止睡臥不寧諸藥無効余用牛黃清心丸少許頓止後復傷風邪痰盛喘急飲食不下仍用牛黃丸少許而安再用異功散加桔梗而愈

利驚丸 治急驚痰盛發熱潮搐痰厥血麻平肝利

青黛

輕粉

牽牛末

右爲末麪糊丸寒豆大每服十九薄荷湯化下

安神鎮驚丸驚退後調理安心神養氣血和平預防之劑也

天竺黃

另研

人參

扶神

南星

舊製各五錢

酸棗仁

炒

麥門

當歸

酒洗

生地黄

酒洗

赤芍藥

炒各三錢

薄荷

木通

黃連

薑汁炒

山梔

炒

辰砂

另研

牛黃

另研

龍骨

煅各一錢

青黛

一錢另研

右爲末蜜丸某豆大每服三五丸量兒大小加減

淡薑湯送下

四物湯 治血虛發熱煩躁或晡熱作渴頭目不清

若因脾虛不能生血者用四君子湯

當歸

熟地黃

芍藥

川芎

錢各二

右水煎服

參朮柴苓湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

錢各一

柴胡

升麻

錢各七

山梔

錢八

釣藤

錢一

甘草

分炒五

每服一二錢薑棗水煎

黃連安神丸 治心經血虛頭暈神魂驚悸

黃連

酒洗六錢

甘草

炙五分

生地黃

當歸

各一錢五分

硃砂

飛過五錢

右為末飯糊丸梧桐子大每服十五丸空心白滾湯下如二三服不應當服歸脾湯補之

牛黃清心丸

治諸風癱瘓語言蹇澁健忘恍惚頭

目眩暈胸中煩鬱痰塞喘嗽精神昏憤等症或小

兒風熱上壅抽搐發熱或急驚痰盛發搐日反口

禁或大人傷寒汗下之後煩躁發熱不解並宜服

之

牛黃 一錢二分半

麝香

龍腦

羚羊角 各錢

當歸

防風

黃芩

白朮

麥門冬

白芍藥 各一錢半

柴胡

桔梗

白茯苓

杏仁 去皮尖

芎藭

肉桂

大黃卷

阿膠 各一錢二分半

蒲黃

人參

神麴 各三錢半

雄黃 八分

甘肅 五錢

白欬 七分半

犀角 二錢

乾山藥 七錢

乾薑 三錢

金箔

十斤

大棗

十箇
蒸
熱
開
研

右爲末煉蜜丸每兩作十丸金箔爲衣每服一丸

溫水化下

朱砂丸

方見發搐

瀉青丸

方見肝臟

導赤散

方見心臟

抑青丸

方見肝臟

補中益氣湯

方見虛羸

地黃丸

方見腎臟

小柴胡湯

方見發瘧

六君子湯 方見天鈞

秘旨安神丸 方見心臟

異功散 方見天鈞

慢驚

錢仲陽云慢驚因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體逆冷口鼻氣微手足痙瘓昏睡露睛此脾虛生風無陽之症也溫白丸主之蓋慢驚者陰症也俱臟受病而屬虛因吐瀉脾肺俱虛肝木所乘而致痙瘓微搐婁全善所謂木虛則搐而無力經所謂木不及曰委和其病搖頭是也

謂手足搖動也瀉心湯

火虛則身寒口中

氣冷土虛則吐瀉睡而露睛治宜溫補脾胃用六君子湯五味異功散之類徐用誠云乙木屬陰乃肝臟病故慢而難治况有夾熱夾食夾痰與外感症相似者當宗錢氏方主之保嬰集云急驚屢發而屢用直瀉之藥則脾陰愈消而變爲慢驚多矣大率吐瀉痰鳴氣喘眼開神緩昏睡露睛驚跳搐搦乍發乍靜或身熱身冷面淡青白或眉唇青赤其脉遲沈數緩是也當溫補脾氣爲主而佐以安心制肝東垣亦云慢驚風由脾胃虛而生脾虛者因火邪乘其土位火睡能實其木木旺故來剋土當於心經中以甘溫補土

之源更於脾土中瀉火以甘寒補金以酸涼致脾土
中金旺火衰風木自虛矣稟賦不足或久病脾虛及
常服剋伐之藥者多致此症若因土虛不能生金金
不能平木木來侮土而致前症者以五味異功散加
當歸酸棗仁佐以釣藤飲子補土平木若脾土虛寒
者用六君子加炮薑木香不應急加附子以回陽氣
蓋陰血生於脾土宜四君子當歸酸棗仁元氣虧
損而至昏愊者急灸百會穴若待下痰不愈而後灸
之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變已極總歸
虛處惟脾受之無風可逐無驚可療因脾虛不能攝