



活法機要

丹溪心法
卷九



活
癰
機
要

二酉堂梓



活法機要目錄

世瀛門

黃芩芍藥湯

芍藥湯

防風芍藥湯

蒼朮芍藥湯

柴胡芍藥湯

桂枝芍藥湯

麻黃芍藥湯

麻風

大黃湯

白朮黃連湯

白朮芍藥湯

白朮芍藥湯

白朮芍藥湯

白朮芍藥湯

白朮芍藥湯



北京中醫藥大學圖書館版權所有

律

破風風

羌活散風湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

羌活湯

頭風證

治風

頭風

二聖散

百木防風湯

大芎黃湯

防風湯

左龍湯

養血當歸地黃湯

治風



南京中醫藥大學圖書館版權所有

升麻湯

胎產證

黃龍湯

半夏湯

秦苴湯

防風湯

血風湯

沒藥散

四物湯

當歸散

惡核下

三黃散

增損柴胡湯

荆芥散

三分散

血運血結四物湯

加減四物湯

紅花散

生地黄散

吐血



南京中医药大学图书馆藏

麥門冬飲子

頭風證

苦練丸

衛生湯

大頭風證

黃芩黃連甘草湯

黑白散

瘧證

桂枝羌活湯

麻黃羌活湯

麻黃桂枝湯

桂枝黃芩湯

熱證

地黃丸

防風當歸飲子



南京中医药大学图书馆版权所有

金花丸

當歸承氣湯

白虎湯

眼證

散熱飲子

四物龍膽湯

洗眼藥

消渴證

黃連膏

腫脹證

涼膈散

牛黃膏
熱入血分

地黃湯

點眼藥

滴藥

八味丸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

水腫方

瘡瘍證

內疎黃連湯

當歸黃耆湯

復元通氣散

赤芍藥散

冰霜散燒火

五黃散蘇

截疳散

平肌散

內托復煎散

內消升麻湯

五香湯

桃紅散

乳香散蘇

花葉石散

生肌散

碧霞木子



南京中醫藥大學圖書館版權所有

用藥加減例

迴瘡金銀花散

耀黃散

癰癧證

桑椹膏

連翹湯

瞿麥飲子

咳嗽證

利膈丸

欬氣丸

虛損證

四君子湯

和血八物湯

十全散

牛膝丸



南京中医药大学图书馆版权所有

治法要目錄終

黑地黃丸

地黃丸

八味丸

吐證

桔梗湯

木香散

厚朴丸

心痛證

金鈴子散

養黃丸

厚朴丸

藁本湯

木附湯

亦證

酒煮當歸丸

苦練丸

活法機要目錄終



南京中医药大学图书馆版权所有

活法機要

泄痢證

新安吳中珩楚白校

臟腑泄痢其證多種大抵從風濕熱也是知寒少熱多故曰暴泄非陰久泄非陽澀有便膿血知氣行而血止也宜大黃湯下之是為重劑黃芩芍藥是為輕劑治法宜補宜泄宜止宜和和則芍藥湯止則訶子湯有暴下無聲身冷自汗小便清利大便秘禁氣難喘息脈微嘔吐急以重藥溫之藥水散是也後重則宜下腹痛則宜和身重者除濕脈弦

者去風膿血稠粘以重藥竭之身冷自汗以毒藥
溫之風邪內縮宜汗之鴛鴦為痢當溫之在表者
發之在裏者下之在上者湧之在下者竭之身表
熱者內疎之小便澀者分利之盛者和之去者送
之過者止之除濕則白朮茯苓安脾則芍藥桂枝
血則黃連當歸宣通其氣則檳榔木香如泄痢而
嘔上焦則生薑橘皮中焦則芍藥當歸桂枝苓下
焦則治以輕熱甚以重熱藥若四肢懶倦小便少
或不利大便走沉困飲食減宜調胃去濕白朮茯
苓芍藥三味水煎服如發熱惡寒腹不痛加黃芩

爲主如未見膿而惡寒乃大陰欲傳少陰也加黃
連爲主桂枝佐之如腹痛甚者加當歸倍芍藥如
見血加黃連爲主桂當歸佐之如煩燥或先便血
膿後血或發熱或惡寒非黃連不能止上部血也
如惡寒脈沉或血腰痛或血臍下痛非黃芩不能
止此中部血也如惡寒脈沉先血後便非地榆不
能止下部血也唯脈浮大者不可下

黃芩芍藥湯

宇在實鑑
泄痢脩下

大黃湯治泄痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無
度久不愈者

六黃兩一

右剉細好酒二大盞同浸半日許煎至一盞去
大黃不用將酒分二服頓服之如未止再服以利
為度復芍藥湯和之痢止再服黃芩芍藥湯和之
以徹其毒也

芍藥湯

方在寶鑑內
痢疾條下

白朮黃耆湯服前藥痢疾雖除更宜此和之

白朮兩一

黃耆錢七

甘草錢三

一方無黃耆用

黃芩兩一

右咬咀均作三服水煎服清

防風芍藥湯治泄痢飧泄身熱脈弦腹痛而渴及頭
痛微汗

防風

芍藥

黃芩
略一

右咬咀每服半兩或一兩水煎

白朮芍藥湯治太陰脾經受濕水泄注下體重微滿
困弱無力不欲飲食暴瀉無數水穀不化宜此和
之

白朮

芍藥
略一
甘草
酥

右剉每服一兩水煎

蒼朮芍藥湯治痢疾痛甚者

舌去幾更

三



中國醫藥大學圖書館版

蒼朮兩一

芍藥兩一

黃芩

肉桂略半

右剉每服一兩木煎

訶子散如腹痛漸已泄下微少宜止之

訶子皮一兩半
熱各半

木香兩半

黃連

炙甘草各三錢

右為細末每服二錢以白朮芍藥湯謂下如止之

不已宜歸而送之也 訶子散內加厚朴一兩竭

其邪氣也

漿水散治暴泄如水周身汗出身上盡冷脈微而弱

氣少不能語甚者加吐此謂急病



北京中医药大学图书馆藏

半夏湯二兩 附子炮 乾生薑 炙甘草

肉桂各半 良薑二錢

右為細末每服三五錢漿水二盞煎至半和滓熱

服

黃連湯治大便後下血腹中不痛者謂之濕毒下血

黃連 當歸各半 炙甘草一錢

右以咀每服五錢水煎

芍藥黃連湯治大便後下血腹中痛者謂之熱毒下

血

芍藥 黃連 當歸各半 大黃一錢

