

萬病回春

已 4

71-2

共 8 冊

小兒科

太醫院吏目金谿雲林龍廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

小兒神色總斷

凡小兒病宜先觀形症神色然後察脈假如肝之為病則面青心之為病則面赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者

觀形察色辨因由

鼻冷便知是瘡疹

五指稍頭冷

中指獨自冷

觀面部五色

面赤熱風熱

脾怯黃疳積

陰弱陽強髮硬柔
耳冷應知風熱症
驚來不可當
麻痘症相傳

若是傷寒雙足冷
渾身皆熱是傷寒
若逢中指熱
女右男分左

要知有熱肚皮求
上熱下冷傷食病
必定是傷寒
分明仔細看

面青鵞可詩
虛寒眈白光

心肝形此見
若逢生黑氣

脉證辯溫涼
腎敗命須亡



頤腎

下頰屬腎水北
左脾屬肝木東
額上屬心火南
鼻準屬脾土中
右腮屬卯金西

曾補萬壽回春

卷八

小兒總論

小兒三歲以下有病須看男左女右手虎口三關從第二指側看第一節名風關第二節名氣關第三節名命關辨其紋色紫者屬熱紅者屬寒青者驚風白者疳病黑者中惡黃者脾之困也若現於風關為輕氣關為重通于命關則難治矣

三關脉紋主病歌

紫黑紅傷寒 青驚白是疳 黑時因中惡 黃即因脾端 青色大小曲 人驚併四足

赤色大小曲 水火飛禽撲 紫色大小曲 傷米麪魚肉 黑色大小曲 脾風微作搐

手指脉紋八段錦

魚刺形主驚風痰熱

乙字形主肝病驚風

懸針形主傷風泄瀉積熱

水字形主驚風食積咳嗽

環形主疳積吐逆

虎口三關脉紋圖



風關第一節寅位
氣關第二節卯位
命關第三節辰位
虎口叉手處是也

凡小兒至三歲以上乃用一指按寸關尺三部常以六七至為率添則為熱減則為寒浮洪風感數則多驚沉遲為虛沉實為積

小兒脉法總歌

小兒有病須憑脉

右手氣口主內疾

浮洪多是風熱感

一指三關安息數

外候風寒暑濕侵

沉細原因乳食積

遲冷數熱古今傳

內候乳食痰積致

沉緊腹中痛不休

浮風沉積當先識

洪緊無汗是傷寒

弦緊喉間作氣急

左手人迎主外証

浮緩傷風有汗液

緊促之時疹痘生

緊數之際驚風至 虛軟慢驚作癎癎 緊實風癎發搐搦 軟而細者為疳蟲 牢而實者因便閉
脉花大小便中血 虛濡有氣兼驚悸 滑主露濕冷所傷 弦急客忤君須記 大小不勻為惡候

二至為免三至卒 五至為虛四至損 六至平和曰無疾 七至八至病尤輕 九至十至病熱極
十一至至死無疑 此訣萬中無一失

小兒死候歌

眼生赤脉貫瞳人 顙門腫起又作坑 指甲黑色鼻乾燥 鴉聲忽作肚青筋 虛舌出口咬牙齒
目多直視不轉睛 魚口氣急喘不得 虻蟲既出死形真 手足擲搖驚過節 靈丹十救一無生
魚目定睛夜死 面青唇黑晝亡 啼而不哭是痛 哭而不啼是驚 噤煎不安是煩 噤啞不定是燥

急驚

急驚風症牙關緊急壯熱涎潮 竄視反張搐搦動唇口眉眼攣引口申熱氣產赤唇紅三便閉結脉浮洪數
調養胃氣搐定而痰熱少退 節宜調補脾氣此大去也 緊此內有實熱外挾風邪當截風定搐若痰熱尚作仍微下之痰熱既泄急宜

急驚屬肝風邪痰熱有餘之症也 急驚青陽症也治宜解表散毒散生之
敗毒散治急驚風初起發熱手足搐搦上宮大角弓反張并一切感
人參 羌活 獨活 柴胡 前胡 茯苓 去皮 桔梗 去蘆 川芎 枳殼 去穰 天麻 全蝎 去毒

姜蠶炒 白附子 煨 地骨皮 各等 甘草 減半 右剉一劑生薑三片水煎服
靈砂丸 治小兒風痰驚積 南星 泡 半夏 泡 巴豆 去殼酒煮乾 全蝎 硃砂 為衣各三錢 姜蠶
炒七 輕粉 少許 右為末水和丸如黍米大每一粒三次九如驚風金銀湯下其餘姜湯下

龍腦安神丸 專治大人小兒驚風癩癧男婦骨蒸勞熱咳嗽語澁舌強久不瘥者及傷寒大熱不解久無汗
者三之一四五歲以上 牛黃 五分 片腦 三分 烏犀角 二錢 硃砂 二錢 人參 二錢 白茯苓 法破

者二之一極神效 牛黃 五分 片腦 三分 烏犀角 二錢 硃砂 二錢 人參 二錢 白茯苓 法破

地骨皮二錢 麥門冬二錢 桑白皮二錢 麝香三 馬牙硝三分 甘草二錢 右各為末分兩秤

準合為一處蜜煉為丸每兩作十九金箔四大張為衣陰乾磁器內放用黃蠟作蓋恐泄腦麝之氣此方中

能其功盡述

○千金散治小兒一切痰喘急慢驚風雖至死但能開口澆下無不活者 全蝎炙 姜蠶各三 硃砂四分 牛黃去庫 冰片一分 黃連

天麻各四 膽星 甘草各二○右為末每用五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○保生錠治小兒急慢驚風痰涎壅盛胎驚內帛多啼夜間恍惚不寧久 牛黃 天竺黃 辰砂各一 雄黃

三錢 麝香五分 片腦五分 琥珀一兩 珍珠五錢 大赭石三錢火 蛇含石三錢火 金銀箔

四張 天麻 防風 甘草 茯苓去皮 人參各三 姜蠶 血蝎各五 遠志三錢 陳皮 牛膽

南星各一兩○右為細末用米粉糊為錠辰砂為衣用薄荷湯化下

○大聖養命金丹治小兒急慢驚風癲癇天吊額生紋中惡及初生臍風撮口者其胎驚胎癇牙關緊閉驚風

驚藥俱不及此真起死回生之良劑也楊絕兩傳

天麻炮 全蝎炒去翅 姜蠶炒膽星 防風去蘆 羌活 白附子炮 茯神去皮 川芎 遠志炮去

桔梗去蘆 石菖蒲 半夏姜製 人參去蘆 白朮去苦 茯苓去皮 酸棗仁炒荆穗 細辛各五

川烏炮去皮 烏蛇尾酒浸炙 甘草 大赤頭蜈蚣一條薄切 沉香 犀角 羚羊角 辰砂

水飛 珍珠 琥珀各三 天竺黃一兩 雄黃 麝香各一 金箔三十 銀箔四十○右為末薑汁

○打糊為丸如芡實大硃砂為衣每服一九用金銀薄荷煎湯研化不拘時服

一小兒潮熱發搐痰涎上壅手足指冷申酉時左腮青色隱白用補中益氣湯調補脾肺六味丸滋養肝腎而

痊○一小兒三歲因驚搐發熱或久服抱龍丸等藥面色或赤或青此心脾二經血虛風熱生痰也用

六味丸滋腎生血用六君柴胡升麻調補脾胃而安三方俱見補益

慢驚

慢驚症因病後或吐瀉或藥餌傷損脾胃肢體逆冷白

慢驚

鼻氣微手足痠軟皆慢驚者陰症也治宜

醒脾散

治小兒吐瀉脾困昏沉默默不食

白附

治小兒吐瀉脾困昏沉默默不食

泡陳倉米二百粒煎服屢效

黃芪湯

治小兒慢驚

治小兒吐瀉脾驚

可服

凡慢驚元氣虛損而至昏瞶者

急灸百會穴若待下痰不愈而後灸之則元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳變

紫金錠子

治急慢驚風延朝發熱或熱人參去蘆

乳香

赤石脂

麝香一錢

薄荷湯研化服

一小時傷食發丹服發表之劑手足搐搦服抱龍丸目閉痰盛余謂脾胃虧損而變慢驚

也無風可祛無痰可逐只宜溫補胃氣逆用六君子加附子一劑而愈方見補益

一小時搐搦痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君子補中益氣二湯補脾氣而愈

元丹

治小兒急慢驚風痰涎自流或用驚風之藥益甚視其面色黃白余用六君子補中益氣二湯補脾氣而愈

後調理

牛黃鎮驚丸

治驚後調理安心神養

木通

去皮

黃連

山梔

牛黃

龍骨

青黛

右為末煉

密為丸如菜豆大每服二三九淡姜湯送下

一小時因看會見胖鬼臉被驚嚇兩眼黑睛看白睛看向外視物微覺一線諸醫不能治求治於

余余曰此子曾出痘疹不對曰未俟出痘疹可治逾日痘疹盛行其子發熱似有將出之機其家果召余治以綿胭脂將水泡出汁慢火熬成膏塗見兩眼胞上下一日塗兩次直至痘疹收靨後其眼復舊

疳疾

夫小兒疳汁由乳母寒熱失理動止垂違飲食無節甘肥過度喜怒氣亂醉飽勞傷使乳兒者故成疳疾又以久吐之後久瀉之後久痢之後以致久渴久汗久熱久瘡久嗽下血久瘡之後皆能亡失津液並成疳病錢氏云疳皆脾胃傷亡津液之所作也

凡養小兒宜戒敬 酒肉油膩偏生病 生冷硬物凉水漿一不與自無疳癰病

○消疳湯 治小兒大便色白小便渾 山查肉 白芍炒 黃連姜汁 白茯苓去皮 白朮去皮 澤瀉

錢一 青皮四分 甘草三 右剉一劑姜蜜火煎

○消疳丸 治五疳皮黃肌瘦髮直呆白肚大青筋好食促 蒼朮 陳皮 厚朴姜汁 枳殼麩炒 檳榔 神麩炒 山查去子 麥芽炒 三稜煨 義木煨 砂仁 茯苓去皮 黃連炒 胡黃連 蕪

荑仁 蘆薈 史君子去殼 右各等分為末史君子殼煎湯泡蒸餅為丸如彈子大每服一丸清米湯

化下

○肥兒丸 治疳積 蘆薈 三錢半 碗底泥封固 人參三錢 白朮去蘆 茯苓各三

黃連 錢半 三 胡黃連 五錢 史君子 四錢 神麩炒 麥芽炒 山查肉 各三 甘草 錢二 右為末

黃米糊為丸米湯化下或作丸黍米大每服二三十九米湯下看見大小加減

快活丸 治小兒下利色症皮膚瘦削骨露如柴肚大青筋小便濁

蒸餅下 分以餅屑填外以濕紙色兩預開一窠透乾取出餅屑入青若 右為細末別以肥小棗用米泔

水浸經一皮飯上蒸熟去核皮爛杵如糊同前餅末杵勻為丸如黍子大每服三五十九不拘時清米湯

送下或研化米湯調服亦可

○蘆連消疳丸 治小兒生疳塊發熱肚脹壯

白木 浸焙 白茯苓去皮 當歸洗全用酒

大甘草 節用四兩

蘆薈 湖黃連 宣黃連 各

錢七 無美炒 檳榔 各五 右為細末湯泡蒸餅一糊為丸 萊豆大每服五六十九臨晚米湯送下或

煉蜜為丸如龍眼大每晚噙化一丸或米湯下或酒亦可

一 小兒肝疳白膜遮睛筋痛瀉血腎疳身瘦瘡疥骨疳喜卧冷地又治胃怯不言解顱併年長不能行者用六

味丸各等分煉蜜丸久服神效方見補益○一 小兒四肢消瘦肚腹脹大行步不能顱能飲食作渴發熱去

後臭穢此脾臟傷也用異功散方見補益肥兒丸調理而愈○一 小兒面色痿黃眼胞微腫作渴腹脹飲食

少思腹中一塊或移動小便登白大便不實此脾疳之患用四君子方見補益加山梔無美兼肥兒丸而愈

一 小兒尿濁如米泔余以江南做酒小麴炒為末酒調下三服

癖疾

錢仲陽云癖不愈僻於兩脇痞結者否於中脘此因乳哺失調飲食停滯邪氣相搏而成或乳母六淫七情所

致古人多用剋伐痞癖既久飲食減少脾氣必虛久而不愈必先以固胃氣為主使養正則積自除若欲直

攻其結不惟不能善消抑且損其脾土凡脾土虧損必變症百出矣當察各類及隨見症而主治之若癖塊

日久元氣脾胃俱虛宜朝服補中益氣湯夕服千金消癖丸間與混元丹兼服治之獲効者多矣

癖者生於皮裏元外也 淨腑湯 治小兒一切癖塊發熱 柴胡 白茯苓去皮 猪苓 澤瀉 三棱 醋炒

義末 醋炒 山查 去核各 黃芩 白朮去蘆 半夏 姜製 人參 各八 胡黃連 甘草 各三○右

劉一劑姜蜜煎服

○肥兒丸 治小兒癖疾 甘草 錢一 蘆薈 阿魏 糊為 青黛 木香 厚朴 姜

曾甫為病回春

土不...

四

炒檳榔 陳皮各一錢 麥芽炒四 史君子去殼 胡黃連 山查肉 香附水浸 三稜醋炒 莪
木各二錢 水紅花子微炒 神麴炒各 人參去蘆 茯苓去皮 白米法蘆各 〇右為大將阿魏一

錢白水和麴打爛為丸 菴豆大每服四五十九米飲白湯送下

〇益免餅治小兒 水紅花子 史君子去殼 山查肉 白米 檳榔一錢 木香一錢 神麴
半錢 右為末入黃蠟麴水和作煎餅吃

〇至寶丸 真阿魏二錢 蘆薈 天竺黃 胡黃連 雄黃 川山甲炒 沉香 白草烏泡 硃砂各二
沒藥各二 〇右為極細末用好酒和成一塊入銅鍋內再入酒半茶鐘熬成膏勿令火大恐傷藥力量可

九取出丸如豌豆大每丸黃酒化下十歲以上服二九臨臥時服待其自然汗出三日服一次重者五七服
輕者二三九熱即退塊亦消須要忌口如服後熱不止可後服金花丸如羸弱不進食者可先服平胃散

〇癖疾方 麝香一分 全蝎去毒 斑貓去頭 紅娘子去頭尾足翅女 蠅蟲去足 血蝎 雄黃 硃
砂 蘆薈 木香 阿魏 當歸尾酒浸 三稜醋煮 莪術醋煮 香附米炒 白豆蔻去皮 蘿蔔

子炒各 〇右為細末醋糊丸如梧桐子大每服三五十九或酒或溫水下壯盛者可服
〇癖疾方 蘆薈五分 阿魏五分 急性子 柳桃 水紅花子一錢 黑白牽牛 猴燒灰 右為

細末每服三分黃酒送下三帖全好

〇癖疾方 牛黃四分 雄膽四分 血蝎一錢 蘆薈四分 蘆甘石五分 天竺黃五錢 黃蠟五錢
淨皮硝一兩 蜂蜜四兩 〇右將蠟化開與蜂蜜一處滾熟佳火傾入細磁碗內涼冷後將羣藥為細末

方入蜜蠟內攪勻每日常服先服用筋頭蘸吃後多服不怕十日全消忌酸冷油膩之物
又方 核桃仁一斤 檳榔仁十 硃砂一錢 大黃一兩 〇右三味為細末入桃仁水煮一炷香水滾時

陸續入皮硝半斤香盡硝亦盡止食桃仁亦好

○清膏散 治癰疾生牙 輕粉炒灰 象皮炒灰 象牙焙黃 乳香 沒藥 孩兒茶 紅褐炒灰 珍珠

煨黃

治癰疾生牙

○右為細末搽患處立時痛止生肌如神

○桃花散

治癰疾生牙

桃花信一塊 桑柴火內燒紅淬入細茶濃酒內如此七次去信將茶酒入雄黃一塊

研末入酒內用雞翎頻掃患處止痛生肌立時見效

○赴堅膏

治小兒癰塊

木鱉子 川山甲 川烏 甘遂 甘草 當歸 ○右藥各八錢先用真香油一

斤入鍋內

將前藥熬成灰濾去渣再慢火熬滴水不散方下黃丹八兩熬滴水成珠方下細藥入內再不見

火 蘆薈

阿魏 礞砂

皮硝 水紅花子 礞砂三錢 麝香一錢 ○右為細末入內攪勻不熬

攤為膏藥貼時先用皮硝水洗皮膚以膏貼癖二三日後覺肚內疾作疼四五日發瘡裏後有膿血之物是

其驗也

○抓癰膏

治癰疾

白蠟四兩 桃仁四兩 香油半斤 桐油半斤 生猪腦子半斤 男子血餘淨水洗

炒

右俱下鍋內文武火熬的腦子盡用布絹濾去渣次下飛過黃丹十四兩熬成膏待溫下 胡黃連

香白芷 蘇木 紅花

三棱 義術 當歸尾 礞砂 麝香 各為細末照分兩重

羅入煎膏內攪勻收貯勿令泄氣如有積塊先用皮硝煎水洗患處令淨次用生薑擦之方用絹帛攤藥貼

上貼後用熱鞋底炙熱熨之五七十遍覺內熱方可如貼後癖即消縮如神

○灸法 穴在小兒背脊中自尾骶骨將手揣摸脊骨兩傍有血筋發動處兩穴每一穴用銅錢三文壓在穴

上用艾炷安孔中各灸七壯此是癖之根貫血之所灸之瘡即發即可見效灸不着血筋則瘡不發而不效

○化癖如神散

治癰塊

蟾酥 黃蠟 羚羊角 牛黃 麝香 巴豆肉 礞砂 冰

化膿血出盡服調理脾胃藥

一小兒患痞瘕腹攢擱達木枳實黃連之類痞益甚余曰此脾經血虛痞也不可尅伐遂用六君子加當歸數劑胃氣漸復諸症漸愈乃朝用五味異功散加升麻柴胡夕用異功散加當歸為藥而愈方見補益

諸熱

小兒諸熱辨例

傷寒熱手足稍冷發熱惡寒而無汗面色青慘而不舒左額有青紋色傷風熱手足稍微溫自汗面赤而光咳嗽鼻塞流清涕

傷食熱目胞腫右額有青紋身熱而頭額腹肚尤甚夜熱晝涼面黃或吐利腹疼

驚風熱面色青紅額正中而有青紋手心有汗時作驚惕手脈絡微動而發熱

風熱身熱倍能食唇紅頰赤大小便秘○潮熱如水之潮依時而至

變蒸熱身體上下而蒸熱上氣虛驚耳冷微汗唇上下有白泡狀如珠子重者身熱脉亂腹痛啼叫不能乳食或吐或嘔週歲以後無此症也

潮熱發渴有時驚熱顛叫恍惚夜熱夕發且止餘熱寒邪未盡食熱肚背先熱痞熱膏蒸盜汗皆熱一向不止煩熱心躁不安積熱頰赤口瘡風熱汗出身熱虛熱困倦少力客熱來去不定瘕熱涎嗽飲水寒熱發如瘧疾狀血熱辰巳時發疹熱耳鼻尖冷諸熱得之各有所歸其間有三兩症交宜者宜隨其輕重而治之

諸熱為病者宜清解也

○大連翹飲治小兒傷風感冒發熱痰壅風熱丹毒腫痛頸項有核頭赤癰癰眼目

連翹 瞿麥 滑石

車前子 梔子 牛蒡子 赤芍 木通 當歸 防風 枳殼 柴胡 黃芩 荆芥 各一錢 蟬

退五分 甘草 六錢 ○右剉竹葉十片燈心十莖水煎不拘時溫服○風痰熱變蒸加麥門○實熱丹熱

加大黃 胎執瘡疹餘毒加薄荷葉○癰疽熱毒加大黃芒硝

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.com

○五福化毒丹

治小兒痘毒熱毒唇目腫破生瘡牙根出血口臭煩赤

犀角

桔梗去蘆

生地黃酒洗

赤茯苓去皮

牛蒡子微炒各

朴硝

連翹

玄參黑者

粉草錢六

青黛二錢

○右為末煉蜜丸

如龍眼大每服一九薄荷湯化下兼有驚加硃砂為衣

感冒

感冒者宜發散也

○惺惺散

治外感風寒鼻塞

人參

白朮

白茯苓

桔梗

瓜蒌根

細辛

甘草

薄荷

右剉水煎服

○羌活膏

治小兒風寒外感驚風內積熱發喘

人參

白朮

獨活

前胡

川芎

桔梗

羌活

天麻

錢五

薄荷一錢

地骨皮二錢

甘草二錢

○右為細末煉蜜為丸如芡實大每服一九姜湯研化下

一小兒八歲患傷寒頭疼身痛發熱口乾面赤無汗諸醫以傷寒治之百藥罔效已經旬日袖手持覽余以龍腦安神丸一服其汗如雨即瘥

一小兒外感風邪服表散之劑汗出作喘此邪氣去而脾肺虛也用異功散而汗喘止再劑而乳食進

一小兒沉默皆依肢冷驚悸其紋如弓之向車此屬胃氣虛而外感風邪也先用惺惺散以解外邪調胃氣諸症頓愈但手足逆冷又用六君子湯調元氣而安

傷食傷食者宜

萬億九

治小兒乳食生冷所傷發

○消食九

治小兒乳食不

○消食餅

治小兒時常傷食皮黃肌瘦肚

為末麵糊為丸如麻子大食後白湯送下大小加減

○消食餅

大腹脹用此餅餅令常服之

○消食餅

大腹脹用此餅餅令常服之

右各等分為末每四兩入麵一斤水同和烙焦餅用

感冒傷食腹脹嘔吐

六

一 小兒傷寒嘔吐發熱面赤服消導清熱之劑飲食已消熱亦未退余以為胃經虛血用六君子升麻柴胡四劑而痊○一 小兒十四歲傷食發熱服消食丸胸腹膨脹發熱作渴此脾氣復傷也先用四君子升麻柴胡飲食漸進用補中益氣湯而愈後因勞心發熱少食用四物升麻柴胡而愈○一 小兒傷食發熱抽搐嘔吐喘嗽屬脾肺虛氣虛有熱用六君子炒黑黃連梔子而愈右方俱見

腹脹

腹脹者脾胃氣虛也○消脹散治小兒腹脹 蘿蔔子炒 蘇梗 乾葛 陳皮 枳殼各等 甘草少許 右剉

水煎服食少者加白朮

一 小兒傷食腹脹胸滿有痰余用異功散而痊後復傷食腹脹作痛或用藥下之痛雖止而脹益甚更加喘粗此脾胃氣傷而及於肺也用六君子加桔梗調補而痊○一 小兒停食服通利之劑作嘔腹脹此脾胃復傷也用補中益氣湯而愈右方俱見

嘔吐

嘔吐乳食傷胃也○定吐飲治吐逆投諸藥 半夏湯泡透切片焙乾為末二兩 生薑洗淨和皮一兩 薄桂去粗皮剉三錢 右薑切

作小方塊如菉豆大同前半夏和勻入小罐內慢火順手炒令香熟帶乾方下桂再炒勻微有香氣以紙攤

開地上去火毒候冷畧播去黑焦末每服二錢水一盞薑三片煎七分空心少與緩服

○定吐紫金枝治嘔吐 丁香 木香 藿香 半夏姜湯泡七次 人參去蘆 白朮去蘆各二錢 右為末薑汁打糊

為丸棗核大用沉香硃砂各一錢為衣陰乾每用一丸用棗一枚去核放藥丸在內薑片夾濕紙裏火內煨

熟去薑紙嚼服米飲壓之

一 小兒傷食發熱面赤抽搐嘔吐氣喘吐痰此飲食傷脾肺氣虛弱所致用六君子湯炒黑黃連山梔各二分

一劑頓愈方見補益

泄瀉

泄瀉者乳食傷脾也

○參苓白朮散

治脾胃虛弱飲食不進多困少中滿痞腫心中氣喘嘔吐泄瀉此藥中和不熱久服養氣有神醒脾悅色順正僻邪

山藥炒

甘草

炙各二錢

蓮肉去心

人參 白朮炒 茯苓去皮 山

每服二錢棗湯調下量兒歲加減

○啟脾丸消食止瀉止吐消疳消黃消脹定腹痛益脾健胃

蓮肉

各一兩

山查肉

陳皮

澤瀉

甘草

炙各五錢

右為末煉蜜為丸梧桐子大每服二三九空心

米湯下或米湯研化服亦可小兒常患傷食服之立愈

○一方益元散加白朮末一兩每服一二錢米湯調下止小兒泄瀉殊效

○止瀉小兒水泄不止○五梧子為細末陳醋調稀熬成膏貼臍上即止

○水瀉痢疾方

生薑四兩

真香油四兩

黃丹二兩

熬成膏藥貼臍立效

一○小兒飲食後即瀉先用六君升麻神麴山查而止又用五味異功散加升麻而痊後吐瀉腹痛用保和丸二

服又用異功散調補脾氣而安○一○小兒傷食作瀉腹脹四肢浮腫小便不利先用五苓散方見中暑○一

加木香旬餘諸症漸退又用五味異功散為主佐以加減腎氣丸又旬一日二便調和飲食漸進浮腫旋消

乃以異功散調理而安○一○小兒因驚久瀉面色青黃余謂肝木勝脾土也朝用補中益氣湯夕用五味異

功散加木香子母俱服而愈○一○小兒久瀉兼脫肛小腹重墜四肢浮腫面色痿黃時或兼青諸藥到口即

嘔吐審乳母憂鬱傷脾大便不實先用補中益氣湯五味異功散及四神丸調治其母不兩用子母俱愈

補益俱見

曾補為天回春

泄瀉吐瀉

二

○白朮散治吐瀉或病後津液不足口乾作渴 人參去蘆 白朮去蘆 茯苓去皮 藿香 木香 乾葛

甘草穀銘 ○右剉劑水煎服 若小兒頻瀉痢將成慢驚加山藥扁豆肉豆蔻各一錢 薑一片水煎服○

若慢驚已作加細辛天麻各一錢 全蝎三個 白附子一分 若冬月小兒吐蛇是胃寒胃虛所致加丁香

三粒○如胃虛不能食而大渴不止者不可用淡滲之藥乃胃中元氣少故也以此湯補之加天花粉○若

能食而渴者白虎湯加人參○如中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷服之即效

燒針九治小兒 黃丹 硃砂 白礬枯過 右為末棗肉為丸如黃豆大每服三四丸戳針尖上燈焰上

燒過涼水泔研爛調服瀉者食前吐者無拘時外用菜豆粉以雞子清作膏如吐塗兩腳心如瀉塗臍門上

止則去之

○又方治吐瀉 四君子湯加藿香陳皮一劑而愈

○助胃膏治不思飲食及久瀉虛寒 人參 白朮去蘆 茯苓去皮 甘草各一錢 白豆蔻去壳 木香

山藥炒五錢 肉豆蔻去油二錢 砂仁炒二錢 丁香 官桂 藿香各三錢 陳皮五錢○右為細末煉蜜

為丸彈子大每服一丸米湯化下

秘方治小兒 白礬黃丹各五錢用葱白搗爛塗臍上即止

治小兒吐瀉 小丁香 陳皮各等 水煎溫服

一小兒數歲間每停食輒服峻利之藥後肚腹脹嘔吐泄瀉先用六君子湯諸症漸愈又用補中益氣湯而

安○一小兒腹脹飲食後即瀉手足逆冷此脾氣虛寒也先用人參理中丸後用六君子湯而愈○一小兒

吐瀉乳食色白不化露睛氣喘此脾肺不足形病俱虛也先用異功散加桔梗柴胡頓愈再用補中益氣湯

而安○一小兒因驚吐瀉腹脹先用六君子湯柴胡治之稍可又以五味異功散而愈後因驚搐瘳其或用

鎮驚化痰之藥倦怠不食而泄甚先用異功加木香鈎藤四劑而愈補益○一小兒面黃肌瘦泄瀉無度

腹脹如鼓不思飲食百藥不效余教用好生白木酒磨濃汁以溫酒調空心服二三日即愈

痢疾 東垣云白者濕熱傷氣分赤者濕熱傷血分赤白相雜氣血俱傷也

痢疾者腹中實積也

○萬億丸 治小兒下痢赤白腹痛初起者一服即愈 ○一方治小兒痢用雞子一個冷水下鍋煮一沸取出去白用黃研碎以生姜

汁小鍾半鍾和勻與兒食忌茶

姜茶煎 治痢疾腹痛不問赤白冷熱皆可用之 老生姜 切片三錢 細茶三錢 用新汲水煎服

一方用生薑細茶連根韭菜三味同搗汁酒調立止

○仙梅丸 治痢疾發熱發渴者 細茶 烏梅 水洗剝去核曬乾 右為末用生薑搗作丸彈子大每一丸水冷熱隨意化下

○鐵門拴 治熱痢瀉痢疾 文蛤 炒黃色一兩 白礬 生三錢 黃丹二錢 ○右為細末黃蠟二兩融化為丸如漿

豆大每服大人十五丸小兒五七丸茶一錢姜二錢煎湯下

○瀉痢方 五倍子炒黃色為末烏梅肉水浸為丸如彈子大每服一丸白痢冷米湯下水瀉冷水下

○水瀉痢方 飛白礬一錢 丁香五分 其為末水瀉白水下痢疾黃酒下

○石蓮散 治小兒口痢 石蓮肉 炒去心 ○右為末每服一二錢陳倉米飲調下如嘔加生姜汁二匙同服一

方山藥末半生半炒米飲調下

○香蓮丸 黃連 兩用吳茱萸五分兩水其濕入器煮滾陽中半日炒焦黑 木香二兩 ○右為末醋糊丸如赤豆大每服二三九白湯

○固腸丸 治紅白痢 黃蠟一兩 黃丹水飛 其化一處為丸如黃豆大每服三九 紅痢甘草白風乾姜紅白痢甘草乾姜湯下空

服心

治水瀉痢疾用鳳眼草蜜水炒為細末每服一錢水煎空心服立止

一小兒患痢脫肛色赤或痛用補中益氣湯送香蓮丸而愈後傷食作瀉復脫肛不入仍用前湯更以草麻仁

研塗頂門而愈○一小兒患痢口乾發熱用白朮散煎與送飲時與白朮散送下香連丸而安○一小兒久痢裡急後重欲去不去手足並冷此胃氣虛寒下陷也用補中益氣湯加木香補骨脂倍升麻柴胡而愈

瘧疾

瘧者腦上痰結也○萬億丸方見通治

○芫花散治小兒瘧疾 芫花根為末每用一二分三歲兒用三分以雞子一個去頂八末攪勻紙糊頂口外用濕

紙裏灰煨熟嚼吃

○天靈散 天靈蓋燒存性為細末每服五釐黃酒調下止

○消癖丸治瘧每停水結 芫花炒 硃砂各等○右為細末煉蜜為丸如小豆大每服十九裹湯送下

○祝由科治瘧疾不愈 咒曰 吾從東方來 路逢一池水 水裏一條龍 九頭十八尾 問伊食甚的 只

吃瘧疾鬼

右念一遍吹在果子上念七遍在上令病人於五更雞犬不聞時面東而立食訖於靜室中安睡忌食瓜果

暈肉熱物此法十治八九無藥處可以救人果者謂桃杏棗栗之類

小兒先因停食腹痛服峻厲之劑後患瘧日晡而作余以為元氣下陷欲治以補中益氣湯不信泛行清熱

消導前症益甚食少作瀉余朝用前湯夕用異功散加當歸月餘而愈○小兒每午前先寒後熱久不愈用

咳嗽

咳嗽者肺傷風也

○參蘇飲治小兒四時感冒發熱頭痛咳嗽喘急痰涎壅盛

紫蘇 陳皮 前胡 桔梗 半夏 煨汁 白茯苓 去皮 乾葛 枳殼 麩炒 各 甘草 人參 二味 減半