

清・葉廷薦・撰

救急備用經驗彙方



救急備用經驗彙方・解題

清・葉廷薦撰。成書於嘉慶六年（公元一八〇一年）。

葉廷薦，號鳳梧。涇川（今屬甘肅）人。

此部分內容引自該書卷三，記述了解食物及藥物中毒的九十二種解毒法，每一種解毒法少則附二、三方，多則幾十方，這些解毒方大都以單味藥組成。

今據清·嘉慶六年（公元一八〇一年）刻本影印。

（王味咪）

解中飲食毒

一覺腹中不快卽以生黃豆嚼之不

聞腥氣此中毒也或嚼生礬一塊覺甜而不澀者

亦中毒也急以升麻煎濃連飲以手握吐卽愈或

救急備用經驗藥方

卷三 統治門

夏

急用苦參三兩

若酒釀卽米

一升半煮半流陸續飲

之吐食出卽瘥水煮亦得犀角湯亦可解或薤白

生甘草

各二兩

剉細水煎停冷去渣分三服加蜜

少許同煎亦妙

解毒藥汁不可熱食諸毒病得熱更甚宜冷飲之

解中六畜肉毒

犀角磨濃汁一碗服之黃柏末

灶心土末

赤小豆燒末

東壁土末

頭垢

一錢

扁豆豉汁

並水服

一方水煎牆上黃土二錢飲之卽解

解中自死六畜肉毒

黃柏末二三錢水調服不解

再服。或壁上黃土水調服二錢。或雄鼠屎鼠屎者。是十四枚研末。水和服。或食人乳一升愈。

解中馬肉毒。藍根汁。嚼杏仁。甘草汁。飲美酒。食酸馬肉。不飲酒則殺人。

一方香豉。杏仁。蒸一食頃熟。杵之服。日再服。解中馬肝毒。猪骨灰。雄鼠屎。豆豉。狗屎灰。

人頭垢。並水服。

解中牛肉毒。烏柏樹根皮酒煎。同熱酒服。或菊花連根搗汁酒服。猪脂化湯服。甘草煎湯。猪牙灰水服。飲人乳汁一升立愈。米泔洗頭垢。

救急備用經方

卷三 統治門

雲

飲一升愈。

解中獨肝牛毒。人乳服之。

解中牛馬生疔毒。澤蘭根搗水服。生薑蒲搗酒。

猪牙灰水服。甘菊根搗水。甘草煎湯。

解剝死牛馬毒。開剝死牛馬中毒。遍身生紫疱俱潰。叫痛急服紫金錠。見分治門。乳部脫發。吐瀉即愈。

解中猪肉毒。杏仁研汁。韭菜汁。朴硝煎汁。

猪骨灰調水。大黃煎湯。猪羊肉以桑楮柴煮。

炙食之。生寸白虫。

一方猪牙燒爲末。一錢水送下。

解中狗肉毒 杏仁研末水服 煮蘆根取汁飲之

解中羊肉毒 甘草煎湯服

解食鬱肉漏脯毒 凡肉盛密器蓋之隔宿者名爲

鬱肉又茅屋漏水沾漏脯名爲漏脯皆有毒害人

人乳汁 飲生韭菜汁三升 燒犬屎酒服方

寸匕 又燒人屎和酒服 黑豆濃煎汁飲數升

解食黍米中藏乾脯毒 大豆濃煮汁飲之數升即

解亦治狸肉漏脯等毒

解食烏鵒肉毒 大豆汁或鹽汁服之

解食六畜烏鵒肝毒 水浸豆豉絞取汁服數升愈

救急備用經驗靈方

卷三

統治門

夏

中毒在胃故用豆豉涌吐其毒 如肝色青黯腎

色紫黑俱不可食

解自死烏鵒肝毒 取人頭垢一錢熱湯化服

解中藥毒前肉毒 大豆煎汁 鹽湯狸骨燒灰和水

服

又黑豆汁蘆汁飲之

一方雄黃末敷之沸汗出愈

解食肉過傷 本畜骨灰水服 生韭汁 芫荽煎

汁

解多食生齋不消胸膈不快 瓜蒂散吐之瓜蒂煎

赤小豆各等分爲末。每二錢溫漿水調下。取吐爲度。或飲薑汁卽消。若日久成癥病。

大黃、朴硝、陳皮各三錢。水煮頓服下之。

又方取水中石子數十枚燒赤。投五升水中七次。卽熟飲之。三五度當利出瘕。

又狗屎燒存性爲末。和酒服二錢。日三服。瘕結卽出。

解食鴉鵂肉毒。糯米泔或溫酒飲之。

又穉米水研取汁飲一盞。

一方猪蕒燒爲末。每一錢水送下。

解食婢肉毒。吐下。用犀角末和水服一錢。或以水

救急備用經驗方

卷三 統治門

羈

濃磨取汁飲

解食鴉鵂毒。葛粉二合。水調服。薑湯調服亦解。

解黃蠟炒鴉毒。青葉湯。冬葵子湯。大蘇子汁。

波菱菜湯。俱可解。若未解下時止。可飲清水。

斷不可食有質有味之物。

解食鴉子毒。好醋飲之。卽愈。未愈再服。

解食魚毒。覺胸腹煩亂。陳皮濃煎汁冷服之。卽解。

飲冬瓜汁最驗。又海螵皮煮汁飲之。又鮫魚皮燒

灰和水服之。檳榔搗汁服亦佳。

魚無腸膽。戒食。

解中蠶毒 飲藍汁數碗或靛青水亦可

食蟹肉誤食芎菜成蠶腹脹速飲白馬尿一碗卽化。

解中蟹毒 紫蘇葉濃煮汁飲之。或紫蘇子汁飲之。或搗藕汁。或搗蒜汁飲之。或冬瓜汁。或食冬瓜俱可。又黑豆汁。豉汁並解之。蟹有獨熬蟹目相向足斑目赤不可食。未遇霜不可食。

解食鱗魚。龜。鼈。蝦。蟻。自死禽獸等毒 淡豆豉一合新汲水煎濃溫服之。食鱗中毒食蟹解之。

救急備用經驗方

卷三

統治門

重

解食鱸魚。鰕。鮓。毒 蘆根煮汁飲一二升。生汁亦可。解黃鱔魚毒 食此犯荊芥能害人服地漿水解之。

又食蠪解之。

解食河豚毒 五倍子 白礬等爲細末水調服之。

或鮮蘆柴根搗汁飲之。乾者煎汁溫飲之。卽消。如倉卒無藥。急以清油多灌之。使毒盡吐出卽愈。

忌見芎灰多服金汁卽解。如難得于地上挖一潭用水和泥稍定服一二碗卽解。或紫金錠見分治門。治諸脾更妙。急取熱鴨血灌救。入喉卽活。橄欖汁。或發血更妙。白茅根搗汁冷飲亦愈。

又羊蹄葉搗取汁飲之其子尤毒慎不可食

或香油一碗灌之吐出亦愈

或入糞汁多灌吐卽愈

解飲食中蜈蚣等毒 舌頭脹腫以鷄冠血生飲之

傷損則用血塗上

祛蜈蚣法 凡人家多蜈蚣以頭髮常燒烟或床

下或廚房聞之入土三尺

解食物中蛇虫百脚遊過毒 甘草煎湯灌下吐十

餘次愈

一方以蒼耳草嫩葉取汁灌之

救急備用經驗彙方

卷三

統治門

夏

毒入腸者一方以兩刀相磨取磨下之汁服

一方用益母草煎服

解中蚯蚓毒 形如大麻風鬚眉皆落一方用石灰

泡熱水候涼洗患處浸之良久愈

解食小蝦蟇毒 小蝦蟇有毒食之令人小便秘澀

臍下悶痛有至死者

一方以生豉一合投新汲水半盞浸濃汁頓飲之

卽愈

解食螞蝗 嗜芹菜者多此疾空心時食地泥少許

自下

解中豆腐毒

過食豆腐腹脹氣塞欲死

將清水

多飲卽安。若飲酒卽死。中豆腐毒。令人生瘡。噎氣。遺精白濁。蘿蔔煎湯飲之。

又杏仁水研取汁飲之。

解中麪毒

以蘿蔔生啖之。或搗汁服之。麥麪大熬。

惟蘿蔔能解其性。或大蒜嚼食之。亦善解麪毒。又

地骨皮煮取汁飲之。又赤小豆末和水服卽愈。

解鹽鹵毒

服鹽瀉。將常用擦桌布洗水灌之。使吐。

卽解。急取活鴨或鷄斬去頭。將頸塞口中。以熱血

灌之。可解。若齒多者。必數隻。方足盡收其鹹毒。

救急備用經驗方

卷三

統治門

夏

一方豆腐漿灌之。或肥皂水皆能令嘔吐。切不可飲熱湯。飲治卒血尤妙。

一方黃豆入水搗汁灌之。或用生大黃一兩搗碎。

再用生豆腐漿一碗同搗數十下。服後瀉數遍。卽效。

解中酒毒

經日不醒。謂之中酒。黑豆一升煮汁溫

服一盞。不過三盞卽愈。或鍋蓋上氣水一杯灌下。

卽醒。或白蘿蔔汁。或熱尿灌俱效。

一方葛花

錢五

赤小豆

紫豆粉

柿霜

各三

白豆

薤二生薑汁同煎服。令汚泥搭胸。前項卽再搭自

愈

過飲燒酒中毒 則面青口燥昏迷不醒初覺便脫衣推身滾轉之無數吐之即甦若灌冷水即死又葛根搗取汁灌口中漸愈而甦

鮮烟毒 砂糖調水服

鮮中砒霜毒 一方砒霜服下未久者取鷄蛋一二十個打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之吐則再灌吐盡便愈但服久砒已入腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一塊用井水于石上磨出黑汁旋磨旋灌盡則愈即先吐出之後亦宜再鉛水服之以

救急備用經驗方

卷三 救治門

夏

盡餘毒方無後患

發狂心腹絞痛頭眩嘔吐面色青黑四肢逆冷六脈洪數飲食中得者為易愈若空心酒醋服者難救地漿水頓服若吐出又服所謂洗淨腹中毒全憑地上漿是也其法掘地成坑以水灌注攪成混水飲之謂之地漿

又方蠶清濯之亦解

又方豆豉濃煎湯飲之可解

又方熟豆腐漿灌之亦效

一方雄鷄血熱飲止愈

一方萊豆半升搗粉入新汲水攪和去渣取汁飲之解砒毒第一

一方白洋糖、靛花、淡豆豉、甘草等分研勻冷水調灌卽甦

一方新鮮羊血鴨血飲之皆可解

一方甘草同藍汁飲之卽愈

一方急用密陀僧一兩或二兩研細冷井水飛徐徐灌下或吐或瀉則砒信裏在藥末內出矣神效無比或外再以井底泥塗胸前或以生蠟或用田搗塗臍四旁更妙

救急備用經驗靈方

卷三 統治門

夏

一方白蠟三錢研末調鷄子清三五枚入口卽愈解人信毒用藜蘆根、青黛、皂莢、膽礬、若瓜蒂、滑石、甘草、生萊豆各等分搗末涼水調灌凡中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青肢冷用防風四兩煎湯飲之卽解

一方桐樹葉搗爛沖生白酒飲之卽解

一方楊梅樹皮煎湯二三碗飲之卽愈

一方紫蝴蝶花根搗汁一碗灌下立愈

一方生桐油灌之得吐卽解

一方冬青樹葉汁與水相半灌下無苗時用老葉

帶水搗取汁

一方用甘草湯。萊豆湯。夏枯草汁。或鷄子五六枚。打碎和勻灌下。總以吐盡毒爲度。醒後仍顛者。以萊豆湯飲之。毒盡自愈。

一方用白礬三錢。新汲水化下。吐出卽愈。

一方或香油一二升灌服。又扁豆。青黛。甘草。各一錢。巴豆去殼一箇。一云半箇爲末。砂糖大一塊。水化調一盞飲之。毒隨利下。又稻稈灰和水淋取汁。冷服一碗。毒隨利下。又藍根砂糖搗和水服。

一方醬調水服。若在胸中作楚。急用臙攀研水灌

救急備用經驗方

卷三 統治門

夏

之。或用真萊油灌之立解。

一方防風一兩。研爲末。水調服之。

與前方分兩服法小異

解食胡粉毒

一方上號絮白糖。旋花。淡豆豉。甘草。

等分研勻。冷水調灌卽甦。

一方砂糖調水服。

一方肥皂搗爛。取汁灌下。皆效。

一方急用大黃。枳實。土茯苓。陳醬。水煎。加焙乾雄

猪屎入藥中服。

一方飴糖四兩。硫黃五錢。研末入猪腸中。兩頭紮

紮用好陳酒并水放瓦罐中。火煮一時。取出再煎。

餽補藥硫黃和勻爲丸如梧子大每服二十丸溫水或甘草湯下。若有香油調鉛粉服者肥皂水下。

一方生甘草四兩。豨豆二升。湯煎濃。時時服之。

一方木瓜煎水飲之。

一方生薑薑汁食之。

服水粉牙根腐爛出血不止。一方管仲名貫黃連

各五錢爲末。水一鍾煎四五沸。入水片少許攪勻。漱

口。每日一次。忌豬腥油膩一月。

一方麻油和蜜糖食之。亦能解水粉毒。

解礬石毒。一方黑豆煎汁飲之。

救急備用經方
卷三 統治門
臺

解服丹毒。一方地漿服之爲上。

一方蚌肉食之良。

鮮食輕粉毒。一方用黑鉛五斤。打壺一把。盛燒酒

十五斤。納土茯苓要白半斤。乳香三錢。封固。重湯

煮一日一夜。埋土中出火毒。每日早晚任飲數盃。溺

時以瓦盤接之。當有粉出。服至筋骨不痛乃已。

五寶湯。紫草。金銀花。山慈菇各一。乳香

各五錢。新汲水六碗。好陳酒五碗。煎至六七碗

空心溫服。取汗不可見風。一二服。其毒從大小便

湧出。

一方輟豬頭骨槌碎土茯苓春碎金銀花各一斤
水煎服即愈。

解中冰片毒 飲以新汲冷水可解。

解硫黃毒 令人心悶。一方取豬羊熱血飲之。又宿

冷豬肉及鴨肉羹冷食之。又黑錫煎取汁飲之。

解礪砂毒 一方生萊豆研取汁一二升飲之。

解中巴豆毒 下利不止。口乾兩臉赤。五心熱。炮

薑 用連分爲末每服二錢水調服如人行五里

許再服。或者萊豆湯冷服之。或川連甘草煎汁涼

飲之。或芭蕉葉根搗汁飲之。或以大豆一升煮汁

救急備用經驗集方

卷三

統治門

薑

飲之。又巴豆畏大黃黃連蘆筍蕪荊黎蘆各煎冷
服皆能止瀉。

一方冷粥一碗喫下即鮮。

一方黃連黃柏煎湯冷服。又黑豆煮取汁飲之。又

寒水石磨水服之。又菖蒲或葛根搗取汁飲之。更

以冷水浸手足忌食熱物。又藍根砂糖搗爛和水

服。

鮮食桐油嘔吐不止 將乾柿餅食之立鮮。急飲

熱酒即鮮。

鮮食閉口椒毒 口吐白沫氣閉欲絕。冷水飲之鮮。

地漿水更妙。或食蒜或肉桂煎汁飲之。或者澹豆豉飲之。或喫大棗三枚解之。又濃煎黑豆汁飲之。又人屎飲之。或飲醋解之。

鮮食薑中毒。忍冬、花葉亦名金銀花葉生啖之。或煎濃汁飲之。或人糞汁飲一升。或地漿飲一二升尤效。或大豆濃煮汁飲。服吐利藥並解。飲地漿水三四碗。地漿能解百毒。真神方也。又馬蘭根葉搗取汁服之。又人頭垢和水服。以吐爲度。又六畜及鴛鴨之屬。刺取熱血飲之。又油煎甘草冷飲。只多飲香油亦可。中草毒吐下不止。細芽茶爲末。新

救急備用經驗方

卷三 救治門

重

汲水調服神效。又荷葉搗爛和水服。鰲頭煮汁飲即愈。

凡菌蕈如夜中有光者。欲爛無虫者。若不熟者。汁照人無影者。上有毛。下無紋者。仰捲赤色者。俱毒殺人。

六一散。滑石六錢。甘草一錢。研勻。每服二錢。水調服。皆效。

鮮食芹菜毒。蛇嗜芹。人中其毒。手背腹滿。痛不可忍。用米糖二三斤。日兩度服之。吐出如蜥蜴三五枚。擦。

一方田中泥土爲丸服之治食岸菜蝸蝗入腹作痛。

鮮食楓菌毒 令人笑不休 一方飲地漿卽解。

一方飲冬瓜蔓汁解之。

一方苦菜白礬新汲水服之。

一方飲糞汁亦可解。

一方採生金銀花嚼之可解。

鮮中野芋毒 食之令人小便秘澀 臍下悶痛有至死者。

一方以生豉一合投新汲水半碗浸濃頓飲之卽

救急備用經驗藥方

卷三 統治門

夏

愈。

鮮中英雄毒 一方甘草黑豆濃煎飲汁。又防風甘

草湯冷飲之。又棗肉飴糖服之並解。又乾薑煮汁

冷飲之。又多飲井水大吐瀉卽愈。

鮮食滑子毒 頭腫唇裂血流或見內熱諸證急用

裝豆黑豆搗汁常飲或大豆汁飴糖裝湯並解之。

或用螺搗碎絞汁水調飲之。

鮮中烏頭草烏毒 令人麻痺壅悶甘草煎濃湯服

之或飴糖黑豆冷水解之或米醋調砂糖亦可甘

豆湯飲之生薑汁飲之又童尿飲之又黃連湯飲