

實神麩若因肉食所致更加山查若因魚鱠之類再
加陳皮其物既消而仍痞或反作痛作嘔此脾胃受
傷用六君子湯或噍酸變腐加炮薑作瀉更加升麻
如不應佐以四神丸或間用補中益氣湯 一婦人
食角黍煩渴痞悶腹痛大便欲去不去服消導之藥
不應飲食日減肌體日瘦半年矣余謂此食積爲患
用大酒麩炒爲末溫酒調服貳錢俄而腹鳴良久仍
下糝而愈 一婦人食魚鮓腹痛患痢諸藥不應
用陳皮白朮等分爲末以陳皮湯送下數劑而愈

見現丸

薑黃炒

三稜醋炒

萹澄茄

陳皮去白

良薑

人參

蓬莪茂酒炒各等

右為細末用蘿蔔搗爛絞取汁煮麵糊丸如梧子
大每服叁拾丸蘿蔔湯下白湯亦可

大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 西...

... 子... 年... 本... 出... 海... 信... 佛... 願... 殊... 凡... 十... 蒸... 酸... 麻... 衣... 破... 垂... 下...

... 大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 西...

... 大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 西...

... 大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 西...

... 大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 西...

... 大... 天... 任... 次... 數... 備... 萬... 生... 白... 滋... 液... 西...

腹脹

郭產後腹脹滿悶嘔吐不定者何荅曰敗血散於脾
胃脾受之則不能運化精微而成腹脹胃受之則不
能受納水穀而生吐逆醫者不識若以尋常治脹止
吐藥治之病與藥不相干轉更傷動正氣疾愈難治
但服抵聖湯則愈

薛前證若敗血傷於脾胃宜用
前方若飲食停於脾宜用六君子厚朴若飲食傷於胃
宜用六君子湯大凡損其脾者當節其飲食為善

一產婦患前證或用抵當湯敗血已下前證益甚小
腹重墜似欲去後余謂此脾氣虛而下陷用補中益

氣湯加炮薑温補脾氣重墜如矢又用六君子湯而

安

抵聖湯入生薑半兩焙乾水煎

方見胎前腹脹云此方最宜用

局方平胃散加人參亦可

扣藥余之疾與藥不卧不轉更趨便五歲幾愈藥合

詣受內木遠而中扣逆習者不痛若以尋常合則止

胃輕受之限不詣雖少辭過而效顯

蓋對則則則則則則則則則則則則則則則則則

則則

水腫

郭產後四肢浮腫者敗血乘虛停積循經流入四肢
留淫日深却還不得腐壞如太故令面黃四肢浮腫
醫人不識便作水氣治之凡治水多用導水藥極虛
人夫產後既虛又以藥虛之是謂重虛往往多致天
枉但服小調經散血行腫消則愈 陳無擇曰產後

浮腫多端有自懷妊腫至產後不退者亦有產後失
於將理外感寒暑風濕內則喜怒憂驚血與氣搏留
滯經絡氣分血分不可不辨要當隨所因脉證治之
宜得其情小調經散治血分固効但力淺難憑不若

吳茱萸湯枳朮湯奪魂散大調經散皆要藥也 又

論曰夫產後勞傷血氣廢理虛則為風邪所乘邪搏

於氣不得宣越故令虛腫輕浮是邪搏於氣氣腫也

若皮膚如熟李狀則變為水腫氣腫者發汗即愈水

腫者利小便差也 潔古如產後風寒在表面目四

肢浮腫宜局方七聖丸白湯下日加以利為度 如

浮腫至膝喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也 如浮

腫又頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也 如只浮腫

止七聖丸本方服 東垣中滿分消丸 雜病用四物 脹滿

吞之 丹產後腫必用大補氣血為主少佐以

木茯苓使水自利薛前益若寒水侮土宜養脾肺

若氣虛浮腫宜益脾胃若水氣浮腫宜補中氣當參

雜證本門主論 一產婦飲食少思服消導之劑四

肢浮腫余謂中氣不足朝用補中益氣湯夕用六君

子湯而愈後因怒腹脹誤服沉香化氣丸吐瀉不止

飯食不進小便不利肚腹四肢浮腫用金匱加減腎

氣丸而愈 一產婦泄瀉四肢面目浮腫喘促惡寒

余謂脾肺虛寒用六君加薑桂而泄瀉愈用補中益

氣而脾胃健 杜張宣徽侍寵產後半月忽患浮腫

急召產科醫治經半月不差病勢轉劇召杜治之杜

至曰諸醫作何病張曰蓄云水氣浮腫杜曰非也且
 水氣發咳漱小便澁是也今愛寵小便不澁不作咳
 嗽惟手足寒為血藏虛氣塞不通流面生浮腫遂用
 益血和氣藥治之旬日病去七八經半月全愈所用
 之藥乃靈苑方牡丹散也其方云治血藏風虛冷全
 產科家多用此藥治產後諸病如神更名損金湯者
 是也牡丹散 一婦產後四肢浮腫寒熱往來蓋因
 見血暈

酸水兩脇疼痛遂用旋覆花湯微汗漸解頻服小調
 經用澤蘭梗煎湯調下腫氣漸消

大調經散

治產後腫滿喘急煩渴小便不利方見

寒熱

小調經散

沒藥

琥珀

桂心

芍藥

當歸

細辛

麝香

各半錢

各壹錢

右為細末每服半錢薑汁温酒各少許調停服

出婦人經驗方

乾漆

大麥蘖

等分

右各為細末以新瓦罐子中鋪一重麥蘖一重乾

漆如此填滿用鹽泥固濟火煨通赤放冷研為散

但是產後諸疾熱酒調下貳錢

氣

經云產後肌浮柑皮酒服

搗皮為末每服貳錢酒調

白木湯

治心腹堅大如盤邊如旋盤水飲所作名

曰氣分

枳實

壹兩半

白朮

叁兩

右咬咀每服肆錢水壹盞半煎至柒分去滓溫服
腹中爽即當散也

丹婦人產後浮腫小便少口渴惡寒無力脉皆沉此

體虛而有濕熱之積必上焦滿悶宜補中導水行

氣可也

白朮 貳兩半

陳皮 壹兩

川芎 半兩

木通 陸錢

茯苓 叁錢

右用水煎下與點丸貳拾伍丸

黃芩為末粥丸名與點丸亦名清金丸

奪魂散 治產後虛腫喘促利小便則愈

生薑 叁兩 取汁

白麩 叁兩

大半夏 柒枚

右以生薑汁搜麩裹半夏為七餅子煨焦熟為末水調壹盞小便利為効

張氏方治產後血虛風腫水腫

澤蘭葉

防已 等分

產後水腫

女科五

卷五

右為末每服貳錢溫酒調下不飲者醋湯調亦可

漢防已散

此藥虛人戒服

漢防已

豬苓

枳殼

桑白皮

各壹兩

商陸

甘艸

各半錢

右為粗末每服肆錢水壹盞半薑參片煎至柒分去滓空心溫服

七聖丸

雜病大便不通

加減吳茱萸湯

治婦人臍氣本虛宿挾風冷胸膈

滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡

寒戰慄或泄瀉不止少氣羸困及因生產藏氣暴

利小便便石風

積聚

血瘀卽兒枕宜參看

大夫積者陰氣也五臟所生聚者陽氣也六腑所成
皆由飲食不節寒熱不調致五臟之氣積六腑之氣
聚積者痛不離其部聚者其痛無有常處所以然者
積爲陰氣陰性沉伏故痛不離其部聚爲陽氣陽性
浮動故痛無常處產後血氣傷于臟腑臟腑虛弱爲
風冷所乘搏於臟腑與血氣相結故成積聚癥塊也
薛前證乃真氣虧損邪氣乘之况產後得之尤當
固真氣爲主若求旦夕之効而攻其邪則速其危矣
當參前雜證積聚諸方論治之一產婦腹中似有

腹或下攻小腹發熱晡熱惡寒肌膚消瘦飲食無殊類瘵證久而不愈余謂肝脾血氣虧損用八珍湯逍遙散歸脾湯隨證互服而愈

天新產後有血與氣相搏而痛者謂之痲痲之言假也謂其痛浮假無定處也此由風有風冷血氣不治至產血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水輕則否澁重則不通也

薛前證乃寒邪乘

客氣血壅結此因氣病而血病也當補養胃氣調和月經寬緩靜養爲善難經云任脉之病男子爲七疝女子爲瘕聚當參前後各論治之

丹南山婦人年三十八於九月二十三日月經行比
前過後十日得草藥以敗血海為下胎之謀有數滴
血下因此腹痛在小腹下有塊如碗大不可按湯熨
則痛稍定大小便抽痛小便澀大便略下少赤積垢
食不進口略渴發熱此胃氣為草藥所敗加以受傷
之血妄行而不得洩所以為病也

砂仁

甘艸 炙

川芎

黃芩

各參分

滑石

壹錢半

牛膝

貳錢

桃仁

柒粒

右水酒煎服

芍藥湯

保命

治產後諸積不可攻宜養陰去熱其病自