

雜病篇

癰疽下

諸瘡

東醫寶鑑

十六

東醫寶鑑雜病篇卷之八

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許遜素教撰

癰疽下

腸癰腹癰

關元欲屬小腸天樞欲屬大腸丹田欲屬三焦其穴分隱痛者為疝上肉微起者為癰也

靈

○腸癰為病小腹腫而強按之則痛小便數似

淋

時時汗出發熱而復惡寒身皮甲錯腹皮急如

腫

狀甚有腹脹大轉側有水聲或遠臍生瘡膿從

瘡

出或有出臍中者惟大便下膿血者自愈○從

濕

熱鬱積腸內成癰脉遲緊者宜大黃牡蠣湯或

五

香連翹湯上方見下之脉乳澁者四物湯加

桃

仁紅花玄胡索木香脉洪數者三仁湯小腹痛

尿

澁者膿滯也宜牡丹散○腹皮急按之濡身疼

無

熱乃陰冷所成宜牡丹散或內托十宣散加灸

苓

甚者敗醬散小腹痞堅按之痛身有熱乃結熱

所

成宜大黃牡丹湯或桃仁承氣湯熱下利去

附

○腸癰冷熱證雲母膏為九牛膝湯吞下利去

痰膿即愈或蠟蟻元亦佳坊見C腹痛甚者是也治法

同腸

脉法

腸癰難知脉滑可推數而下熱腸癰何疑逢緊未

而數知當屎膿也辨O腸癰之脉滑而數滑則為

實數則為熱滑則為榮數則為衛衛數下降榮滑

大黃牡丹湯

治腸癰脉逢緊膿未成可下之大黃芒

錢半右剉一作一貼水煎服有冬芥仁無瓜蒌仁神效

針

三仁湯

治腸癰中病痛縱非癰疑似問便可服薏

錢右剉一名薏苡湯

牡丹散

治腸癰冷證腹軟而痛時下膿血牡丹皮人參天麻白茯苓黃芪薏苡仁地仁白芷當歸

川芎各一錢官桂甘草各五分木香三分右剉作一貼水煎服

敗醬散

治腸癰身無熱腹濡冷薏苡仁二錢半敗醬一錢半附子炮五分右剉作一貼水煎服小

便膏下膿血而愈附子敗醬散

黃黑散

治腹內癰腫大黃一兩取末四錢半破故紙一兩取末二錢牛蒡子一兩取末一錢黑牽

牛子一貼蜜水調空心服以利為度

腸癰治驗

一婦人腹痛百方不效孫兆診曰腹痛脉當沉細今反滑數此腸癰也雲母膏作丸溫

酒吞下服一兩下膿血而安

臂癰

傷於風者上先受之宜服白芷升麻湯

白芷升麻湯

治臂癰黃芪酒黃芩各四錢生黃芩三錢白芷一錢半升麻桔梗連翹各一錢

酒紅花甘草各五分左右剉分二貼每取一貼酒水各半煎服

醫癰

其位居小腹之後又在於下此陰中之陰也其道遠

可生癰繞有腫痛衆之脉證但見虛弱便與滋補氣血可保終吉若用尋常驅熱舒氣之藥虛虛之禍如指諸掌○醫癰初起未成膿者隔蒜灸再用葱熨法欲作膿者內托羌活湯痛甚者仙方活命飲見腫硬者托裏消毒飲見潰後宜加味十全湯方見尻醫癰生癰堅硬腫痛宜內托羌活湯方見

懸癰

穀道前後生癰謂之懸癰此病生穀道外腎之間初發如松子大甚痒漸如蓮子數十日後始覺赤

腫如挑子即破若破而大小便皆從中出者爲難治宜服國老膏○此疾首尾常服國老膏雖患亦輕雖潰亦淺誤用寒涼則不可救○初起作痛尿澁者仙方活命飲方見去大黃服之膿已成者急鍼之灸成漏者加味十全湯方見蠟礬元坊見○穀道中生瘡取不中符藥細搗綿裹納下部日

三即愈

國老膏

治懸癰橫紋大甘草帶節一兩四寸切以山

午乾則投前水再炙直待水盡看甘草中心潤透

為度細剉好酒二升煎取一升空心中隨量飲之

日一服二三日可保無虞此藥雖不即消過十日

便癰

俗名便毒實血疔也一名野馬經多血故又各名血

疔或先有疔瘡而發或卒然起發發皆熱

托裏內補之藥也○便毒處所上不在腹下不在

間或一腫痛或左右兩邊俱發先用五苓散貼

方活命飲或雙解散復元通氣散貼之○便癰甚有仙

散壯癰大黃湯千金內消散黃黑散五香連翹湯

三坊消毒飲玉燭散神奇散○便毒初起射干三大安芽一

箇研細熱酒調下○便毒初起射干三大安芽一

如指大搗細順流水煎服以瀉為度因用阿膠醋

蓋一塊蘸米醋磨取千步峯泥付腫處即消又生

消千步峯即人家行步地上高塊是也

蘇方散治便癰木鱉子當歸尾赤芍藥蘇木甘草各八

分右剉作一貼酒

水各半煎服

牡蠣大黃湯治同上大黃牡蠣各二錢半甘草一

錢黃瓜萋一箇右剉作一貼水煎服

消毒飲治便毒三四日可消皂角刺金銀花各一錢三分右剉作一

貼水酒各半煎服仍頻

提掣頂中髮立效

玉燭散治便毒腫痛大黃芒硝各二錢川芎當歸赤

芍藥生地黃甘草各一錢右剉作一貼水煎

服

神奇散

治便毒魚口瘡喉疳噴嚏壯癰大黃各三錢黃連黃芩黃柏金銀花連翹各一錢半穿

山甲三片土炒木鱉子三箇去殼黃蠟三兩右剉分作二貼酒水各半煎服

雙解散

治便毒大黃黑丑炒頭六各一錢甘草七分右剉作三貼薑五片水煎服空心先小便快是熱

從小便出也後大便利皆是小便快是熱

囊難

者濕熱下注也後大便利皆是小便快是熱

也或有因腹腫漸流入囊腫甚而囊自裂開

懸掛水出以麩炭末付之囊外以紫蘇葉包裏仰臥

養之○用補陰藥佐之雖膿潰皮脫以濕熱入肝經

附骨疽

附骨疽與白虎飛尸痛按之則硬止附骨疽則

痛深按其腐潰碎骨出盡方愈然則同是一病但淺

深不同耳。○附骨疽，筋骨之內痛，如錐刺，外則全無赤腫，突起，初因露風，冷或寒，涼浴寒濕，而為膿，膿成，即不能轉，寒熱無汗，經久寒，鬱為熱，變宜漏蘆飲，子五香連翹湯，坊見，疎下之，次用內消升麻湯，在尻，醫宜內托，羌活湯，坊見，在腿，內消防已湯，在腿，外托，裏黃芪湯，黃連消毒飲，坊見，潰後久不愈，宜蟾蜍膏，赤元平肌散，門。○初起，大痛，而肉色不變，名附骨疽，三生散，最妙，無用青皮甘草，節二味，煎服。○骨疽，與緩疽，石疽，賊風，而相類，宜辨之。

緩疽石疽賊風

其緩疽，石疽，皆寒氣伏於骨髓之間，肉俱爛，故名曰緩疽。○腫與皮肉相似，突而堅硬，如石，故謂之石疽。生商陸根，搗爛，和鹽，少許，塗付。

日一換，即軟。○賊風，白風，邪搏於骨髓，故其痛亦徹骨，遇寒則甚。○證惡寒，有汗，痛處常欲熱，熨失治，則變為癰，曲偏枯。○緩疽，石疽，宜服補虛托裏溫熱之劑，或風宜服越婢湯，疎通之，劑門。

始發預防法

環跳穴痛不已，防生附骨疽。急用青草

貼又不效，恐成急下。地坑以火燒紅，以小便氣熏，而愈。

漏蘆飲子

治附骨疽初起，宜服他惡瘡初起，亦可服。

麻赤芍藥，朴硝甘草各一錢，右剉作一貼，水煎服。

內消升麻湯

治附骨疽疎下後，服此大黃升麻當歸黃芩赤芍藥，枳實各一錢，半甘草一錢。

水煎服，精一貼。

羌活防己湯

治附骨疽發於太陽，陰分者，羌活防己，各一錢，二分。

羌活防己湯，治附骨疽發於太陽，陰分者，羌活防己，各一錢，二分。

托裏黃芪湯

治附骨疽發於少陽，陽明分者，當歸尾一錢，七分，紫胡一錢，半白芷一錢，二分。

分連翹鼠粘子肉桂黃芪各一錢黃柏升麻
甘草各五分右剉作一貼酒水各半煎服

蟾蜍膏治附骨疽久不收膿汁大敗壞或骨從瘡口出
脂煎二物令凝去滓凝如膏貼之先以桑白

皮烏豆煎湯淋洗瘡口拭乾然後却貼之

赤木元椒附骨疽久不收赤木一香破故紙川練子

炒赤茯苓白芷桃仁各一兩右為末蜜丸梧子大溫水下百丸

平肌散治附骨疽成漏久不合老狗頭骨煨露蜂房

右為末入輕粉麝香各少許濕則乾糝乾則油調付之

三生散治附骨疽及瘡口久不合神驗露蜂房酒調

下

青草蒼栢湯治附骨疽治作宜預防青皮一錢半甘

流注骨疽

如貼水煎和薑汁三匙空心飲之冬
加桂枝夏加條芩
流注者行也注者住也或結塊或慢腫皆因素

而發多生四肢或胃腹腰臂關節之處初起宜葱
熨法防見實者十六味流氣飲以二陳湯三
痰元氣自潰若潰後久不飲宜以托裏烏三
自消自潰若潰後久不飲宜以托裏烏三
豆豉餅藥珀膏藥未盡遺毒於四肢經絡
起於傷寒傷寒流注也蓋流注者傷寒之餘毒
滯而後為流注也蓋流注者傷寒之餘毒
流注之敗證也○蓋流注者傷寒之餘毒
腰腿手足聚結腫硬或痛或不痛按之無膿或有薄
或有微紅亦淡薄不熱堅如石破之無膿或有薄
血或出清血或如紫汗又有壞肉如敗絮或又如
瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不硬破之
亦無膿血鹹口努肉突出惟覺咽疾痰塞作寒作
熱榮衛返魂湯主之○醫出骨疽者由瘡潰後氣血
不榮骨自脫出膿水腐潰碎骨出盡方愈蓋人身
有正骨附骨傳合成形附骨出則愈後如常正骨

腐出則為終身廢疾隨腫硬之處潰後久不愈則
必出碎骨外用附子餅灸或葱熨法祛散寒邪補

接榮氣自斂矣

榮衛返魂湯

主治一切痰飲為患專治痰腫又治癰疽

烏枳殼茴香烏藥當歸甘草各一錢五分剉作一貼
酒水各半煎服

散又名何首烏散此方宜與十宣散相間用之並
加忍冬藤

此藥大能順氣勻血自然榮衛通順不生癰疽
合內疽

半夏腫毒堅硬不穿加附子實加大黃痰盛加南星
甲流注獨活流注者氣血凝滯加獨活則可以

動一身血脉既動豈復有凝注乎
治流注癰疽發背至於救藥病活死肌

萌之血前拔振調陽不愈之後大能順氣勻血蓋氣陽
也血陰也只調陽不陰則氣耗而凝肌必不活

如五香連翹之類是也只和陰不調陽則血旺而
氣弱病必再作如內補十宣之類是也此藥無之

真神仙妙劑也

疔疽

發於足上下名曰四流其狀大癰不急治之百日死○發於足上名曰四流其狀大癰不急治之百日死○發於足上名曰四流其狀大癰不急治之百日死○

急治之六其黑者不消輒益不治百日死○發於足上名曰四流其狀大癰不急治之百日死○發於足上名曰四流其狀大癰不急治之百日死○

死治之○不寒急斬之否則死○如釘蓋故謂之疔近世多見因食自死或牛馬禽獸之肉而發或感襲天地

暴疹之氣而發或恣食辛辣厚味積毒而發其形有十三種治法皆同初起僅一小瘡殺人於一二

日之內比之癰疽尤毒又有紅絲疔魚臍疔其毒尤甚○疔瘡發無定處在手足頭面胃背骨節間最急其餘處為緩○

疔疽形證疔疽生黃疔中或紫黑色初發必先痒後痛先寒後熱四肢沉重頭痛心驚眼花若

疔疽形證

大重則嘔逆為難治○瘡頭黑硬如釘四畔帶赤如火盤根突起隨變焦黑未幾腫大而光轉為濕爛深孔透肌如大鍼穿之狀○外證心驚頭

痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間亦黑

痛拘急惡寒四肢痛強或寒熱交作頰舌間亦黑

點點如珠。或痛或不痛。只麻木寒熱。以中流火。

牙關緊急。時時驚惕。甚則嘔吐。喘急。以中流火。

疔疽治法

痛凡疔瘡。毒氣攻心。欲死。以鍼刺。瘡心。若無

血者。急刺。百會穴。痛有血者。下鍼。子若無血。以親

人熱血。代之。猶活。三四宜用。迴瘡。子若無血。以親

迴瘡。蟻酥。鉗子。迴瘡。又法。急以艾炷。灸之。鍼。疔。四

邊皆令血出。以迴瘡。鉗子。紅之。上用膏藥。貼之。因

服五香連翹湯。千金漏蘆湯。見上方。疎下之。若鍼之。

不痛。無血者。以猛火燒鐵。鍼通赤。於瘡上。烙之。令

如焦炭。取痛烏。效亦紅。前鉗子。經一。二日。膿潰。根

出。服托裏湯。散。以取平。復。精。○子。治法。急用飛龍。奪

命丹。或雄黃。九。下之。去其毒。熱。○見。三。元。以。慈。酒。發

活散。○實者。初服。賽命丹。坊。見。三。元。以。慈。酒。發

表虛者。服保生。鉗子。以解。毒。○獨。治。紫。金。鉗。返

魂丹。一。捻。金。神。效。奪。命。丹。塘。酥。丸。○獨。治。紫。金。鉗。返

還魂散。千金。消。毒。散。選。用。

紅絲疔

疔瘡或有一條如紅線直上倉卒之際急用

青等膏

好否則紅線入腹必致危殆

紅絲至臍

有紅絲入喉

方不可保

生門

魚臍疔

又有一種瘡頭黑深形如魚臍疔其毒尤甚絲瓜葉

連鬚葱白韭葉各等分研搗如泥取汁以酒和服

其幸貼臍下如病在左手貼左臍下在右手貼右

臍下在左腳貼左臍下在右腳貼右

臍并以帛縛三候肉下紅絲皆白則安矣或蛇退

燒灰雞子清毒丸付內

服神仙解毒丸

脫疽疔

內經曰膏粱之變足主大疔蓋因膏粱酒色

經所謂發於足傷名曰脫疽發於足指名曰脫疽

其狀赤黑者死不治治不裹急斬之否則死正謂

此也謂之脫疽以其指節潰爛脫去也。輕者色赤自潰先用隔蒜灸內服仙方活命飲。坊見還魂散重者色黯不痛先用隔蒜灸更服賽命丹。及無名異煎則割否則黑。延上一勺看瘡大小剪。夢葉則斬在肉則一沸入川椒。一足必死。外治用桐油。

以此內同煎浸七日後單

一方

治蛇疔疽危篤一二服即愈。輕者一服效。土蜂窠蛇蛻全者一條。右盛器中。黃泥固濟。火煨存。

性為細末。每一錢。空心好酒調服。少頃腹中痛止。而其瘡已化為黃水矣。因服五聖湯。端

疔疽死證

疔瘡含蓄毒氣突出寸許。痛痒異常。一二日間害人甚速。是尤在癰疽之上也。謹。

疔毒入心。則口乾煩悶。恍惚似醉。嘔吐不定。危。也。萬病解毒丹。蜘蛛金。以黃連當歸煎湯化下。或

賽命丹。淵然真。人奪命丹。皆可服。立待。疔毒入心。腹則煩悶。嘔逆。恍惚。眠其斃。可服。立待。也。疔毒入心。

瘡走黃。過心者難治。若太重。則嘔逆。疔疽出冷汗者。姑用乳粉托裏散。防見止之。疔。