

卷

拾玖
拾壹

拾伍
拾肆
拾叁
拾貳

第五本

新
增
全圖足本醫宗金鑑

海上

局書新啟

行發



南京中醫藥大學圖書館版權所有

御纂醫宗金鑑卷九

訂正仲景全書傷寒論註

辨合病併病脈證并治篇 傷寒有六經之證有六經之脈證脈井然不雜則可直指為某經之病若兩經三經陰陽混淆不可以一經名者或一經未罷又傳一經二經三經同病不歸併一經者則名曰合病或二經三經同病其後歸併一經自病者則名曰併病論中所著合病併病雖單舉陽經未及陰經然陽經既有合病併病則陰經亦必有之可知矣如太陽病脈反沉少陰病反發熱是少陰太陽合病也陽明病脈遲太陰病大實痛是太陰陽明合病也少陽病脈細而厥厥陰病嘔而發熱是厥陰少陽合病也是雖無合病之名而確有合病之實且三陽皆有發熱證三陰皆有利證如發熱而不利是陰陽合病也陰陽合病若陽盛者屬陽經則下利為實熱即論中所謂太陽陽明陽明少陽太陽少陽合病者是也陰盛者屬陰經則下利為虛寒即論中所謂少陰下利反發熱不死少陰下利清穀裏寒外熱不惡寒而面赤者是也蓋陽與陽合不合於陰為三陽合病則不下利而自汗出乃白虎湯證也陰與陰合不合於陽為三陰合病則不發熱而吐利厥逆乃四逆湯證也誠以人之藏府互根陰陽

相合三陽既有合併之病則三陰亦有合併之病不待言矣 太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之註一經未罷又傳一經二經三經同病而不歸併一經者謂之合病太陽與陽明合病者謂太陽之發熱惡寒無汗與陽明之煩熱不得眠等證同時均病表裏之氣升降失常故不下利則上嘔也治法祇須先解太陽之表表解而陽明之裏自和矣若利則宜葛根湯表而升之利自可止嘔則加半夏表而降之嘔自可除也集註成無己曰邪氣外盛陽不主裏則裏氣不和裏氣下而不上者但利而不嘔裏氣上逆而不下者但嘔而不利故以葛根湯以散表邪加半夏以下逆氣也

葛根湯方

葛根四兩

麻黃三兩

桂枝二兩

芍藥二兩

甘草二兩

生薑三兩

大棗二枚

右七味以水一斗先煮

麻黃葛根減二升去沫內諸藥煮取三升溫服一升覆取微似汗不須飲粥

餘如桂枝法將息及禁忌

葛根加半夏湯方

於葛根湯內加半夏半升餘依葛根湯法

方解是方即桂枝湯加麻黃葛根也麻黃佐桂枝發太陽榮衛之汗葛根君

桂枝解陽明肌表之邪不曰桂枝湯加麻黃葛根而以葛根命名者其意重在陽明以嘔利多屬陽明也二陽表急非溫服覆而取汗其表未易解也或嘔或利裏已失和雖歛粥而胃亦不能輸精於皮毛故不須歛粥也

集解柯琴曰

李杲定為陽明經藥潔古云未入陽明者不可便服豈二子未讀仲景書耶要之葛根桂枝俱是解肌和裏之劑故有汗無汗下利不下利俱可用與麻黃之專於發表者不同也

汪琥曰外臺方議問曰經云下利不可發汗發汗則脹

滿今此下利又發汗者何也答曰少陰病下利清穀者為裏虛若更發汗則脾虛而脹今太陽病未罷或有頭痛惡風寒等證尚在於表其脈尚帶浮便傳入陽明而有口渴身熱等證又自下利必須此方發散太陽之表以中有葛根能除陽明之邪也故諸證但發熱兼有裏而脈浮者此方最善○太陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯〔註〕太陽陽明合病不利不嘔者是裏氣實不受邪也若喘而胸滿是表邪盛氣壅於胸肺間也邪在高分之表非結胸也故不可下以麻黃湯發表通肺喘滿自愈矣

集註

喻昌曰兩經合病當用兩

經之藥何得專用麻黃湯耶蓋太陽陽明兩邪相合邪攻其胃不嘔則利故用葛根湯今邪攻其肺所以喘而胸滿麻黃杏仁者肺氣喘逆之專藥也

魏荔

形曰二經合病獨見證於胸肺之間喘而作滿此正二經之表邪為患不可誤認胸膈屬裏妄施攻下如大小陷胸之類也○太陽與少陽合病自下利者與黃芩湯若嘔者黃芩加半夏生薑湯主之註太陽與少陽合病謂太陽發熱惡寒與少陽寒熱往來等證並見也若表邪盛肢節煩疼則宜與柴胡桂枝湯而解其表矣今裏熱盛而自下利則當與黃芩湯清之以和其裏也若嘔者更加半夏生薑是清和之中兼降法也集註程知曰言太陽少陽合病下利宜用和法也曰太陽則尚有表證也然已見下利則入裏之熱已明故不解外而清內成無已云太陽陽明合病下利為在表當與葛根湯陽明少陽合病下利為在裏可與承氣此太陽少陽合病下利為在半表半裏非汗下所宜故與黃芩芍藥以和解之嘔者邪上逆也故加半夏生薑以散逆氣汪琥曰太少合病而至下利則在表之寒邪悉入而為裏熱矣裏熱不實故與黃芩湯以清裏熱使裏熱清而在表之邪自和矣所以此條病不但太陽桂枝在所當禁并少陽柴胡亦不須用也

黃芩湯方

黃芩三兩

甘草二兩

芍藥二兩

大棗十二枚

以上四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日再服夜一服

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯方內加半夏半升生薑三兩餘依

黃芩湯法

方解裏熱不和故自下利用黃芩清熱甘草和中得芍藥大棗其功倍焉熱

清裏和而利可止集解柯琴云因熱不在半表故不用柴胡熱已入半裏故

主黃芩加芍藥也非微弱胃虛不須人參若兼嘔者仍加半夏生薑可也陽

明少陽合病必下利其脈不負者為順也負者失也互相尅賊名為負也脈滑

而數者有宿食也當下之宜大承氣湯註陽明屬土少陽屬木二經偏裏故

合病必下利也陽明脈大少陽脈弦脈得大弦是為本脈宜黃芩湯清熱和土

兼瀉木邪利自止矣若脈單大不弦則為土不受邪其病易愈名為順也單弦

不大則為木來尅土其病難治名為負也令脈不大弦而滑數則知非土木為

害乃宿食為病之熱利也故不用黃芩湯而以大承氣湯下之也太陽陽明合

病下利表證居多故以葛根湯發之陽明少陽合病下利裏證居多故以大承

氣湯攻之太陽少陽合病下利半表半裏居多故以黃芩湯和之若非合病則

桂枝湯麻黃湯分主太陽之表五苓散抵當湯分主太陽之裏葛根湯主陽明

之表三承氣湯主陽明之裏小柴胡湯主少陽之表大柴胡湯主少陽之裏是

訂正傷寒論註合病併病篇

上海啟新書局發行

各有專司也 [集註] 張兼善曰凡合病皆下利各從外證以別焉夫太陽病頭

項痛腰脊強陽明病目痛鼻乾不得卧少陽病胸脇痛耳聾凡遇兩經病證齊

見而下利者曰合病也然兩經但各見一二證便是不必悉具 林瀾曰此節

是三證在內大承氣祇治得脈滑而數有宿食之證非並治上兩證也其脈不

負者雖下利而脈未至純弦也不言治法 陶華謂嘗以小柴胡加葛根白芍

治之取效如拾芥是也負者脈純弦也土敗但見鬼賊之脈不必治矣蓋雖同

是陽明之合病而有入經在府之殊安可以在經之際概歸之承氣乎○三陽

合病脈浮大上關上但欲眠睡目合則汗 [按] 浮大上之上字當是弦字始合

論中三陽合病之脈若是上字則經論中從無兩寸脈主三陽病之理 [註] 脈

浮大弦三陽合病之脈也浮大弦皆見於關上知三陽之熱邪皆聚於陽明也

熱聚陽明則當煩不得眠今但欲眠睡是熱盛神昏之昏睡也昏睡自然目合

熱蒸則汗自出也若施治得宜使邪還於表而解否則未可卜也宜以柴胡桂

枝白虎三湯酌其所當合而用之可也 [集註] 方有執曰太陽脈浮陽明脈大

關上乃少陽之部位故曰三陽合病 魏荔彤曰診其脈浮為太陽大為陽明

其長上於關上則弦可知矣弦又為少陽是三陽之經同受邪所以三陽之脈

同見病如此再諦之於證但欲眠睡非少陰也乃陽盛神昏之睡也及目合則汗出是陽勝爭於陰中之汗出也○三陽合病腹滿身重難以轉側口不仁面垢讞語遺尿發汗則讞語下之則額上生汗手足逆冷若自汗出者白虎湯主之〔註〕此承上條復詳其證以明其治也三陽合病者太陽陽明少陽合而為病也必太陽之頭痛發熱陽明之惡熱不眠少陽之耳聾寒熱等證皆具也太陽主背陽明主腹少陽主側今一身盡為三陽熱邪所困故身重難以轉側也胃之竅出於口熱邪上攻故口不仁也陽明主面熱邪蒸越故面垢也熱結於裏則腹滿熱盛於胃故讞語也熱迫膀胱則遺尿熱蒸肌腠故自汗也證雖屬於三陽而熱皆聚胃中故當從陽明熱證主治也若從太陽之表發汗則津液愈竭而胃熱愈深必更增讞語若從陽明之裏下之則陰益傷而陽無依則散故額汗肢冷也要當審其未經汗下而身熱自汗出者始為陽明的證宜主以白虎湯大清胃熱急救津液以存其陰可也

〔集註〕

汪琥曰或問白虎湯何以

能解三陽之熱答云病至自汗出則太少之邪總歸陽明矣安得不從陽明而專治之耶鄭重光曰三陽合病表裏俱傷也發汗偏攻太陽則邪併於陽明而讞語益甚攻下偏治陽明則額上生汗汗出不流手足厥冷必成亡陽之證

然則既不宜於汗下惟有白虎一湯兩解陽明表裏之熱若無自汗表猶未解尚不可用此條當與暍證參治也 二陽併病太陽初得病時發其汗汗先出

不徹因轉屬陽明續自微汗出不惡寒若太陽證不罷者不可下下之為逆如

此可小發汗設面色緣緣正赤者陽氣怫鬱在表當解之熏之若發汗不徹不

足言陽氣怫鬱不得越當汗不汗其人躁煩不知痛處乍在腹中乍在四肢按

之不可得其人短氣但坐以汗出不徹故也更發汗則愈何以知汗出不徹以

脈瀯故知也按當解之下熏二字當是以汗二字始與上下文義相屬

一經未罷又傳一經同病而後歸併一經自病者名曰併病二陽者太陽陽明

也太陽初得病時發汗汗出不徹未盡之邪因而轉屬陽明若續自微微汗出

不惡寒反惡熱始為陽明可下之證若不微微汗出而惡寒者則是太陽之表

猶未罷不可下也下之為逆矣如已經發汗尚有未盡之表宜仍與麻桂各半

湯或桂枝二越婢一湯小小發汗以和其表自可解也緣緣接連不已也正赤

不雜他色也謂滿面接連赤色不已也此由於汗出不徹故陽氣怫鬱不得宣

越所以其人煩躁短氣脈瀯不知痛處乍在腹中乍在四肢求之而不可得也

是皆邪氣壅甚於經漫無出路但坐以汗出不徹之故耳當更用大青龍湯或

葛根湯發其汗則愈矣按面赤一證勞損顙紅發於午後者骨蒸陰虛也格陽浮赤兼厥利脈微者陽虛也赤色深重潮熱便鞭裏實也赤色淺淡惡寒無汗表實也短氣脈濇內因多氣血虛若外因短氣必氣麤是汗出不徹邪氣壅促胸中不能布息之短氣非過汗傷氣氣之不足續息之短氣也外因脈濇必有力是汗出不徹邪氣壅滯榮衛不能流通之脈濇非過汗傷液液之不滋脈道之脈濇也集註王肯堂曰因病太陽故當汗因病陽明故當小汗先字最

有次第乃仲景之樞機也下之以大小承氣汗之以麻黃等湯程應旂曰太陽既轉屬陽明宜從陽明治矣然恐轉遞之處表邪去尚未盡裏邪乘其未深

兩邪相持而前後互見是曰併病縱使表少裏多終是帶表之陽明也太陽不應有腹痛以邪無出路意欲內攻故乍在仍不知其處林瀾曰汗不徹者脈必濇非再汗邪奚自去乎是知未汗則為併病已汗即為轉屬陽明未汗則為

陽氣怫鬱在表已汗則為汗出不徹汗不徹者必更汗之轉屬者必下除之未汗者可小發汗怫鬱者可解之以汗邪由不同為病自不同故施治亦不同耳

二陽併病太陽證罷但發潮熱手足絜絜汗出大便難而讖語者下之則愈

宜大承氣湯註二陽併病太陽陽明同病也太陽證罷盡歸併於陽明所以

訂正傷寒論註合病併病篇

但發潮熱手足熱熱汗出大便難而讞語也是皆陽明胃實之證故下之則愈
宜大承氣湯集註喻昌曰併病二條皆是太陽陽明上條初入陽明太陽之

邪未徹故仍宜汗之此條已入陽明太陽證罷而盡歸併陽明故宜下之程

知曰併病者一經證多一經證少有歸併之勢也太陽證罷而歸併陽明但手

足熱熱汗出是大便已鞭也與大承氣湯以下胃熱可也 太陽與少陽併病

頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭者當刺大椎第一間肺俞肝俞慎不可

發汗發汗則讞語脈弦五六日讞語不止當刺期門註太陽與少陽併病故

見頭項強痛或眩冒時如結胸心下痞鞭之證而曰或曰時如者謂兩陽歸併

未定之病狀也病狀未定不可以藥當刺肺俞以瀉太陽以太陽與肺通也當

刺肝俞以瀉少陽以肝與膽合也故刺而俟之以待其機也苟不知此而以頭

項強痛為太陽之邪目眩胸滿為少陽之邪發其汗兩陽之邪乘燥入胃則發

讞語設脈長大則猶為順可以下之今脈不大而弦五六日讞語不止是土病

而見木脈也名曰負負者尅賊也慎不可下當刺期門以直瀉其肝可也集註

方有執曰併猶合也彼此相兼合而有輕重多寡之不同謂之併蓋少陽間

隔陽明去太陽遠故但兼併也 喻昌曰少陽之脈絡脇肋間併入太陽之邪

則與結胸證似是而實非也肝與膽合刺肝俞所以瀉膽也膀胱不與肺合然肺主氣刺肺俞以通其氣斯膀胱之氣化行而邪自不能留矣發汗則讖語與合病木盛尅土之意同脈弦亦即合病內少陽勝而陽明負之互詞刺期門以瀉木邪之盛也 林瀾曰大椎即百勞穴一椎上陷中主瀉胸中諸熱氣第一間疑即商陽在手食指內側主胸中氣滿熱病汗不出肝俞在九椎下肺俞在三椎下各去脊中二寸二穴並主瀉五藏之熱期門在乳根二肋端主傷寒胸中煩熱過經汗不出 太陽少陽併病心下鞞頸項強而眩者當刺大椎肺俞肝俞慎勿下之

註

此承上條戒不可下之義也太陽少陽併病心下鞞而

眩者少陽也頸項強者太陽也當刺肺俞肝俞以瀉太陽少陽之邪慎不可下也若以心下鞞而誤下之必變逆候矣

集註

成無己曰慎勿下之攻少陽之

邪太陽之邪乘虛入裏必作結胸經曰太陽少陽併病而反下之成結胸 程

知曰上言不可汗此言不可下也不可汗恐其讖語不可下恐其結胸也 程

應旄曰此併病心下鞞居首頸項強而眩次之似尚可下不知少陽三法有禁

祇可刺而慎勿下也 汪琥曰大椎一穴實合太少而齊瀉諸家註皆不明用

鍼之理竟置大椎而不論大誤之極 太陽少陽併病而反下之成結胸心下

鞭下利不止水漿不下其人心煩註此承上條而言誤下之變也太陽少陽
 併病不利肺俞肝俞而反下之兩陽之邪乘虛陷裏則時如結胸竟成結胸矣
 心下鞭變為下利不止水漿不入矣上不入而下常出則中空無物其人心煩
 忙亂而變成壞證雖有前條刺法亦無所用矣集註程知曰此二陽併病誤
 下之變也太陽表邪乘虛入裏則為結胸心下鞭少陽半裏之邪乘虛入裏則
 為下利不止上下俱病而陽明之居中者遂至水漿不入而心煩也喻昌曰
 併病即不誤刺汗下已如結胸心下痞鞭矣况又誤下乎故比太陽一經誤下
 之變殆有甚焉其人心煩似不了之語然經謂結胸證具躁煩者死意此亦謂
 其人心煩者死乎汪琥曰太陽病在經者不可下少陽病下亦在所當禁故
 以下之為反也

訂正仲景全書傷寒論註

辨差後勞復食復陰陽易病脈證并治篇 傷寒新愈起居作勞因而復病謂

之勞復強食穀食因而復病謂之食復男女交接復而自病謂之房勞復男女

交接相易為病謂之陰陽易謂男傳不病之子女女傳不病之男有如交易也蓋

因其人新差餘邪伏於藏府未經悉解故犯之輒復也學者於臨證時審其脈

證而詳辨之則施治自無誤矣 大病差後勞復者枳實梔子豉湯主之若有

宿食者加大黃如博棊子五六枚 註 大病差後謂傷寒病新差後也勞復者

謂起居作勞復病非房勞復也宜枳實梔子豉湯主之溫覆令微似汗自愈不

取其涌者以熱不在胸而在經也若因過食復病者謂之食復以有宿食也宜

枳實梔子豉湯加大黃下之 集註 成無己曰勞復則熱氣浮越與枳實梔子

豉湯以解之食復則胃有宿積加大黃以下之 王肯堂曰傷寒之邪自外入

勞復之邪自內發

枳實梔子豉湯方

枳實 三枚

梔子 十四枚

豉 一升

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六

訂正傷寒論註差後勞復食復陰陽易病篇

上海政新書局發行

沸去滓溫分再服覆令微似汗

方解是方也用清漿水七升空煮至四升者是欲水之熱而趨下不欲上涌

作吐也下豉煮五六沸即去滓者取其清腐之氣走表易於取汗也太陽用之

以作吐勞復用之以作汗仲景用方之妙藥品雖同煎法各異故施用不同也

於此可類推矣集解方有執曰大邪初退血氣新虛起居作勞復生餘熱乃

用苦寒以發其微汗者以勞傷之復熱與初病之實熱不同倫也方中用清漿

水七升空煮至四升全是欲水之熱而趨下不至上涌作吐與太陽中篇下後

身熱取吐之法不同所以覆令微似汗也傷寒差已後更發熱小柴胡湯主

之脈浮者以汗解之脈沉實者以下解之註此承上條詳言證脈以別其治

也傷寒差已後更發熱者雖有勞復食復之別然須分或宜和或宜汗或宜

下之不同如脈浮有表當以汗解者用枳實梔子豉湯汗之脈沉有裏者當以

下解者用枳實梔子豉加大黃湯下之若無表裏證當和解之者用小柴胡湯

和之對證施治斯為合法集註方有執曰此示病後不謹調理致復之大法

脈浮有所重感者也脈沉飲食失節也魏荔彤曰大病後不宜大汗喻註謂

用枳實梔子豉湯以微汗是也大病後不宜大下喻註謂枳實梔子豉湯加大黃



以微下是也然亦有不能盡該者凡於汗下之中留心其為大病之後庶治復病而不礙於大病後也 大病差後從腰以下有水氣者牡蠣澤瀉散主之

註傷寒病差後從腰以下腫者是有水氣也宜牡蠣澤瀉散峻逐水氣恐緩

則水盛必上犯陽部也 集註成無己曰大病差後脾胃氣虛不能制約腎水

水溢下焦故腰以下為腫也金匱要略云腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散

利小便而散水可也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣熬

澤瀉

桔萸根

蜀漆煖水洗去腥

商陸根熬

海藻洗去鹹

苦葶藶各等分熬

以上七味異搗下篩為散更

入臼中治之白飲和服方寸匕日三服小便利止後服

方解水停於內外泛作腫腰以上者當汗之小青龍越婢是也腰以下者當

利小便此方是也以牡蠣破水之堅澤瀉利水之蓄海藻散水之泛桔萸根消

水之腫又以蜀漆苦葶藶商陸根辛苦有毒之品直搗其巢峻逐水氣使從大

小二便而出然此方施之於形氣實者其腫可隨愈也若病後土虛不能制水

腎虛不能行水則又當別論慎不可服也 大病差後喜睡久不了了胸上有

寒當以丸藥溫之宜理中丸 註大病差後喜睡久不了了者胃中虛寒不能

運化津液聚而成唾故唾日久無已時也宜理中丸以溫補其胃自可已也

註一程知曰病後陽氣不足胃中虛寒不內津液故喜唾不了了前牡蠣澤瀉湯

散者欲其戀肺而下水也此理中用丸者欲其溫胃而收唾也 喻昌曰身中

津液因胃寒凝結而成濁唾久而不清其人必消瘦索澤故不用湯藥蕩滌而

用丸藥緩圖也 張璐曰傷寒差後體虛每有遺熱故禁溫補即間有素稟虛

寒者祇宜理中丸調理未嘗輕用桂附也 傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐竹

葉石膏湯主之 註傷寒解後虛羸寒傷形也少氣熱傷氣也氣逆欲吐餘邪

扶飲犯胃也故宜竹葉石膏湯益虛清熱以降逆氣也 集註方有執曰病後

虛羸少氣脾胃未強飲食難化則痰飲易生飲停氣逆故欲吐也 程知曰傷

寒解後津液不足則虛羸餘熱不盡則傷氣與竹葉石膏湯以調胃而去虛熱

蓋前條是治病後虛寒此條是治病後虛熱也

竹葉石膏湯方

竹葉

把二

石膏

劬一

半夏

半升

人參

二

甘草

二兩

粳米

半升

麥冬

去心升

右七味以水一斗煮取六升

去滓內粳米煮米熟湯成去米溫服一升日三服

方解

是方也即白虎湯去知母加人參麥冬半夏竹葉也以大寒之劑易為