

外科
鈴
上

全
書
聖

	亥 12
	4-8
	共 2 册



景岳全書外科鈐目錄聖集

卷之四十六

外科上

經義一

脉候二

論證三

善惡逆順四

虛實五

淺深辨六

總論治法七

敗毒八

托裏九

論汗下十

論灸法十一

膿針辨十二



上海中医药大学图书馆版权所有

論針法 十三

用針勿忌鬼神 十四

圍藥 十五

腐肉 十六

含時從證 十七

陽氣脫陷 十八

溫補按則 十九

定痛 二十

生肌收口 二十一附
漏證

用香散藥 二十二

槐花酒 二十三

忍冬酒 二十四

腫瘍 二十五

腫瘍不足 二十六

潰瘍 二十七

潰瘍有餘 二十八

潰瘍作痛 二十九

潰瘍發熱 三十



發熱煩躁 三十一

作嘔 三十二

作渴 三十三

瀉痢 三十四

大便秘結 三十五

小便淋瀝不利 三十六

發瘧 三十七

無寐 三十八

瘡瘍出血 三十九

戒忌調護 四十

陰陽證變 四十一

論列方 外科上

卷之四十七

外科下

發背 四十二

腦疽 四十三



耳瘡 四十四

髻疽 四十五

疔腮 四十六

癰癰 四十七

疔瘡 四十八

時毒 四十九

肺癰肺痿 五十

乳癰乳巖 五十一

胃脘癰 五十二

腹癰 五十三

腸癰 五十四

附骨疽 五十五

臀癰 五十六

流注 五十七

鶴膝風 五十八

多骨疽 五十九

下疳瘡 六十

便毒 六十一



楊梅瘡 六十二

囊癰 六十三

懸癰 六十四

脫疽 六十五

腳發 六十六

足跟瘡 六十七

腎臟風瘡 六十八

廉瘡 六十九

天泡瘡 七十

赤白遊風 七十一

翻花瘡 七十二

痔漏 七十三附臟毒
下血按

跌打損傷 七十四

杖瘡 七十五

破傷風 七十六

類破傷風 七十七

班疹丹毒 七十八

癰贅 七十九



南京中医药大学图书馆版权所有

疣入寸

論列方外科下

狐疝寸十六

狐疝寸十七

疝疝寸十四

疝疝寸十五

天疝寸十二

天疝寸十三

天疝寸十一

天疝寸十二

天疝寸十

天疝寸十一

天疝寸九

天疝寸十

天疝寸八

天疝寸九

天疝寸七

天疝寸八



景符全書卷之四十六聖集

外科鈴

上

會稽張介賓

會卿著

會稽魯超謙菴訂

外科鈴

上

經義

難疽篇黃帝曰血氣已調形氣乃持余已知血氣之平與不平

未知癰疽之所從生成敗之時死生之期有遠近何以度之

可得聞乎岐伯曰經脉流行不止與天同度與地合紀故天



宿失度日月薄蝕地經失紀水道流溢草莖不成五穀不殖
徑路不通民不往來巷聚邑居則別離異處血氣猶然請言
其故夫血脉營衛周流不休上應星宿下應經數寒邪客於
經絡之中則血泣血泣則不通不通則衛氣歸之不得復反
故癰腫寒氣化爲熱熱勝則腐肉肉腐則爲膿膿不瀉則爛
筋筋爛則傷骨骨傷則髓消不當骨空不得泄寫血枯空虛
則筋骨肌肉不相榮經脉敗漏薰於五藏藏傷故死矣○黃
帝曰願盡聞癰疽之形與忌曰名岐伯曰癰發於隘中名曰
猛疽猛疽不治化爲膿膿不寫塞咽半日死其化爲膿者寫



則合豕膏冷食三日已○發於頸名曰天疽其癰大以赤黑
不急治則熱氣下入淵腋前傷任脉內薰肝肺薰肝肺十日
日而死矣○陽氣大發消腦留項名曰腦燂其色不樂
而如刺以針煩心者死不可治○發於肩及臑名曰疵癰其
狀赤黑急治之此令人汗出至足不害五藏癰發四五日逞
燭之○發於腋下赤堅者名曰米疽治之以砭石欲細而長
踈砭之塗以豕膏六日已勿裹之○其癰堅而不潰者爲馬
刀挾纓急治之○發於胸名曰井疽其狀如大豆三四日起
不早治下入腹不治七日死矣○發於膺名曰井疽色青其

狀如穀實蕨蕨常苦寒熱急治之去其寒熱十歲死死後出
膿○發於脇名曰敗疵敗疵者女子之病也灸之其病大癰
膿治之其中乃有生肉大如赤小豆剉陵薸草根各一升以
水一斗六升煮之竭爲取三升則強飲厚衣坐於釜上令汗
出至足已○發於股脛名曰股脛疽其狀不甚變而癰膿搏
骨不急治三十日死矣○發於屍名曰銳疽其赤堅大急治
之不治三十日死矣○發於股陰名曰赤施不急治六十日
死在兩股之內不治十日而當死○發於膝名曰疵癰其狀
大癰色不變寒熱如堅石勿石石之者死須其柔乃石之者

生○諸癰疽之發於節而相應者不可治也發於陽者白
死發於陰者三十日死○發於脛名曰兔齧其狀赤至骨急
治之不治害人也○發於內踝名曰走緩其狀癰也色不變
數石其輸而止其寒熱不死○發於足上下名曰四淫其狀
大癰急治之百日死○發於足傍名曰厲癰其狀不大初如
小指發急治之去其黑者不消輒益不治百日死○發於足
指名脫癰其狀赤黑死不治不赤黑不死不衰急斬之不則
死矣○黃帝曰夫子言癰疽何以別之岐伯曰榮衛稽留於
經脈之中則血泣而不行不行則衛氣從之而不通壅遏而



不得行故熱大熱不止熱勝則肉腐腐則爲膿然不能陷骨
髓不爲焦枯五藏不爲傷故名曰癰黃帝曰何謂疽岐伯曰
熱氣淳盛下陷肌膚筋髓枯內連五藏血氣竭當其癰下陷
骨良肉皆無餘故命曰疽疽者上之皮夭以堅上如牛領之
皮癰者其皮上薄以澤此其候也

玉版篇黃帝曰病之生時有喜怒不測飲食不節陰氣不足陽
氣有餘營氣不行乃發爲癰疽陰陽不通兩熱相搏乃化爲
膿小鍼能取之乎岐伯曰以小治小者其功小以大治大者
多害故其已成膿血者其唯砭石鉋鍼之所取也黃帝曰多

言者其不可全乎岐伯曰其在逆順焉以爲傷者其白眼青
黑眼小是一逆也內藥而嘔者是二逆也腹痛渴甚是
也肩項中不便者是四逆也音嘶色脫是五逆也除此五者爲
順矣

寒熱病篇曰五藏身有五部伏兕一腓二腓者膈也背三五藏
之腧四項五此五部有癰疽者死○凡刺之害中而不去則
精泄不中而去則致氣精泄則病甚而恆致氣則生爲癰疽
也

生氣通天論曰高粱之變足生大疔受如持虛○汗出見濕乃

生瘰癧○勞汗當風寒薄爲皴鬱乃瘰○營氣不從逆於肉
理乃生癰腫○陷脉爲癭留連肉腠○因而飽食筋脉橫解
腸澼爲痔

陰陽別論曰三陽爲病發寒熱下爲癰腫

脉度篇曰六府不和則留結爲癰

異法方宜論曰東方之域其民食魚而嗜鹹其病皆爲癰瘍其

治宜砭石故砭石者亦從東方來

氣穴論曰肉之大會爲谷肉之小會爲谿肉分之間谿谷之會
以行榮衛以會大氣邪溢氣壅脉熱肉敗榮衛不行必將爲

膿內消骨髓外破大膿留於節湊必將爲敗積寒留舍榮衛
不居卷肉縮筋肘不得伸內爲骨痺外爲不仁命曰不足
大寒留於谿谷也

刺節真邪論曰虛邪之中人也洒淅動形起毫毛而發腠理其
入深內搏於骨則爲骨痺搏於筋則爲筋攣搏於脉中則爲
血閉不通則爲癰○虛邪之入於身也深寒與熱相搏久留
而內著寒勝其熱則骨疼內枯熱勝其寒則爛肉腐肌爲膿
內傷骨內傷骨爲骨蝕○有所疾前筋筋屈而不得伸邪氣
居其間而不反發爲筋溜○有所結氣歸之衛氣歸之不得

反津液久留合而爲腸溜○久者數歲乃成以手按之柔已
有所結氣滯之津液溜之邪氣中之凝結日以易甚連以聚
居爲昔瘤○以手按之堅有所結深中骨氣因於骨骨與氣
并日以益大則爲骨疽○有所結中於肉宗氣滯之邪留而
不去有熱則化爲膿無熱則爲肉疽○凡此數氣者其發無
常處而有常名也

病能論黃帝問曰人病胃脘癰者診當何如岐伯對曰珍此者
當候胃脉其脉當沉細沉細者氣逆逆者人迎甚盛甚盛則
熱人迎者胃脉也逆而盛則熱聚於胃口而不行故胃脘爲