

傷寒經解卷之二

漢南陽張機仲景氏撰

勾吳逋人集註

太陽經下篇

中風誤汗大陽病三日已發汗若吐若下若溫針仍不解者此為壞病桂枝
症等不中與也觀其脉症知犯何逆隨症治之

太陽病風寒溫熱溫之傷寒也三日約言日久未愈也傷寒
陽虛陰盛者可汗不可下陰虛陽盛者可下而不可汗下誤
施或太早太過則成壞症既壞故桂枝等不中與也觀脉症
另立救逆法也

發汗後身疼痛脉沉遲者桂枝加芍藥生姜各一兩人參三兩新加湯主之

發汗過多陰陽有虧氣不^能响血不能濡肌肉皮毛空澁而疼痛也脉沉遲者營氣微故脉沉衛氣衰故脉遲也新加湯扶元氣益陰血也

新加湯 桂枝_{兩三}芍藥_{兩四}甘草_{兩二}生姜_{兩四}大棗_{枚十二}人參_{兩三}右

六味以水七升微火煮取三升去渣遣寒溫服一升

新加湯仍用桂枝湯治風以和營衛也增芍藥以益營氣加人參生陽以扶陽行澁也加味故名新加湯

太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微急難以屈伸者

桂枝加附子湯主之

中風本有汗誤發其汗以致漏而不止。經云汗出如流珠者氣衛氣衰也。衛衰表疎故惡風小便氣化乃出陽虛則氣不化故小便四肢諸陽之本陽衰故微急而屈伸不便也。桂枝加附子湯以固衛陽也。

桂枝加附子湯

桂枝

芍藥

甘草

生薑

大棗

三兩 三兩 二兩 三兩 十二枚

附子

一枚

右六味以水六升微火煮取三升去渣適寒溫服一

升若一服汗出停後服

中風下利
吐也

中風誤汗，遂不止。固表歛汗，無過桂枝湯。加附子，則腎氣充而衛外之陽固矣。以上二節中風誤汗症也。

太陽病，當惡寒發熱。今自汗出，不惡寒發熱，關上脈細數者，以醫吐之過也。一二日吐之者，腹中飢，口不能食，三四日吐之者，不喜

糜粥，飲食冷食，朝食暮吐，以醫吐之所致，此為小逆。

太陽病，中風也。故當惡寒發熱。今自汗出，不惡寒發熱者，吐中有發散之意，表邪雖解而肌竅愈疎也。關上以候中焦，肝脾脈細少，水脈數，有火吐傷津液，脾陰虛而肝火炎，故關上脈現細數也。中風之症，本傷衛而不傷營，今病見中焦，故知醫吐之。

過也一二日病初犯吐之其受症輕腹中飢火炎而心嘈也口不能食脾陰傷而不能食也三日四日病日久吐之其受症重不喜糜粥飲食冷食脾傷火炎也朝食暮吐脾不運化肝不散精食入還出也因吐之所致而非本來之症故曰此為小逆此節風誤吐之症也

太陽病下之微喘者表未解故也桂枝加厚朴杏仁湯主之

太陽中風過經乃可下之早則陽邪內陷熱傷肺氣呼吸不利而喘矣故曰表未解也桂枝加厚朴杏仁湯下氣以利呼吸也

桂枝厚朴杏仁湯

桂枝

芍藥

甘草

炙

生薑

大棗

十二

厚朴二兩杏仁五十粒右七味以水七升微火煮取三升去渣遣寒

溫服一升若一服汗出病差停後服

表症未解故用桂枝湯加厚朴杏仁以下氣散結蓋因早用大黃以致喘逆表邪既入勢難外行出利其下行故加厚朴杏仁喘自平也

喘家作桂枝湯加厚朴杏子仁

喘家平素有喘症者如欲用桂枝湯即非下後亦加厚朴杏仁方無氣逆之虞

太陽病下之後胸脉促胸滿者桂枝去芍藥湯主之若微惡寒者

去芍藥方中加附子湯主之

諸陽受氣于胸中中風下之脉促胸滿者下後陽虛不能布氣于
胸正氣虛濁氣填塞也桂枝去芍則載還陽氣于心脾之分仍
前布氣清陽復位濁陰自降也若見惡寒陽虛已著故加附子
以扶元陽也

桂枝去芍藥湯

桂枝

三兩

甘草

二兩

炙

生薑

三兩

大棗

十二枚

右四味以

水七升微火煮取三升去渣遣寒溫服一升

桂枝甘草扶陽溫中生薑大棗補胃通神陽者胃脘之陽胃陽
和濁氣降也蓋以桂枝湯去芍之酸收桂枝甘草湯加姜大棗之

通神補胃自走上焦而布大氣于胸矣

桂枝去芍加附子湯

桂枝三兩甘草二兩

炙

生薑

三兩大棗

十二枚

附子

一枚

右五味以水七升微火煮取三升去查過寒溫服一升若

一服惡寒止停後服

惡寒加附子回陽也桂枝湯仍去芍藥者以脉促胸滿仍在也

且芍性酸寒亦非陽虛所宜也

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裡後身疼痛

清便自調者急當救表救裡宜四逆湯救表宜桂枝湯

中風之症下之太早太過因而下利清穀不止身疼痛者下多

則寒火衰不殺穀。土寒而肌肉痛也。救裡宜四逆湯祛寒也。救表宜桂枝湯和營衛也。救裡救表急者先治之也。

四逆湯

甘草

炙二兩

乾姜

多一兩半

附子

生一枚

右三味

以水三升煮

取一升二合去渣分溫再服

此乾姜附子湯加甘草也。姜附以溫腎。甘草以扶脾。水土煖而陰寒散矣。

太陽病二三日不能卧但欲起。心下必結。脈微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止必作結胸。未止者。此作挾熱利也。四日復下之。太陽病中風也。二三日不能卧但欲起者。以本有寒也。素有寒

症又中風邪風為陽寒為陰陽不和于陰故二三日即不能安
卧而欲起坐也心下結本寒結也微脉弱本有寒故雖中風而
有陽邪脉仍不鼓也寒而下故曰反誤下風邪內陷下後如利
已止其風邪結于陽位必作結胸下後如利尚未止其風邪下
陷本寒協之則作協熱下利協利者風為陽邪也四日復下之
者邪既內陷不能復出因而下洩六將錯就錯救逆法也下之
之方上宜結胸湯下宜承氣湯也末二句向錯簡今正之
太陽病桂枝症醫反下之利遂不止脉促者表未解也喘而汗出
者葛根黃連黃芩湯主之

太陽桂枝症中風也。反下之未過經下之太早也。誤下陽邪下陷。利遂不止也。數甚為促。陽脉也。陽主表脉促。故知表未解也。喘而汗出者。陽邪刑肺。合皮毛。皮毛熱而汗出也。故用葛根黃連黃芩湯清之。

葛根黃連黃芩湯

葛根

兩

炙甘草

兩

黃芩

兩

黃連

兩

右四味以

水八升。先煮葛根減二升。內諸藥。煮取二升。去渣分溫再服。利不止喘而汗出。肺與大腸俱受火邪矣。火氣通心。汗亦心之液也。故用黃連清心火。黃芩清肺火。甘草甘以緩熱。葛根入大腸火鬱發之。利止而表亦解矣。

太陽病下之其氣上衝者可與桂枝湯中用前法若不上衝者不可與之

中風下早陽邪下陷然無他交但氣上衝者陽位用桂枝湯加于前所用下藥之內從下洩其陽邪桂枝湯平其上衝之氣若氣不衝則桂枝之平飲自不可與矣以上六節中風下早之症也

中風誤火

切症也

傷寒脉浮以火迫劫之亡陽必驚狂卧起不安者桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯主之傷寒脉浮者風也風以火劫則風火相煽風氣通肝火氣通

中風後火

心，肝真陽飛越故驚狂卧起不安也。主以救逆湯。甘辛益陽鎮重治怯也。去芍惡其伐肝也。

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯。桂枝三兩甘草炙二兩生薑三兩

大棗枚十二蜀漆洗去腥三兩牡蠣熬五兩龍骨熬飛石為末四兩以水一斗

二升先煮蜀漆減二升內諸藥煮取三升去渣溫服一升

桂枝甘草平肝安神生薑大棗補肝和中蜀漆清邪火而平肝

心以為君龍東方神獸骨乃血肉之屬牡蠣水中介虫澁以鎮

心肝之神鹹以解火迫之邪服之陽寧神安故名救逆

火逆下之因燒針煩躁者桂枝甘草龍骨牡蠣湯主之

火邪下之火邪已解矣而又以燒針擾其揚、不寧而煩躁、
属于陰故補陽以鎮之

桂枝甘草龍骨牡蠣湯 桂枝兩甘草炙二兩龍骨熬二兩飛牡蠣二兩

右為末以水五升煮取二升半去渣溫服八合日三服

桂枝平肝溫腎甘草和中解煩龍骨澀以平肝牡蠣鹹以固腎
龍雷安定煩躁自止也 以上二節中風火劫之壞症也

中風寒而傷後發汗過多其人叉手自冒心、下悸欲得按者桂枝甘草湯主之
汗亡也

傷寒應汗、太多則血傷心主血、傷則心虛動惕而悸其叉
手自冒心欲按者虛則喜實也故用桂枝甘草湯以益心陽

桂枝甘草湯

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去

查溫服

甘

汗乃心之液、傷則心陽虛桂枝益陽而歛汗甘草和中以安神辛則補血肝則實虛所以主之

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石羔湯

發汗後汗出而喘與中風自汗不同故不可更用桂枝湯蓋汗出而喘者因肺寒失下降之令發散太過致陽明氣逆而喘汗也無大熱者肺合皮毛肺寒內熱而皮毛無大熱也麻黃杏仁

甘草石羔湯解肺寒而清陽明氣逆也

麻黃杏仁甘草石羔湯

麻黃

四兩

杏仁

五十枚

甘草

二兩

石羔

二兩

兩右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升去查溫服一升

麻黃以解肺寒杏仁以下肺氣石羔清陽明之上逆甘草以和

肺胃四味合用熱者清而寒者溫汗自止而喘自平也

發汗後飲水多者必喘以水灌之亦喘

肺合皮毛發汗後皮毛傷則肺虛形寒飲冷則傷肺飲水飲冷也水灌形寒也寒則肺不降而喘矣溫肺則愈不必清陽光之

氣達也

以上三節太陽傷寒過汗之壞症

下後不可更行桂枝湯若汗出而喘無大熱者可與麻黃杏仁甘草石羔湯

下後汗出而喘亦與中風自汗不同故不可更用桂枝湯也蓋汗出而喘者下傷肺氣肺寒不能下降下傷胃氣陽明氣而喘也汗也無大熱者熱在裡不在表也與前節汗後喘汗同歸肺寒而陽明氣達故亦主以麻黃杏仁甘草石羔湯

下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表症脉沉微身無大熱者乾姜附子湯主之