

香巖診案

香巖診案

上海古籍書店複印

二冊定價九元

七六·一·二〇〇·八一·四



香巖診案

丙辰年

王三十歲

痺

體豐年壯。脉左緩小。右滑數疾。咽中結形。時發腫膿。四肢屈曲。骨中跗骨痛而行走。此為痺症。痺者閉也。經脉為濕氣留痙。久而壅熱。與氣血混處。最是延綿。必永戒酒肉腥濁。肅清陽明太陰。百日可愈。

防已

石膏

天花粉

赤豆皮

清滋身品



滑石

射干

茯苓

朱仁

朱

瘡

寒熱瘡起于長夏。必挾暑濕。唇瘡。舌
泡。濕中之熱。欲解而瘡止。但營衛
不。未振。必煩勞風雨而復瘡。微勞者
溫養之。皆不宜。瑣屑治病。四獸飲。

人參

白朮

茯苓

半夏

草果

炙草

廣皮

烏梅

金

吐
痾

老人胃陽已微。因勞動怒肝。少腹氣
痛。衝逆。食入嘔吐酸濁。前方以姜附

胆汁舒通
引導

理陽。佐胆汁以迅走引導。議丸藥緩。

熟附子 炒川椒 白茯苓 南棗肉

波乾姜 姜汁和丸人參末為衣

孫 久鬱化熱化疫。陽明受病。嘔涎已久。

半夏 茯苓 石膏 杏仁

枳實

劉 衛疎畏風。胃逆乘肺多噎。形色脉象

已屬虛損。議與胃藥。



黃
建中湯去姜

肝咳

蔣
脉右弦搏。形瘦咳痰。腕中積氣。下焦
有疝。此皆煩勞。加以嗔怒。肝家病也。

以鮮薺理氣治之。

海浮石

茯苓

川練子

橘紅

瓜蒌仁

半夏

黑山梔

蛤粉

吳

陽微挾濕腹脹。用小溫中丸未効。

肝脹

生白朮

綿茵陳

茯苓皮

厚朴

草果仁

白通草

海金沙

大腹皮

樊

吐血

吐血盈盃。腕中痞塞。湯藥食物嘔出。此格拒在胃口之上。必氣降可望血止。

蘓子

降香末

黑查肉

神麴

鬱金

焦麦芽

8

又

吐血

血由絡出。然必隨氣為升降。至於湯飲湧吐嘔逆。連胃腕阻拒悶塞。故必降氣宣通。其血乃降。況阿膠生地粘膩。三七甘瀉。犀角腥穢。皆令助嘔。一

辨百理漸



部本草。先列氣味。經開主治。豈見血
治血之謂。今左邊不能着席而卧。仍
是左升太過。肝病犯胃之象。不可
小効。忽畧。

降香末

黑查肉

焦延胡

炒桃仁

羌蔚子

京墨汁

韭白汁

又

脉数氣熱未平。仍宜淡薄食味。

川貝

沙參

定花粉

薏苡仁

鬱金

桑葉

錢

肝

此煩勞思慮。肝胆風陽上舉。眩暈惡心。漸令減穀。

桑葉

天麻

黑山施

桔梗

丹皮

橘紅

連翹心

王

肝陽內風上燥。眩暈耳鳴心悸。

肝

生地

天冬肉

阿膠

茯神

女貞實

白芍

顧

勞傷失血。

生芪

米仁

北參

炙草



南棗

米糖

李

舌澀不渴。背冷。吞酸。不甘食。

半硫丸

尹

脹滿
從入中信力

熱鬱濕滯。初在氣分。久則漸入血絡。而為脹滿。但氣分仍然窒塞。病人自說肌肉迸裂情形。視肌肉瘡色。脉象以及腫勢。延及尻腎。經病傳及腑症。

茯苓皮

木防已

大腹皮

細木通

綿茵陳

海金沙

送保和丸



李

腕痛

脉得関前緩實。腕痛形消。不納食物。此陳腐凝着。阻其清陽轉旋之用。餌補藥。日見其羸。苟非宣通。所謂養寇。

炒桃仁

炒延胡

熟半夏

雲茯苓

川桂枝

生薑皮

趙

噎隔

舌白湧涎。形骸甘減。此酒客陽微。留飲。壯歲不覺。正衰病來。乃噎格重病。

人參

熟半夏

茯苓

生沒乾姜



姜汁

王

此八脉症。都因漏經淋帶之傷。

崩漏

鹿角膠

炒小茴

茯苓

炒白芍

炒歸身

生杜仲

孫

尺中不藏。肝腎之病。

六味加麥冬五味川斛

周

食入脘脹。痞塞背寒。胃陽微也。

炒半夏

沒乾姜

杏仁

厚朴

生姜汁

草果仁



朱

道性

尤寒族

脉脉細數。下損三年。肉消形奪。吸短不
 堪行動。心熱。納食皆減。精血暗枯。不
 燥。豈偏寒偏熱。治嗽治疫有益。填精
 充髓。為有情之藥。然必加穀充形。不
 徒啣藥已也。

牛骨髓

猪脊筋

熟地

栢仁

鹿角膠

天門冬

芡實

茯神

羊腦子

女貞實

蓮肉

山藥

陰虛損及陽位。形寒畏風。



建中湯去薑

吾

淋濁風
上海痛掃風

壯年飲酒。濕墜下注成淋。仍起居。
慎。淋。釀。精。濁。四。肢。痿。木。難。舉。由。脇。
及。胃。脉。致。陽。明。脉。不。主。束。骨。利。筋。古。
人。治。痿。獨。取。陽。明。所。謂。理。中。宮。以。運。
四。末。耳。

生於朮

生黃芪

乳香

當歸

漢防已

仙靈脾
即淫羊藿 治百病不仁

沒藥

松節

酒水各半浸丸



素

咳嗽

咳嗽三年。始於外受寒熱不正之氣。肺氣阻閉。音聲不出。舌膩口氣穢濁。大便結燥。濕熱膠痰凝結。非游膩熱所宜。

麻黃

石膏

生草

炒半夏

米仁

杏仁

筴

喘

此症因遠中
湯妙極

據述風冷外固。積勞內困。診脉虛緩。遇風咳甚。痰多。少腹有氣。或冲胸臆。或貫脇肋。走動必喘。是乃元海少納。



王

風序

錢

清

衝脉上送。乃虛症也。用小建中湯。

風疹廿年。每發肌肉浮腫。二便窒塞。

此積熱蘊于氣血。得風而沸。緩逐。

峻發時用防風通聖散。

用法

有夢久遺。仍能食安穀。其來必在子。

漸至昏眼

後係陰不交陽。宜靜藥以制動。或佐

通瀉兼施。

大熟地 炙黃

蓮鬚

生白龍骨

炒黑梔 茯苓

山藥

金櫻子粉

宣法香氏加夜藤



天冬肉 莖肉 黃栢

莖痛猪脊髓丸。

徐 第 卷

此虛勞。是下焦精空。液竭。損及胃

下按乃上

食減無味。陽浮上灼。喉咽窒痛。然重

病必究。寢食早用人乳溫服。一盞。午

服。

麥冬同湯去半夏 秋石加 能除痰火以此味八分

胡心泉 食嗽音啞。咳甚必嘔。異功去木。加黃

參苓草陳

精白芍南棗蒸餅丸。

咳喘 音啞

