

古今醫鑑
錄

瘡疾	嘔吐	吞酸	脹滿	發熱
痢疾	惡心	嘈雜	水腫	
泄瀉	翻胃	諸氣 青筋	積聚	
霍亂	欬逆	痞滿	五疸	

新刻增補古今醫鑑卷之三

太醫院醫官金谿纂 信編

男 廷賢續編

書林蘊古堂余元聲重刊

瘧疾

脈瘧脉自弦弦數者多熱宜汗之弦遲者多寒宜溫之弦緊宜下浮大宜吐弦短者傷食弦滑者多痰虛微無力為久病洪數無力與微皆虛代散則死

病夫瘧有風瘧暑瘧濕瘧食瘧瘧母諸瘧之不同不過風寒暑濕之外感七情五味之內傷之所致也然內外失時真邪不分陰陽偏勝寒熱交攻乃成瘧也有一日一發者有二日一發者有三日一發有間一日連三日發氣血俱受病有夜與日各發有上半日發有下半日發有發夜者其始發之時欠伸畏寒戰慄頭痛或渴或先寒後熱或先熱後寒或單寒不熱或單熱不寒或寒少

熱多或寒多熱少

治治療之法當先發散邪邪有有汗有無汗無汗者要有汗散邪爲主有汗者
要無汗正氣爲主發散邪正氣病不退者又須分利陰陽以柴苓湯最効甚
者或以截藥而除之不二飲勝金丸之類截之不愈乃氣血大虛要扶胃氣
爲本露薑養胃湯養胃丹之類又有綿延不休彌禩越歲經汗吐下過榮衛
虧損邪氣伏于脇間結爲癰瘕爲之瘧毋瘵瘧飲黃甲丸之類益瘧有新久
淺深治有緩急次序宜以脉證參驗量其虛實而療之機要爲太陽經爲寒
瘧治多汗之陽明經爲熱瘧治多下之少陽經爲風瘧或曰寒熱瘧治多和
之此三陽受病爲之暴瘧在夏至後處暑前乃傷之淺者在三陽經則爲之
寒瘧有處暑後冬至前乃傷之重其三陰經瘧作于子午卯酉日者少陰瘧
作于寅申巳亥日者厥陰瘧作于辰戌丑未日者太陰之瘧也
一凡瘧方來正發不可服藥服藥在干未發間時之先否則藥病交爭

血深

害當戒之

一人平素虛弱兼以勞役內傷挾感寒暑以致瘡疾寒熱交作肢體倦怠乏力
少氣以補中益氣湯加黃芩芍藥半夏有汗極寒重加桂枝倍黃芪熱盛倍
黃芩柴胡渴加麥門冬天花粉

一久瘡乃屬元氣虛寒蓋氣虛則寒血虛則熱胃虛則惡寒脾虛則發熱陰火
下流則寒熱交作或吐涎不食洩瀉腹痛手足厥冷寒戰如慄若誤投以清
脾截瘡二飲多致不起

一瘡後飲食少進四肢無力面色痿黃身體虛弱以四君子湯合二陳湯加黃
連姜汁炒枳實炒生薑煎服

一凡瘡後大汗出者乃榮血不足之候以人參養榮湯主之
左散和湯三山陳氏方

川芎

白芷

麻黃

白芍

防風

去蘆

荊芥

紫蘇

錢

各一

羌活一錢 甘草三分 右剉一劑生薑三片葱白三根水煎露一宿次早溫

服○有痰加陳皮○有濕加蒼朮○夾食加香附

○按右方治瘧無汗當發汗散邪為主

正氣湯 三山陳氏方

柴胡

前胡

川芎

白芷

半夏

麥門冬

去心

檳榔

各一錢

草菓

去壳

青皮

去積

茯苓

去皮

桂枝

甘草

各二錢

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎預先熱服

○按右方治瘧有汗當止汗止氣為主

參湯

柴胡

黃芩

人參

半夏

甘草

朱砂

澤瀉

白朮

茯苓

肉桂

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎服

無汗加麻黃○有汗加桂枝○寒多加官桂○熱多加黃芩

○按右方治瘧分利陰陽和鮮表裏之劑

不二飲

秘方

治一切新久寒熱瘧疾一劑截住神効

常山

檳榔

要一雌一雄約重二錢餘葉各二錢

知母

貝母

各等分

右剉每四錢酒一鍾煎至八分不可過熟熟則不効露一宿臨發日五更溫服勿令婦人煎藥

勝金丸

治一切寒熱瘧疾胸膈停痰發散不愈者

常山

四兩好酒浸一宿晒干

蒼朮

米泔浸晒干二兩

檳榔

二兩

草蓰

二兩

右各為末將酒浸常山餘酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十九丸未嘗前一
日臨臥時涼酒送下便臥至鷄鳴時再進七十九丸忌生冷熱物

瘧靈丹

秘方

五月五日午時用雄黑豆四十九箇先一日以水泡去皮研

爛入人言末一錢同搗為丸如芡實大雄黃一錢為衣陰乾收貯臨發日早
晨面東無根水下一丸忌熱酒熱物一宿仍忌魚腥生冷之物三日黑豆圓

者是雄的

天靈散 劉上舍傳

治瘧如神

天靈蓋燒存性為末每服五厘黃酒空心送下

按右方治諸瘧止截之劑

龍虎湯

治熱瘧火盛舌卷焦黑鼻如煙色六脈洪弦而緊此乃陽毒而

深先以青布摺疊數重新汲水漬之搭于胸上須臾再易如此三次熱勢稍退即服此藥

柴胡 半錢

黃芩 一錢

半夏 七分

石膏 一錢

知母 一錢

黃連 半錢

黃柏 一錢

梔子 八分

梗米 數粒

右剉一劑生薑蔥煎服

○按右方治熱瘧清火一劑

露薑養胃湯

治久瘧三五日一發者及感寒發症

蒼朮

米泔浸

厚朴 姜炒

陳皮

草薢

人參

茯苓

半夏湯汁

甘草

右剉一剉束一枚烏梅一箇煎先以生薑四兩搗

汁露一宿次早合入煎藥通日服忌生冷油膩

養胃丹

治久瘧二三年不愈者

人參

茯苓

藿香

草薢

蒼朮制炒

常山酒蒸各二兩

半夏泡

厚朴姜炒

陳皮

烏梅四十九個去核用

甘草錢五

右爲末淡姜湯打糊爲丸每服五七十丸姜湯送下

○按右方治久瘧補虛之劑

瘧瘧飲

蒼朮

米泔水浸

草果去

桔梗

青皮

陳皮

良薑

錢各五

白芷

茯苓

半夏

湯泡

枳殼麩炒

甘草

桂心

乾薑

錢各二

蘇葉

川芎錢二

右剉每劑五錢水煎鹽水少許空心溫服

黃甲丸

治瘧母成塊後發熱久不愈

硃砂

阿魏

川山甲

酥炙

檳榔

一

雄黃

木香銼五

右其為細末泡黑豆去皮搗成泥為丸梧桐子大每五十丸

淡姜湯下忌生冷

○按右方治瘧母消塊之劑

痢疾

脈下痢之脈宜微小不宜浮洪宜滑大不宜弦急宜身涼不宜身熱經所謂身

涼脈細者生身熱脈大者死是亦大槩言之耳不可一途而論也叔和云下

痢微小却為生脈大浮洪無瘥日

痢夫痢乃濕熱食積三者下青黃赤白黑五色也濕熱傷血分則下鮮色

白氣血俱傷則赤白相兼黃者食積黑者濕勝也其證腹臍疼痛或下鮮色

或下瘀血或下紫黑血或下白膿或赤白相混或如豆汁或如魚腦髓或如

屋漏水裏急後重頻欲登廁晝夜無度

治法行氣和血開鬱散結瀉脾胃之濕熱消臑膈之積滯經云熱瘧

爲痢其初宜立效散一服立愈或木香導氣湯以摧其邪以徹其毒皆爲良

法也痢稍久者不可下胃虛故也調中理氣湯加味香連丸之類擇使用之

痢多屬熱亦有虛與寒者虛者補之寒者溫之以神效參香散主之蓋痢之

初和毒正盛宜推蕩之不可用藥穀柯子收瀉之果則淹纏不已痢之稍久

真氣下陷宜收瀉之不可用巴豆牽牛之類通利用之則必致殺人又有下

痢噤口而不食者亦有二也有脾虛有脾熱脾虛者參苓白朮散脾熱參蓮

湯或倉連煎之類大凡下痢純紅者如犀角散者如犀角湯者大孔開如竹

筒者唇如朱紅者俱死證也如魚腦髓者身熱脈大者俱半生半死

方木香導氣湯

治痢疾初起腹痛紅白相雜畏急後重發熱噤口無

治痢疾初起腹痛紅白頭暈重耳熱後重發熱噤口無

欖 栢 各 錢

大黃半錢 木香

五

皇朝

生

補
石

黃連

各一錢二分

歸尾

茯苓

水煎

空

心服

○小便赤加滑石水通

關板丹

張小菴傳

黃丹

水飛

黃臘

各一

乳香

沒藥

各一

杏仁

皮尖去

巴豆

入醋去油

右將四味為末將黃蠟溶化後將藥末全蠟拌勻攪冷成塊

每服一九如黃豆大空心服紅痢冷甚煎湯下白痢冷甚姜湯下水瀉冷米

湯下忌生冷油膩

○按右方治痢以推其邪而徹其毒也

立效散

雲林製

治赤白痢疾膿血相兼裏急後重疼痛一服立止

淨黃連

四兩酒洗吳茱萸二兩全炒去葉更不用

陳枳殼

二兩

右為末每服三錢空心酒送下瀉瀉米湯下噤口痢陳倉米湯下

○按右方治熱積氣滯而為痢者以黃連清熱枳殼破氣清平之劑

調中理氣湯

蒼朮

米泔浸
八分

白朮

一錢

陳皮

八分

厚朴

姜炒
七分

枳殼

一錢

白芍

火煨
一錢

木香

五分

檳榔

一錢

右切一劑水煎空心溫服○如紅痢厚朴不製白芍不煨再加黃連一錢半

條芩半錢○紅甚者倍黃連芩白痢只依本方

加味香連丸

治痢之總司也

黃連

去毛炒
二兩

吳茱萸

炒水泡
二兩

木香

一錢

白薑

帶亮麩包裏
火煨一錢半

秘方加乳香沒藥

各一錢

右為細末用烏梅三兩滾水泡去核搗和為丸

如梧子大每服三十丸白痢乾薑湯送下血痢甘草湯送下血白痢乾薑茸

草湯下泄瀉乾薑湯下

○按右方治痢調理之劑

倉廩散

治赤白痢疾發熱不退○凡下痢有積有暑如用藥不効即

是腸胃有風邪熱也此方甚效○即人參敗毒散加黃連陳倉米三百粒薑

東煎服○噤口痢加陳倉米一撮石連肉七枚○痢後手足痛加楨榔木瓜
不早治有成鶴膝風

六一順氣湯

治痢不問赤白相雜肚痛裏急後重渾身發熱口乾發渴

用此通利即止

方見傷寒門

○按右方治內外兩感發熱痢疾及時疫行痢之劑

納臍膏

彭大參方

治噤口痢臨危之證用之立愈

用王瓜籐連莖葉經霜者曬乾燒灰存性出火毒用香油調納臍中即効

點眼膏

黃賓江傳

治噤口一切赤白痢

用首胎糞炙乾每一錢加雄黃五分黃連四分片腦少許共為細末點兩眼

角見効

倉連煎

劉刺史傳

治噤口痢不拘赤白

赤痢用陳倉米三錢黃連七錢○白痢用黃連三錢陳倉米七錢○赤白相

黃連倉米黃連各五錢

右剉水煎露一宿空心溫服

凡下痢噤口不食者雖曰脾虛蓋亦熱氣閉塞心胸間所致也

參苓白朮散加石葛蒲

錢

木香

少許

右爲末陳米飯調下

陳倉米尤良

噤口痢諸藥不效者糞缸中蛆不拘多少洗淨瓦焙乾爲末每服一二匙米飲調服就能思食大効

噤口痢多是胃口熱甚用黃連一兩

人參五錢

煎湯終日呷之如此再強飲但

得一呷下咽便好一方加石蓮肉三錢

水煎服立効外以田螺搗爛盒臍中

引熱下行故也又方用秤錘燒紅用好醋淋之病人開口吸氣吞之

○按右方皆治痢噤口不食之劑凡痢噤口不問赤白飲食卽吐諸物不

納皆是意氣薰蒸胃口熱盛切不可認胃寒噤口而用辛熱之藥宜以

煎方選用或木香薰氣湯去大薑煎熟入韭汁陳倉米飲入一盞於內

同服即愈

加減益氣湯

治痢日久不愈不能起床不食疲弱之甚者

黃芪

五分 人參 五分

白朮

白芍

陳皮

各一錢 當歸 七分

升麻

白豆蔻

地榆

木香

各三錢 澤瀉

砂仁 各五分

甘草

各三分

御米殼

醋炒 三分

右剉作一劑水煎服

神效參香散

治臟氣怯弱冷熱不調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚

腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻數無問新久

豐稟殼

去青穢醋 象一兩

陳皮 一兩

白茯苓

去皮 四錢

肉豆蔻

麩裏煨 四錢

人參

二錢

木香

白扁豆

各二錢

右共七味為末赤痢每九分加製黃連末一分白痢每九分加製紫葳末一

分赤白相雜每服八分加茱萸黃連末各一分青色黃色每一錢無減加並

用米湯調服忌梨生冷

製黃連菜萆法二分等分以老酒浸一宿同一處炒燥分開各為末另包藥

前用

○按右方治痢久不愈元氣虛弱滑脫下陷止瀉之劑

薑茶湯

治痢疾腹痛不問赤白冷熱薑能助陽茶能助陰二者皆能

消散又且調平陰陽況於暑毒酒食毒皆能解之也

老生薑

細切五片

細茶葉

三錢

右用新水煎服

一方加蓮根萆菜三味同搗汁酒調服

三白湯

杜仲玄傳

治痢不拘赤白

白砂糖

一兩

鷄子清

一箇

燒酒

一鍾

煎至八分溫服立止

仙梅丸

桑葉齒傳

治痢疾發熱發渴者

細茶

烏梅

洗刮去

右為末生蜜搗作丸彈子大每一丸水冷熱隨下

椿雞丸

桑葉川傳

治久痢不止

雪裏炭一隻縊死事淨入黃連一兩椿根白皮一兩裝入腹內好酒燂熟服之神効

舒鳧飲

劉桐川傳

治白痢如魚凍色者久不愈

白鴨一隻殺取血以滾酒和食之

將軍飲

秘方

治痢膿血稠粘裏急後重晝夜無度不問新久及休息痢綿紋

大黃切一兩以好酒三鍾浸半日煎至七分去渣分作二次服以利爲度

○按右方治痢簡易故附方末以便選用

泄瀉

脉多沉傷於風則浮傷於寒則沉細傷於暑則沉微傷於濕則沉緩洩而腹

脹脉弦者死又云脉緩時微小者生浮大數者死

痢大泄瀉者注下之證也蓋大腸爲傳送之官脾胃爲水穀之海或爲飲食生冷之所傷或爲暑濕風寒之所感脾胃停滯以致開門清濁不分發注於下