

薛氏醫書

二

明醫雜著卷之三

鄞人王節齋集

後學薛己註

卜兼三校

續醫論

喘與脹二症相因必皆小便不利喘則必生脹脹則必生喘但要識得標本先後先喘而後脹者主於肺先脹而後喘者主於脾何則肺金司降外主皮毛經曰肺朝百脉通調水道下輸膀胱又曰膀胱

膀胱者州都之官津液藏焉氣化則能出矣是小便之行由於肺氣之降下而輸化也若肺受邪而上喘則失降下之令故小便漸短以致水溢皮膚而生脹滿焉此則喘爲本而脹爲標治當清金降火爲主而行水次之脾土惡濕外主肌肉土能尅水若脾土受傷不能制水則水濕妄行浸漬肌肉水既上溢則邪反侵肺氣不得降而生喘矣此則脹爲本而喘爲標治當實脾行水爲主而清金次之苟肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加脾病

而用清金之藥則脾得寒而脹愈甚矣近世治二
症但知實脾行水而不知分別脾肺二症予故爲
發明之

愚按前症若肺中伏熱不能生水而喘且渴者
用黃芩清肺飲以治肺用五淋散以清小便若
脾肺虛弱不能通調水道者宜用補中益氣湯
以培元氣用六味地黃丸以補腎水若膏粱厚
味脾肺積熱而喘者宜清胃散以治胃用滋腎
丸以利小便若心火尅肺金而不能生腎水者

用人參平肺散以治肺用滋陰丸以滋小便若
腎經陰虧虛火燥肺金而小便不生者用六味
地黃丸以補腎水用補中益氣湯以培脾土若
脾氣虛弱不能相制而喘者用補中益氣湯以
培元氣用六味地黃丸以生腎水若肝木尅脾
土不能相制而喘者用六君柴胡升麻以培元
氣六味地黃丸以補腎水若脾胃虛寒不能相
制而脹者用八味丸以補脾肺生腎水若脾腎
虛寒不能通調水道而脹者宜用金匱加減腎

氣丸補脾肺生腎水若酒色過度虧損足三陰
而致喘脹痰湧二便不調或大小便道相牽作
痛者亦宜用此丸多有生者○一富商飲食起
居失宜大便乾結常服潤腸等丸後胸腹不利
飲食不甘口乾體倦發熱吐痰服二陳黃連之
類前症益甚小便滴瀝大便泄瀉腹脹少食服
五苓藿麥之類小便不通體腫喘嗽用金匱腎
氣丸補中益氣湯而愈○一儒者失於調養飲
食難化胸膈不利或用行氣消導藥咳嗽喘促

用行氣化痰肚腹漸脹用行氣分利睡卧不能
兩足浮腫小便不利大便不實肺腎脉浮大按
之微細兩寸皆短朝用補中益氣湯加薑附夕
用金匱腎氣丸加骨脂肉果各數劑諸症漸愈
再佐以八味丸兩月乃能步履却服補中八味
半載而康

氣虛補氣用四君子湯血虛補血用四物湯虛甚
者俱加熟附子蓋四君四物皆和平寬緩之劑須
得附子健胃之劑行之方能成功附子熟藥本不

可輕用但當病雖在暑熱時月亦可用也予嘗治
一僕人五月間病熱口渴唇乾譫語診其脉細而
遲用四君子湯加黃芪當歸芍藥熟附子進一服
熱愈甚狂言狂走或曰附子差矣診其脉如舊仍
增附子進一大服遂汗出而熱退脉還四至矣又
嘗治一婦人亦夏間病熱初用平調氣血兼清熱
和解之劑服二三服不應熱愈甚舌上焦黑脇間
有火嗽水不嚥診其脉兩手皆虛微而右手微甚
六七日內譫語撮空循衣摸床惡症俱見後用四

物湯加黃芪人參白朮陳皮麥門知母熟附子服
之一二時汗出而熱退次日復熱再服仍退又次
日復發知其虛極也遂連進十服皆加附子而安
愚按前論正所謂捨時從症捨症從脉真有定
見者也○一男子發熱煩渴頭痛誤行發汗喘
急腹痛自汗譫語用十全大補加附子治之熱
睡喚而不醒及覺諸症頓退再劑而痊○黃武
選飲食勞倦發熱惡寒誤用解表神思昏憤胸
發赤斑脉洪數而無力余曰此內傷元氣非外

邪也急用溫補之劑彼不從後果歿

飲食過傷變爲異常急暴之症人多不識嘗有一壯年人忽得暴病如中風狀口不能言語目不識人四肢不舉急服蘇合香丸不効余偶過聞之因詢其由曰適於陪客飲食後忽得此症遂教以煎生薑淡鹽湯多飲探吐之吐出數碗而醒後服白朮陳皮半夏麥芽調理而愈大抵此等症多因飲食醉飽之後或感風寒或着氣惱而致飲食填塞胃氣不行內傷特重若誤作中風中氣症而用驅

風解表行氣散氣之藥則胃氣重傷厥在旦夕內
經雖有暴病暴厥之症但恐多有因於食者前輩
不曾明言故人不識耳今後遇有此等急症須要
審問明白若方飲食醉飽或累傷飲食重復受傷
但覺胸膈有食滯只作傷食治之

愚嘗治趙吏部患吐物出皆酸味其脉氣口大
於人迎者二三倍僚友速余投劑余曰此實邪
在上候其吐盡酸味不藥自愈翌早吐止而安
○一婦人飲食後因怒忽患血崩四肢逆冷抽

搐口禁如發瘕然吐痰如湧灌以二陳柴胡山
梔枳殼吐出酸味神思稍醒藥止次日進薄粥
少許但乳脇脹痛寒熱欲嘔四肢倦怠余以爲
悉屬肝火熾盛致脾氣不能運化先用六君柴
胡山梔釣藤鉤諸症頓退惟四肢不遂血崩如
初或又以爲肝火未息欲投清肝涼血之劑余
以爲肝脾氣血俱弱先用補中益氣湯培其脾
土而血氣歸經又用四物參朮柴胡養肝筋而

四肢便利

餘見異症名要

久頭痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得效誤認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火涼血爲主而佐以辛溫散表之劑以從法治之則病可愈而根可除也

愚按前症多主於痰痛甚者乃風毒上攻有血

虛者有諸經氣滯者有氣虛者有四氣外傷有
勞役所傷有可吐者有可下者當分虛實寒熱
兼變而治之若夫偏正頭風久而不愈必內挾
痰涎風火鬱遏經絡氣血壅滯甚則目昏緊小
二便秘澁宜破出其血以開鬱解表余嘗治尚
寶劉毅齋但怒則兩太陽作痛先用小柴胡加
茯苓山梔後用生味以生腎水而不再發○
譚侍御每頭痛吐清水不拘冬夏吃薑便止
余作中氣虛寒則六君當歸黃芪木香炮薑而

癆○商儀部勞

頭痛余作陽虛不能上升以

補中益氣加蔓荊

子而痊

眼赤腫痛古方用華

內外不同在內湯散用苦寒

辛涼之藥以瀉其火

在外點洗則用辛熱辛涼之

藥以散其邪故

莫要於冰片而冰片大辛熱

以其性辛甚故借以拔出火邪而散其熱氣古方

用燒酒洗眼或用乾薑末生薑汁點眼者皆此意

也蓋赤眼是火邪內炎上攻於目故內治用苦寒

之藥是治其本如鍋底之去薪也然火邪既客於

日從內出外若外用寒涼以阻逆之則鬱火內攻
不能散矣故點眼用辛熱而洗眼用熱湯是火鬱
則發因而散之從治法也世人不知冰片爲劫藥
而誤認爲寒常用點眼遂致積熱入目而昏暗瘴
翳故云眼不點不瞎者此也又不知外治忌寒涼
而妄將冷水冷物冷藥挹洗致昏瞎者有之

愚按前症若體倦少食視物昏花或飲食勞倦
益甚者脾胃虛也川補中益氣湯多緊瀉赤
肝貫睛或臟腑秘結者用芍藥清肝丸若赤翳

布白畏日羞明或痛如刺者上焦風熱也用黃
連飲子若久視生花畏日遠視如霧者神氣傷
也用神效黃芪湯大凡午前甚而作痛者東垣
助陽活血湯午後甚而作痛者黃連天花粉丸
午後甚而不痛者東垣益陰腎氣丸能近視不
能遠視地芝丸能遠視不能近視定志丸故東
垣先生云五臟六腑之精氣皆稟受於脾上貫
於目脾者諸陰之首也目者血脈之宗也故脾
氣則五臟之精氣皆失所司不能歸明於目矣