



南京中医药大学图书馆版权所有  
1991

補秋燥勝氣論

按前所序之秋燥方論。乃燥之復氣也。標氣也。蓋燥屬金而克木。木之子少陽相火也。火氣來復。故現燥熱乾燥之證。又靈樞謂丙丁爲手之兩陽。合明辰巳爲足之兩陽。合明陽明本燥標陽也。前人謂燥氣化火。經謂燥金之下。火氣承之。皆謂是也。案古方書無秋燥之病。近代以來。惟喻氏始補燥氣論。其方用甘潤微寒。葉氏亦有燥氣化火之論。

其方用辛涼甘潤乃素問所謂燥化於天熱反勝之治以辛涼佐以苦甘法也。瑭襲前人之舊故但

瑭

襲前人之舊故但

叙燥證復氣如前書已告成。

竊思與素問燥淫所

勝不合故雜說篇中特著燥論一條詳言正化對

化勝氣復氣以補之其於燥病勝氣之現於三焦

者究未出方論乃不全之書心終不安嗣得沈目

南先生醫徵溫熱病論內有秋燥一篇議論通達

正大茲採而錄之於後間有偏勝不圓之處又詳

辨之。並特補燥證勝氣治法如左。

再按勝復之理與正化對化從本從標之道近代以來多不深求註釋之家亦不甚考如仲景傷寒論中之麻桂薑附治寒之勝氣也治寒之正化也治寒之本病也白虎承氣治寒之復病也治寒之對化也治寒之標病也餘氣俱可從此類推太陽木寒

標熱對化爲火蓋水勝必克火故經載太陽司人心病爲多未總結之曰病本於心心火受病必克金白虎所以救金也金受病則堅剛牢固滯塞不通復氣爲土土性壅塞反來克本身之真水承氣

所以泄金與土而救水也。再經謂寒淫所勝以酸瀉之。從來註釋家不過隨文釋義。其所以用方之故。究未達出。本論不能遍註。傷寒偶舉一端。以列其餘。明者得此門徑。熟玩內經。自可迎刃而解。傷寒其於本論。自無難解者矣。由是推之。六氣皆然耳。

沈目南燥病論曰。天元紀大論云。天以六爲節。地以五爲制。蓋六乃風寒暑濕燥火爲節。五卽木火土金水爲制。然天氣主外。而一氣司六十日有奇。地運主內。而一運主七十二日有奇。故五運六氣合行。而終一歲。乃了然不易之道也。內經失去長

汪按此  
論半正  
通達發  
前人所

本發徂  
所立方

用藥仍  
不免襲

吃清涼

時氣不

稱燥

方  
前人賓  
曰平溫  
表散與  
寒涼雜  
用故有  
此論而  
不用其  
方

哲雖有言之。皆是內傷津血乾枯之證。非謂外感。

清涼時氣之燥。然燥病起於秋分以後。小雪以前。

陽明燥金涼氣司令。經云陽明之勝。清發於口。左

胠腋痛。溏泄。內爲隘塞。外發癩疵。大涼肅殺華英。

改容毛蟲乃殃。胸中不便。隘塞而欬。據此經文。燥令必有涼氣感人。則木受邪而爲燥也。惟近代喻嘉言。昂然表出。可爲後世蒼生之幸。奈以諸氣膾

如華佗傳  
時作仲華  
解

得之次熱則  
次寒則不  
可

欬諸痰喘嘔。然不止而出白血。死謂之燥病。此乃  
傷於內者而言。誠與外感燥證不相及也。更自  
清燥救肺湯皆以滋陰清涼之品施於火熱刑金。  
肺氣受熱者宜之。若治燥病則以涼投涼必反。  
病劇殊不知燥病屬涼。謂之次寒病。與感寒同類。  
經以寒淫所勝。治以甘熱。此但燥淫所勝。平以苦  
溫。乃外用苦溫辛溫解表。與冬月寒令而用麻桂  
薑附其法不同。其和中攻裏則一。故不立方。蓋內

分对而宜圖  
乃作時之監  
腎乃作醫論  
易用此法笑

經六氣但分陰陽主治。以風熱火三氣屬陽同治。

但藥有辛涼苦寒。鹹寒之異。濕燥寒三氣屬陰同

治。但藥有苦熱苦溫甘熱之不同。仲景所以立傷

寒溫病二論爲大綱也。蓋性理大全。謂燥屬少陰。

奈後賢悉謂屬熱。大相徑庭。如盛夏者熱甚。則

燥乃初秋矣。天酷日燥烈。云時多流乃深秋。

金風肅殺。清涼之財。克二暑。

劃無不妙。生

非矣。

按先生此論可謂獨具隻眼不爲流俗所汨沒者。其責喻氏補燥論用甘寒滋陰之品殊失燥淫所勝平以苦溫之法亦甚有理但謂諸氣膾<sub>中藥書</sub>管諸痰喘嘔欬不止出自血盡屬內傷則與理欠圓蓋田內傷而致此證者固多由外感餘邪在絡轉化轉熱而致此證者亦復不少。<sub>瑭</sub>前於風溫欬嗽條下駁杏蘿散補桑菊飲方論內經言欬久留邪致指

之故與此證同一理也。謂清燥救肺湯治燥之復氣，斷非治燥之勝氣。喻氏自無從致辨。若謂其燥不相及，未免各就一邊談理。蓋喻氏之清燥救肺湯卽傷寒論中後半截之復肺湯也。傷寒必兼母氣之燥，故初用辛溫甘熱，繼用辛涼苦寒，終用甘潤。因其氣化之所至而然也。至謂仲景立傷寒溫病二大綱，如素問所云寒暑六氣，暑統風火，寒統燥濕，一切外感皆包於內。其說尤不盡然。蓋尊

信仲景太過而失之矣若然則仲景之書當名六  
氣論或外感論矣何以獨名傷寒論哉蓋仲景嘗  
自著書原爲傷寒而設並未遍著外感其論溫論  
暑論濕偶一及之也卽先生亦補醫徵溫熱病論  
若係全書何容又補哉瑭非好辨恐後學眉目不  
清尊信前輩太過反將一切外感總混入傷寒論  
中此近代以來之大弊禍未消滅尙敢如此立論  
哉。

不通之論

汪按謂善讀仲景之書不獨可以治傷寒並可以治六氣則是謂仲景之書已包六氣在內則非  
曰秋燥之氣輕則爲燥重則爲寒化氣爲濕復氣爲  
火

揭燥氣之大綱兼叙其子母之氣勝復之氣而燥  
氣自明重則爲寒者寒水乃燥金之子也化氣爲  
濕者土生金濕土其母氣也至真要大論曰陽明  
厥陰不從標本從乎中也又曰從本者化生於本

從標本者有標本之化從中者以中氣爲化也按  
陽明之上燥氣治之中見太陰故本論初未著燥  
金本氣方論而於瘧疾等證附見於寒濕條下葉  
氏醫案謂伏暑內發新涼外加多見於伏暑類如  
仲景金匱多見於腹痛瘧疾門中

二燥傷本臟頭微痛惡寒咳嗽稀痰鼻塞嗌塞脈弦  
無汗杏蘇散主之

木臟者肺胃也經有嗌塞而欬之明文故上焦之

病自此始。燥傷皮毛。故頭微痛惡寒也。微痛者不似傷寒之痛甚也。陽明之脈上行頭角。故頭亦痛也。咳嗽稀痰者。肺惡寒。古人謂燥爲小寒也。肺氣燥氣所搏。不能通調水道。故寒飲停而咳也。鼻塞者。鼻爲肝竅。嗌塞者。嗌爲肺系也。脈弦者。寒兼飲也。無汗者。涼搏皮毛也。按杏蘇散減小青龍一等。此條當與下焦篇所補之痰飲數條參看。再杏蘇散乃時人統治四時傷風咳嗽通用之方。本論前

於風溫門中已駁之矣。若傷燥涼之咳，治以苦溫。  
佐以甘辛。正爲合拍。若受重寒夾飲之咳，則有  
龍。若傷春風與燥已化火無痰之證，則仍從  
飲桑杏湯例。

杏蘇散方

杏蘇散用前半疾

甘桔姜東併枳橘

蘇葉

半夏

茯苓

甘草

前胡

苦桔梗

枳殼

生薑

橘皮

大棗

去核

杏仁

加減法無汗脈弦甚或緊者加羌活微透汗汗後咳  
不止去蘇葉羌活加蘇梗兼泄瀉腹滿者加蒼朮厚  
朴頭痛兼眉稜骨痛者加白芷熟甚加黃芩泄瀉腹  
滿者不用。

方論

此苦溫甘辛法也外感燥涼故以蘇葉前胡

辛溫之輕者達表無汗脈緊故加羌活辛溫之重  
者微發其汗甘桔從上開枳杏前芩從下降則嗌  
塞鼻塞宣通而咳可止橘半茯苓逐飲而補肺胃

之陽以白芷易原方之白术者。白术中焦脾藥也。  
白芷肺胃本經之藥也。且能溫肌肉而達皮毛。  
棗爲調和營衛之用。若表涼退而裏邪未除。咳不  
止者。則去走表之蘇葉。加降裏之蘇梗。泄濁腹滿  
金氣太實之裏證也。故去黃芩之苦寒。加术朴之  
苦辛溫也。

如傷燥如傷寒太陽證。有汗不咳不嘔不痛者桂枝  
湯小和之。