

濟陰綱目卷之九

關中 武之望叔卿父輯著 武林 張文嘉仲嘉父訂正

西陵 汪 淇懌漪子箋釋 天都 查 望于周父叅閱

胎前門下

○傷食

大全曰。經云。飲食自倍。腸胃乃傷。又云。陰之所生。本在五味。陰之五宮。傷在五味。若妊子。飲食不節。生冷毒物。恣性食噉。致傷脾胃。故娠傷食。最難得藥。唯木香丸。白朮散。二方最穩捷。

薛氏曰。東垣先生云。脾胃之氣壯。則過時而不饑。多食而不傷。蓋胃主司納。脾主消化。五臟之本也。然食倍而傷者。乃脾氣虛而不

化也。若投以峻劑，則脾胃復傷而胎亦損矣。當審其所因而調治之。若飲食停滯，或肚腹作痛，用平胃散。腹滿泄瀉，用六君子湯。若脾氣下陷，用補中益氣湯。凡噯覺藥氣，且戒藥餌，節飲食。經云：損其脾者，調其飲食，適其寒溫。大凡脾胃虛弱，飲食難化，以白朮、陳皮爲末，等分，陳麴糊丸。常服最善。枳朮丸，但可暫用。枳實峻厲，能耗真氣，治者慎之。

一妊婦因停食，服枳朮丸，胸腹不利，飲食益少。更服消導寬胸之劑，其胎下墜。余謂此脾氣虛而不能承載也，用補中益氣及六君子湯，中氣漸健，其胎漸安。又用八珍湯，加柴胡、升麻調理而痊。

平胃散 治妊娠飲食停滯，或肚腹作痛。

蒼朮

米泔浸炒

厚朴

薑製

陳皮

各一錢

甘草

炙五分

右剉加生薑三片棗一枚水煎服

嘔吐惡心加枳殼砂仁

吞酸暖腐加黃連三分吳茱萸二分

六君子湯 治脾胃虛弱飲食難化或腹滿泄瀉

人參

白朮

茯苓

甘草

炙

半夏

陳皮

各一錢

右剉加生薑三片棗一枚水煎服

停滯肉食加山楂

停滯麵食倍加麥蘖

停滯糯米食用白酒麴一味

停滯米飲倍加穀藥

魚腥所傷倍加陳皮

傷辛熱之物加黃連

傷生冷之物加砂仁木香如不應更加肉豆蔻補骨脂再不應

用四神丸

水香丸 治妊娠脾胃虛弱飲食不消肚腹膨脹或嘔吐泄瀉

木香 二錢

三稜

人參

白茯苓

各三錢

右為末麵糊丸如菉豆大每服三四十丸熱水下

白朮散 治妊娠脾胃虛弱氣不調和飲食易傷

白朮 炒

紫蘇 各一兩

人參

白芷

炒各七錢半

佐紫蘇白朮調和胃氣妙

三稜犯胎忌與人參通用或無益亦須看人強弱

俗謂疔腸沙卽此

溫行惡氣

川芎

訶子皮

青皮各半兩

甘草炒二錢半

右每服二錢加生薑三片水煎服

大全云夫妊娠忽然心腹刺痛悶絕欲死者謂之中惡蓋邪惡之氣中于胎而傷人也所以然者血氣自養而為精神之主若血氣不和則精神衰弱故邪毒之氣得以中之妊娠病此亦致損胎也薛氏曰前證當調補正氣為善用金銀藤一味煎湯飲之

當歸散 治妊娠中惡心腹疔痛

當歸

丁香

川芎

各三兩

青橘皮

吳茱萸

半兩太梗湯泡三次炒黑

右為細末溫酒調下一錢無時

又方

中惡治宜芳香
此用地黃不無
滯膈然亦有因
血病者須此為
法

生乾地黃一兩

枳殼

木香各七錢半

右為細末每服一錢酒調下

又方

苦梗

一兩細剉畧炒

生薑半兩

水煎服之

散滯湯 治觸惡冒氣傷胎肚痛手不可近不思飲食

青皮三錢

黃芩

芍藥各二錢

歸尾一錢半

川芎一錢

木香五分

甘艸炙少許

右分二貼水三盞先煮芎根兩大片至二盞去芎根入前藥同煎至一盞熱服

此真中惡也者
艾芳極妙

補遺方 治妊娠中惡心腹絞急切痛如鬼擊之狀不可按摩或

吐衄血者

用熟艾如拳大煮汁頻服

一方用鹽一盞水二盞調和服以冷水嚥之吐出即安
一方用竈心土爲末每二錢井水調服白湯亦可

○傷寒

吳氏曰凡妊娠傷寒六經治例皆同但要安胎爲主凡藥中有犯
胎者則不可用也如藿香正氣散十味芩蘇散參蘇飲小柴胡湯
之類有半夏能犯胎如用須去之若痰多嘔逆必用之以半夏麴
則可如無沸湯泡七次去皮臍生薑自然汁拌晒乾乃可用也凡

川烏附子天雄側子肉桂乾薑大黃芒硝芫花甘遂大戟蜀漆水
蛭蟲麋仁牡丹皮乾漆代赭石瞿麥牛膝等類之物皆動胎之
藥凡用必須斟酌仔細詳之大抵妊娠傷寒合用湯劑必加黃芩
白朮二味能安胎也或與此二味煎湯與之或為細末白湯調下
二三錢亦佳如妊婦素稟弱者藥中四物湯佐之不可缺也且如
用小柴胡去半夏加白朮合四物湯用之可以保胎除熱也其効
如神餘皆倣此用之則妙矣

汗下和三法固
成法也而主以
香蘇黃龍三黃
解毒三方則發
前人所未發矣
妙甚

萬密齋云妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各宜隨其五
臟表裏所見脉證主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散為主半
表半裏則和解之以黃龍湯為主在裏則下之以三黃解毒湯為

先服安胎雖是大頭胎然表症重者須斟酌

至此吾家傳之秘活人甚多如古方六合湯雖分治詳明猶不及

此切當

古方六合湯自表虛四物湯至四物大黃湯共計十五方詳見第一卷調經門四物湯加減條下

白朮散

治傷寒熱病先以此安胎但覺頭痛發熱便可服二三

服即瘥若四肢厥逆陰證也不可用

白朮

黃芩

各等分新瓦上炒

右細切每三錢加生薑三片大棗一枚水煎服

安胎阿膠散

治妊娠傷寒時氣先服此以安胎却以主藥間服

阿膠

白朮

桑寄生

人參

白茯苓

各等分

右為末每服一錢用糯米飲調下日三服

香蘇散

凡妊婦傷寒勿論日數但見惡寒頭疼此主之

香附炒黑

紫蘇各二錢

陳皮一錢

甘艸五分

右剉加生薑三片葱五根煎服

頭痛加川芎白芷各一錢名芎芷香蘇散

假令得肝脉其外證善潔面青善怒其三部脉俱浮而弦惡寒裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一錢謂肝主風是膽受病也

假令得心脉其外證面赤口乾善笑其三部俱浮而洪惡寒裡和本方加黃芩石膏各一錢半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脉面黃善噫善思尺寸俱浮而緩惡寒裏和本方加白朮防已各一錢半謂脾主濕是陽明受病也

附子雖云犯胎然御景附子湯亦治胎寒但須真寒方可酌用

假令得肺脉。其外證面白。善噦。善悲。不樂。欲哭。其尺寸脉俱浮。而濇。惡寒。裏和本方加黃耆。防風各一錢。謂肺主燥。是大腸受病也。

假令得腎脉。其外證面黑。善恐。其尺寸脉俱浮。而濡。惡寒。裏和本方加附子炮一錢。謂腎主寒。是膀胱經受病也。附子犯胎禁也。可用吳茱萸溫之。

羌活湯。河間云。解利傷寒。不問何經所受。雖不能盡解。亦無壞證。尤益妊婦。

羌活 二錢

白朮 一錢半

防風

川芎

白芷

黃芩

甘草

炙各一錢

細辛 三分

黃龍湯即小柴
胡或半夏為少
陽經藥而此專
重在和解故主
之其加減法更
妙

右剉水煎服無時○如無汗白朮用蒼朮加紫蘇亦可

黃龍湯

妊婦傷寒得之三五日後有惡寒發熱內有煩渴引飲
小便赤澀之證此邪在半表半裏也宜此方主之

柴胡二錢

黃芩一錢半

人參

甘艸各一錢

右加薑棗水煎服

如寒熱往來無汗口乾加葛根二錢白朮二錢人參白三根

如頭疼不止加川芎白芷各一錢白朮加葱白三根

如發熱有汗口渴加白朮括蕤根各一錢半

如脉浮大力大熱大渴本方人參白虎湯加薑棗

如心煩不得臥加白茯苓麥門冬各一錢

如嘔噦加半夏製白茯苓各一錢玄棗

如胸膈滿痛加枳殼炒香附子炒黑川芎各一錢

如大便秘初加大黃五分得利則止不利加一錢以利爲度

三黃解毒湯

妊娠傷寒五六日後表邪悉罷並無頭疼惡寒之

證止煩躁發熱大渴小便赤大便秘或利下赤水六脉沉實此病邪在裏也宜此方主之

黃芩

黃連

黃檗

山梔

大黃

各等分

右剉水煎服更隨五臟脉證加減

假令得肝脉其內證煩滿消渴溲便難尺寸脉沉弦有力是肝

經本臟受病也本方加當歸一錢半甘艸五分倍山梔

既寒逆矣又主
三黃雖加乾姜
恐終未妥酌之

傷風自汗如頭
疼邪盛者此方
尚當斟酌

假令得心脉其內證煩躁心痛掌中熱而噦尺寸脉沉數有力
是心經本臟受病也本方加麥門冬一錢竹茹一團倍黃連
假令得脾脉其內證腹脹滿譫妄其脉沉緩有力是脾經本臟
受病也本方加枳實炒厚朴薑汁炒各一錢半倍大黃
假令得肺脉其內證喘咳胸滿尺寸脉沉濇有力是肺經本臟
受病也本方加葶藶炒一錢桔梗五分倍黃連
假令得腎脉泄如下重足脛寒而逆尺寸脉沉而石是腎經本
臟受病也加乾薑炮五分熟地黄一錢半倍黃檗

黃耆解肌湯

治妊娠傷風自汗

人參

黃耆

當歸

川芎

甘草

炙各
半兩

芍藥

六錢

桂能墮胎宜火
焙用

裏虛者宜

右咬咀每服八錢水煎服○加蒼朮生地黃亦可

桂枝芍藥當歸湯

治婦人有孕傷寒脉浮頭重腹中切痛宜此

方

桂枝

芍藥

當歸

各一兩

右剉細每服一兩水煎服

芍藥湯

治婦人妊娠傷寒自利腹中痛食飲不下脉沉者太陰

病也宜此方

芍藥

白朮

茯苓

甘草

各一兩

右剉每服一兩水煎服

加減當歸六黃湯

治妊婦傷寒發汗後汗漏不止胎氣損者

當歸身 黃蓍炙 生地黄 黃芩

白芷 阿膠珠 炙甘草 各等分

煎法妙

右用浮小麥一撮煎湯去麥下藥五錢煎七分溫服

加味黃芩湯 治妊婦傷寒下後協熱而利不止胎氣損者

黃芩二錢 白芍藥 白朮 白茯苓

炙甘草 阿膠 各一錢

右用水一盞半煎一盞後入阿膠再煎八分服

加味竹葉湯 妊婦汗下後熱不除者虛也此方主之

人參 麥門冬 炙甘草 阿膠 生地黄 各一錢

右加竹葉十二片粳米一合煎服

此竹葉石膏湯
變法也以阿膠
生地黄知母石
膏妙甚

黃龍四物湯 治妊婦傷寒瘥後發熱者宜此方

柴胡 二錢

黃芩 一錢半

人參

甘草

當歸

川芎

芍藥

地黃 各一錢

右剉水煎服。○若因於食者本方加枳實。

加減四物湯 治妊婦傷寒熱極發斑狀如錦紋者

當歸

白芍藥

生地黄

黃芩 各等分

右剉每服八錢水煎服。

梔子大青湯 治妊婦傷寒發斑變為黑色

升麻

黃芩

梔子 各二兩

大青

杏仁 各半兩

右咬咀每服五錢水一盞半細切葱白三寸煎服。