

春

庚申年

產後編上

內附四十  
三症

產後編上

共四十三症

陽曲傅青主徵君手著

產後總論

凡病起於血氣之衰脾胃之虛而產後尤甚是以丹溪先生論產後必大補氣血爲先雖有他症以未治之斯言盡治產之大旨若能擴充立方則治產可無過矣夫產後憂驚勞倦氣血暴虛諸症乘虛易入如有氣母專耗散有食母專消導熱不可用芩連寒不可用桂附寒則血塊停滯熱則新血崩流至若中虛外感見三陽表

症之多似可汗也在產後而用麻黃則重竭其陽見三  
陰裏症之多似可下也在產後而用承氣則重亡陰血  
耳聾脇痛乃腎虛惡露之停休用柴胡譴語出汗乃元  
弱似邪之症非同胃實厥由陽氣之衰無分寒熱非大  
補不能回陽而起弱瘕因陰血之虧不論剛柔非滋榮  
不能舒筋而活絡乍寒乍熱發作無期之症似瘧也若  
以瘧治遷延難愈言論無倫神不守舍病似邪也若以  
邪治危亡可待去血過多而大便燥結肉莖蓉加於生  
化非潤腸承氣之能通去汗過多而小便短澀六君子

倍加參芪必生津助液之可利加參生化湯頻服救產  
後之危長生活命丹屢用甦絕穀之人癩痢脫肛多是  
氣虛下陷補中益氣之方口噤拳攣乃因血燥類風加  
參生化之劑產戶入風而痛甚服宜羌活養榮湯玉門  
傷涼而不閉洗宜麻兒黃硫散怔忡驚悸生化湯加以  
定志似邪恍惚安神丸助以歸脾因氣而悶滿虛煩生  
化湯加木香爲佐因食而噯酸惡食六君子加神麴麥  
芽爲良蘇木義術大能破血青皮枳壳最消滿脹一應  
耗氣破血之劑汗吐宣下之法止可施諸壯實豈宜用

於胎產大抵新產後先問惡露如何塊痛未除不可遽  
加參朮腹中痛止補中益氣無疑至若亡陽脫汗氣虛  
喘促頻服加參生化湯是從權也又如亡陰火熱血崩  
厥暈速煎生化原方是救急也王太僕云治下補下治  
以急緩緩則道路達而力微急則氣味厚而力重故治  
產當遵丹溪而固本服法宜效太僕以頻加凡付生死  
之重寄須著意於極危欲求俯仰之無虧用存心於愛  
物此雖未盡產症之詳然所聞諸症皆接近鄉治驗爲  
據亦未必無小補云

# 正產

正產者有腹或痛或止腰脇酸痛或勢急而胞未破名  
弄胎服八珍湯加香附白安有胞破數日而痛尙緩亦  
服上藥俟之

# 傷產

傷產者胎未足月有所傷動或腹痛或臍痛或服催生  
藥太早或產母努力太過逼兒錯路不能正產故臨月  
必舉動從容不可多睡飽食飲酒但覺腹中動轉卽正  
身仰臥待兒轉順與其臨時費力不若先時慎重

調產

調產者產母臨月擇穩婆辦器用備參藥產時不可多人喧闐二人扶身或憑物站心煩用滾水調白密一匙獨活湯更妙或饑服糜粥少許勿令饑渴有生息未順者只說有雙胎或胎衣不下勿令產母驚恐

催生

催生者因坐草太早困倦難產用八珍湯稍佐以香附乳香以助血氣胞衣早破漿血已乾亦用八珍湯

凍產

凍產者天寒血氣凝滯不能速生故衣裳宜厚產室宜  
煖背心下體尤要

### 熱產

熱產者暑月宜溫涼得宜若產室人衆熱氣蒸逼致頭  
痛面赤昏暈等症宜飲清水少許以解之然風雨陰涼  
亦當避之

### 橫產

橫產者兒居母腹頭上足下產時則頭向下產母若用  
力逼之胎轉至半而橫當令產母安然仰臥令其自順

穩婆以中指挾其肩勿使臍帶羈絆用催生藥努力卽生

當歸

紫蘇 各三錢

長流水煎服卽下

一方用好京墨磨服之卽下

一方用敗筆頭一個火銀以藕節自然汁調服之卽

下

一方用益母草六兩濃煎加童便一大杯調服卽下

盤腸產

盤腸產者產則子腸先出然後生子其腸或未卽收以

草麻子四十九粒研碎塗頭上腸收急急洗去遲則有  
害又方止用四十粒去皮研爲膏塗頂中收卽域之如  
腸燥以磨刀水潤之再用磁石煎湯服之須陰陽家用  
過有驗者

### 難產

難產者交骨不開不能生產也服加味芎歸湯良久卽  
下

小川芎當歸

各一兩敗龜版

一個酒炙

婦人髮灰

一握

須

用生過男女者爲末水一鍾煎七分服

死產

死產者子死腹中也驗母舌青黑其胎已死先用平胃散一服酒水各一鍾煎八分投朴硝煎服卽下用童便亦好後用補劑調理

下胞

胞衣不下用滾酒送下失笑散一劑或益母丸或生化湯送鹿角灰一錢或以產母髮入口作吐胞衣卽出有氣虛不能送出者腹必脹痛單用生化湯

全當歸 一兩  
川芎 三錢  
白朮 一錢  
香附 一錢

加人參 三錢 更妙用水煎服

一方用草麻子二兩雄黃二錢研膏塗足下湧泉穴  
衣下急速洗去

### 平胃散

南蒼朮

米泔水浸炒

厚朴

薑炒

陳皮

炙草

各二錢

共爲粗末或水煎或酒煎煎成時加朴硝二錢再煎一

二沸溫服

### 失笑散

五靈脂

蒲黃

俱研爲細末每服三錢熱酒下

斷臍

斷臍必以絲裹咬斷爲妙如遇天寒或因難產母子勞倦宜以大麻油紙燃徐徐燒斷以助元氣雖兒已死令

滑胎散

臨月常服數劑以便易生

當歸

三五錢

川芎

五七錢

杜仲

二錢

熟地

三錢

枳壳

七分

山藥

二錢

水二鍾

煎八分食前溫服

如氣體虛弱人加人參白朮隨宜服之如便實多滯

者加牛膝二錢

治產秘驗良方

治橫生逆產至數日不下一服卽下有未足月忽然胎動一服卽安或臨月先服一服保護無虞更能治胎死腹中及小產傷胎無乳者一服卽如原體

全當歸

川芎

各一錢五分

川昇

一錢去心

荆芥穗

黃芪

各八分

厚朴

薑炒

蘄艾

紅花

各七分

兔絲子

一錢二分

白芍

一錢二分冬月不用

枳壳

六分麩炒

羌活

六分麩炒

甘草

五分

以上十三味只用十二味不可加減安

胎去紅花催生去蘄艾用井水鍾半薑二片爲引熱

服渣用水一鍾煎半鍾熱服如不好再用水一鍾煎半鍾服之卽效不用二劑

催生兔腦丸 治橫生逆產神效

臘月兔腦髓 一個 母丁香 一個 乳香 一錢 麝香 一分

另研

兔腦爲丸芡實大陰乾密封用時以溫酒送下一丸

### 奪命丹

臨產未產時目反口噤面黑唇青口中吐沫命在須臾

若臉面微紅子死母活急用蛇退 蚕故子 燒灰不存

性 髮灰 一錢 乳香 五分 共爲細末酒下

加味芎歸湯 治子宮不收產門不開

人參 二錢

黃芪 一錢

川芎 一錢

當歸 二錢

升麻 八分

炙草 四分

桑子 十五粒

再不收加半

夏 八分

白芍 八分  
酒炒

### 新產治法

生化湯先連進二服若胎前素弱婦人見危症熱症  
墮胎不可拘貼數服至病退乃止若產時勞甚血崩  
形脫卽加入參三四錢在內頻服無虞若氣促亦加  
人參加參於生化湯者血塊無滯不可以參爲補而

唐衍綱一  
弗用也有治產不用當歸者見偏之甚此方處置萬  
全必無一失世以四物湯治產地黃性寒滯血芍藥  
微酸無補伐傷生氣誤甚

產後用藥十誤

一因氣不舒而誤用耗氣順氣等藥反增飽悶陳皮  
用至五分禁枳實厚朴

二因傷氣而誤用消導反損胃氣至絕穀禁枳壳大  
黃蓬稜麴朴

三因身熱而誤用寒涼必致損胃增熱禁苓連梔柏