

活人慈航



八十二



初生如粟黃皤一點皮色紫暗猶如煮熟紅棗黑氣浸腐爛延開五指相傳甚則攻於臍面痛如湯發火燃真氣雖異香難解由膏梁藥酒及房術丹石熱藥以致陽精燭或淫火猖狂蘊蓄於臟腑消燦陰液而成斯時血死心敗皮死肺敗筋死肝敗肉死脾敗骨死腎敗此五敗症雖遇靈丹亦難獲效古法毒在肉則割毒在骨則切割之法須宜早施乘其未及延散時用切法十症中可保三四按未發之前躁渴時即宜大貼六味地黃湯以救腎陰初生如粟時便用艾壯灸之至肉枯瘡死用紫金錠內服外塗兼服護心散蠟礬丸解毒濟生湯若毒氣延散腐臭則不治矣

解毒濟生湯

當歸

遠志

川芎

花粉

柴胡



黃芩

犀角

麥冬

知母

黃柏

茯神

銀花

各示紅花

甘草

牛夕

各五分

童便

冲服

其餘方法未抄

敦疽多生足指而手指亦間有生者由膏梁太過則損脾房

勞太過則損腎精血涸竭更兼溼熱塵盛而成初起黃粟

小胞痛如湯發火燃其色紅活腫無黑暈潰破有膿腐無

敗色此屬血脉未死之候然此症雖無敗色亦由臟腑發

出未可視為小毒也初服解毒濟生湯六味地黃湯外塗

紫金錠將潰貼已膏腐之終禁灸法

甲疽因割剪指甲傷肉或甲長侵肉穿窄小靴鞋以致甲傍

焮腫破爛時津黃水旁肉獨突疼痛難忍不能着衣原係

好肉受傷宜用鹽湯燙洗之紫金膏塗之膏藥蓋之旁肉

消盡則愈

足跟疽生足跟由臟腑積熱汗出涉水遠行傷筋而成
紅紫疼痛潰破膿水淋漓狀如兔咬經云兔齧狀如赤
至骨急治遲則害人蓋謂毒之深惡也屬足太陽經申脉
穴即陽蹻脉發源之所又係腎經所過之路瘡口久潰不
合陽蹻脉氣不能冲發腎氣由此漏洩以致患者益虛初
起宜蒜片灸服活命飲加肉桂牛膝潰後補中益氣湯桂
附地黃丸養榮湯滋補海藏云兔齧久不愈用鹽湯洗之
白朮研末撒之一日一易謹戒一切勞碌即效

屬癰四淫生足跗兩傍小如棗栗名屬癰生足跗之上下其
大如癰名曰四淫經云發於足上下名四淫其狀大如癰
急治之百日死發於足傍名曰厲癰其狀不大急治之去
其黑者不消輒益不治百日死此二症由三陰虧損為疽
者重若兼足三陽溼熱下注而成癰者輕若紅腫疼痛潰

破有膿腐脫無黑氣侵漫屬溼熱偏盛易治若微紅微腫
潰出膿水屬陰氣凝結不能化膿難治若黑暗漫腫痛
潰膿煩熱作渴小水淋漓為陰敗惡症屬逆四淫無濕
厲癰類救疽初俱宜活命飲外用蒜灸以宣壅毒將潰
養榮湯兼六味地黃丸若色暗不痛即用桑柴火烘法
宜十全大補湯兼服桂附地黃丸或可成功若妄用苦寒
剋伐之藥多致不救外治同救疽

臭田螺由胃經溼熱下注而生腳丫破爛其患甚小其癢搔
之不能解必搯之皮爛津腥臭水覺疼時其癢方止次日
仍癢經年不愈極其纏綿法用甘草仁米煎湯洗之外敷
青蛤散（見）散（見）效

牛程蹠生足掌皮內頑硬腫起高埂色黃疼痛不能行履由
脚熱着冷水或遇寒風襲於血脉令氣滯血凝而成或走



馬尾石子腳底墊腫不能行步痛不可忍宜舊草鞋浸
尿水內一日或半日外用新磚燒紅將浸草鞋放磚上以
腫腳踏定火逼尿氣入裏即消如走長路腳腫痛者亦用
此法亦妙此症早治或有消者久則破裂腫水津流外用
花粉一味為示調酒敷腫處更以馬前生半夏紅花骨碎
補歸尾紫金皮獨活慈好醋甘草煎洗內服涼血解毒藥
甚效

土栗生足跟之傍形如棗栗殼而色黃腫若琉璃由行崎嶇
之路勞傷跟骨血脉而成宜活命飲及五香湯膿熟針之
餘按癰疽門

五香湯

乳香

藿香

丁香

沈香

青木香

各三半

冷疔生足跟由溼寒凝結而成形如棗栗起紫白皰疼痛徹

骨漸生黑氣腐爛孔深時流血水氣穢經久不愈宜桑柴
火烘法敷鐵粉散內服十宣散餘按潰瘍

鐵粉散

生鐵粉

即針砂或化鉛取末亦可

黃丹

輕粉

松香

射香

先用葱湯洗淨油調搽

腳氣瘡生於足膝由溼熱內搏滯於膚腠外為風乘不得宣
通故令足膝生瘡癢痛作腫破津黃水形類黃水瘡惟身
體壯熱心神煩躁經久難瘥宜敷龍骨散內服犀角散

犀角散

犀角

天麻

黃芩

枳殼

白蘚皮

黃芩

防風

羌活

蒺藜

楸榔

獨活

甘草

或去犀麻加黃柏苦參知母白芷蒼朮歸尾亦可



龍骨散

水龍骨

二升半可用推干代

輕粉

亦仙丹代同

栝榔

二升半

白牛屎

煨五升原方指屎根

可加黃柏二錢半

推干只用一錢

為末先用鹽湯洗令瘡淨見肉以油調敷

田螺炮

多生足掌而手掌罕見由脾經溼熱下注外寒閉塞

或因足熱涉溼冷而成形如豆粒黃炮悶脹硬疼不能着

地連生數炮皮厚難於自破傳度三五成片溼爛甚則足

跗俱腫寒熱往來法宜苦參葛蒲艾葉煎湯熱洗用針穿

破炮放出臭水貼膏藥或將炮皮剪去以石膏輕粉為末

撒之仍用膏蓋內服解毒瀉脾湯有經年不愈係下部溼

寒宜金匱腎氣丸常服甚效

解毒瀉脾湯

石膏

牛子

防風

黃芩

蒼朮



甘草

木通

施子

燈心

肉刺生腳指形如雞眼根陷肉裏頂起硬凸疼痛步履不得
或纏腳或着窄鞋遠行皆可生之法宜貼膏藥或搗玉
花根貼塗

發無定處

疥瘡如丁釘之狀其形小其根深隨處可生由恣食厚味或
中蛇蠱之毒或中疫死牛馬猪羊之毒或受四時不正之
氣疫毒致生疥瘡乃火症也迅速之病有朝發夕死隨發
隨死三五日不死一月半月亦必死且毒中有淺深也若
一時失治立判存亡有火焰疔者多生唇口及手掌指節
間初生一點紅黃小皰痛癢麻木甚則寒熱交作煩躁舌
強言語疎忽此心經火毒也有紫燕疔者多生手足腰肋
筋骨之間初生便作紫皰次日破流血水三日後串筋爛

骨蒸則日紅甲青邪視神昏睡語驚惕此肝經火毒也
黃鼓疔者初生黃皰光亮明潤四畔紅色纏繞多生
腮顴眼胞上下及太陽正面之處發時便作麻癢重則惡
心嘔吐肢體木痛寒熱交作煩渴乾穢此脾經火毒也有
白刃疔者初生白皰頂硬根突破流脂水癢痛兼作多生
鼻孔二手易腐易陷重則腮損咽焦咳吐痰涎鼻掀氣急
此肺經火毒也有黑靨疔者多生耳竅牙縫胸腹腰腎偏
僻之處初生黑斑紫皰毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如疔痛
徹骨髓重則手足青紫驚悸沈困顛陷孔深目睛透露此
腎經火毒也以上五疔本於五臟所生又有紅絲疔生於
手掌及骨節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人
寒熱往來甚則嘔吐惡心治遲者紅絲攻心常能壞人又
有暗疔未發而腋下先堅腫無頭次腫陰囊畢九突兀如
發無定處

筋頭令人寒熱拘急焮熱疼痛又有內疔先發寒熱腹痛
數日間忽然腫起一塊如積者是也又有羊毛疔身發寒
熱狀如傷寒但前後心有紅點又如疹形視其斑點
黑者為老色淡紅者為嫩以上諸症初起俱宜服蟾
汗之毒勢不盡增寒壯熱仍作者宜五味消毒飲汗
發熱口渴便閉脈沈實者邪在裏也宜解毒湯加大黃錢
半蔥頭五個下之若疔毒將欲走黃急服疔毒復生湯已
走黃者令人心煩昏憤急用七星劍以救之若手足冷六
脈暴絕者係毒氣閉塞元氣不能宣通先宜蟾酥丸隨服
木香流氣飲行氣其脈自見若疔毒誤炎煩躁譫語者乃
毒遍內攻毒亡宜解毒大青湯若潰後餘毒未盡五心煩
熱者宜清神湯針後出膿之時氣虛驚悸者宜安神散若
攻利太過以致發渴六脈虛大者宜養榮湯補之凡疔潰



後不宜補早雖見真虛只可平補忌用溫補之藥也

用藥針灸亦當循其次第書云疔瘡先刺血內毒宜

禁灸不禁針怕綿不怕鐵初覺貴乎早治十症十全稍遲

者十全五六失治者十壞八九初發必用銳針刺入瘡心

四五分挑斷疔根令出惡血隨用蟾酥條插入孔內如旁

腫頑硬推之不動用針亂刺硬處令出惡血否則必致走

黃僻處不能用針者則當灸灸以殺其勢挑法先用針幹

將毒頂焦皮刮開針入疔根堅硬如鐵者為順若針刺入

綿軟如瓜穰而不知痛者為逆百無一生凡挑疔根先出

紫黑血再挑至鮮血出以知痛為止隨入蟾酥條

即蟾酥如麥粒許大

用針送外入根處用溼紙貼數重過三四時撥去舊藥易以新藥若

藥乾無水不痛者此挑法未斷疔根也再深挑之必以上

藥知痛藥入水流為度若腫用帽哩葉燒灰加胡椒少許

發無定處疔瘡

信下之下

一百〇二泉記外科

調油敷極效或金黃散調酒敷三四日後疔根腐爛貼膏
藥收口若初起失治或房勞夢遺損氣以致毒氣內攻疔
黃不住者其瘡必塌陷急當隨走黃處按經找尋有一
刺直豎即是疔苗急當用針刺出惡血即在刺處用艾
三壯宣餘毒若身面漫腫神昏悶亂乾嘔心煩作渴遍身
起蛇抽搐者俱為逆症惟紅絲疔於初起時急用磁針於
紅絲盡處砭斷出血尋至初起瘡上挑破插入蟾酥條貼
膏藥隨服黃連解毒湯再暗疔內疔不用挑法用蟾蘇丸
含化令盡以冷水漱去毒涎再三丸葱酒送下蓋臥出汗
少時無汗再用熱葱湯催之仍無汗係毒熱滯結急用霹
靂火法令汗出毒熱隨之而解次用貴金丸下之自效若
暗疔內疔初起牙關緊急者用蟾蘊丸三五粒葱頭煎湯
研化灌之稍醒治法如前至於羊毛疔先將紫黑斑點用

衣針挑出羊毛狀前後心共挑數處用黑豆蕎麥研碎
之即時出汗而愈一法用明雄黃二錢青布包緊蘸
酒於前後心擦之自外圍入內其毛即奔至後心再於後
心擦之其羊毛俱拔出於布上埋之忌茶水一日再諸疔
部位形色亦有緩急者生於頭面胸背最急生於手足骨
節之間稍緩一疔之外別生一小瘡曰應候四圍赤腫而
不散漫者曰護揚四旁多生小瘡者曰滿天星有此者緩
無此者急疔症初起四五月間由白色而至青紫色疔頭
潰膿形似蜂窩內無七惡之症者為順若初起似疔非疔
灰色頂陷如魚臍如蚕斑青紫黑炮輒陷無膿內見七惡
等症者逆凡疔毒俱由火毒而生忌服辛熱之藥恐反助
其邪也忌敷寒涼之藥恐逼毒攻裏也又膏藥不宜早貼
惟在已潰時貼之呼膿長肉避風寒疔生項以上者屬三



陽經不宜灸犯之或倒陰或走黃生疔俱忌椒酒雞魚海
味鷄肉猪首辛辣生冷等物氣怒房勞並孝服經婦僧道
雞犬等犯之必致反覆

消毒飲

金銀花

野菊花

蒲公英

紫花地丁

紫背天葵子

各半

酒水煎服被蓋汗出為度

復生湯

銀花

枝子

骨皮

牛子

連喬

木通

牡蠣

大黃

角刺

花粉

沒藥

乳香 各分

酒水各半煎服便實加朴消

七星劍

蒼耳頭

野菊花

稀仙草

地丁香

牛枝連

蚤休

各三

麻黃一平

酒煎服取汗為度



木香流氣飲

當歸

白芍

川芎

紫蘂

桔梗

枳實

烏藥

陳皮

半夏

茯苓

黃芪

防風

青皮

腹皮

檳榔

枳殼

澤瀉

甘草

木香

姜朮

解毒大青湯

大青葉

木通

麥冬

人中黃

梔子

桔梗

黑參

知母

升麻

淡竹葉

石膏 各三斤

清神湯

人參

陳皮

茯苓

骨皮

麥冬

當歸

白朮

黃芪

遠志 各五斤

柴胡

黃連

甘草 各五分



安神散

人參

麥冬

茯神

黃芪

白朮

黑參

陳皮 各小
菖蒲

甘草

遠志

五味子 各五分

霹靂火

鷄卵石燒紅安鐵杓內放桶內以醋淬石令患者將患處覆桶上厚衣密蓋勿令洩氣熱氣微再添紅石加醋淬之瘡頭及腫處使熱氣薰蒸至汗出其毒減半

流注蓋人之氣血每日週身流行自無停息或因涇痰或因瘀血或因風溼或因傷寒汗後餘毒或因慾後受寒稽留於肌肉之中致令氣血不行故名流注書云流者流行注者住也發無定處隨在可生初發漫腫無頭皮色不變凝結日久微熱漸痛透紅一點方是膿熟即宜針破之若涇

