

亥 23

37<13

馮氏錦囊秘錄
卷十二



卷二 兒科咳嗽

兒科喘咳

方脈咳嗽合參

錦囊咳嗽方安

方脈喘症合參

方脈哮喘合參

方脈肺痿肺癰合參

痰飲大小總論合參

論怪病多屬痰

兒科盜汗自汗

消渴大小總論合參

方脈驚悸怔忡

方脈不寐合參



南京中醫藥大學圖書館版權所有

馮氏錦囊秘錄

卷十二

馮氏錦囊秘錄雜症大小合參卷十二

男 乾吉佑民

海鹽馮兆張楚瞻市纂輯

門人孫顯達陸良

男 乾德進修

論咳嗽 兒科

咳謂無痰而有聲。肺氣傷而百不清。嗽謂無聲而有痰。脾
溼動而痰氣侵。咳嗽謂有痰有聲。因傷肺氣。繼動脾溼也。
然痰之標在於脾。痰之本在於腎。故有宜燥劑以消之者。
有宜潤劑以化之者。在小兒由風寒乳食者居多。宜從燥
以消之。辛以豁之。半夏陳皮全胡之類是也。經雖曰五臟



北京中医药大学图书馆版权所有

六腑皆能令人咳然必臟腑各受其邪而與之終不能離
乎肺也因痰而嗽者痰爲重主治在脾因咳而動痰者咳
爲重主治在肺以時而論之咳於春春氣上升也咳於夏
火氣炎上也咳於秋溼熱傷肺也咳於冬風寒外感也以
一晝夜而計之清晨嗽者屬痰火上晝嗽者屬胃
嗽者屬陰虛黃昏嗽者火氣浮於肺經五更嗽者食積滯
於三焦肺實而嗽者必頓嗽抱首面赤反食肺虛而嗽者
必氣逆虛鳴顏白飧瀉肺熱而嗽者必痰程而稠身熱喘
滿鼻乾面紅手握眉目鼻面肺寒而嗽者必嗽多痰薄面
白而喘毛粟腸鳴惡風多涕然嗽之爲病雖主乎肺實從

於心。心氣過盛則火燥。金治當抑心滋肺。若脾氣虛冷。則不能相生。是以肺氣不足。風邪外襲。痰溼内生。治宜補脾。脾肺若脾實中痞。則熱氣上蒸。治宜瀉脾清肺。故云乘肺爲賊邪。肝乘爲微邪。腎乘爲實邪。脾乘爲虛邪。肺自病者爲正邪。凡一咳卽出痰者。脾虛不勝溼而痰溼也。有連咳十數聲不出痰者。肺燥勝痰溼也。滑者宜南星。半夏之屬燥其脾。若利氣之劑所當忌也。澁者宜枳殼蘇子杏仁之屬利其肺。若燥脾之劑所當忌也。大抵脾氣不足則不能生肺家之氣。風邪易感。故患肺寒者皆脾虛得之。患肺熱者多脾實得之。若至唇縮胸陷。喉有鋸聲。鼻乾焦黑。咳嗽

氣粗心腹脹痛者死。若嗽久音啞直視手牽鵝聲腹脹喘急多驚者必變風候而死。若齟齬而聲嘶如銹唇而著精項下四陷涎如膠漆口生腥臭喘甚唇縮者死。至於小兒百日内嗽名爲乳嗽肺葉尤嬌最易傷損更須急治久則血脈貫臉兩眶紫黑或眼白紅赤如血謂之血眼當用生地黑苳共研成膏掩於眼上則眶黑白消血隨淚出而愈。

論喘 兒科

喘急者氣爲火所鬱而積痰在肺胃也。膏粱之人奉養太過及過愛小兒皆能積熱於上而爲喘咳宜以甘寒之劑治之。脈經云肺盛有餘則咳嗽上氣喘渴心煩胸滿短氣。

皆衝脈之火行於胸中而作。係在下焦。非屬土也。蓋雜病
不足之邪起於有餘。病機之邪自是標本。病傳此餘。食勞
役喜怒不節。及水穀之寒熱感則害人六腑。皆由胃氣不
足。故膈脹腹滿。咳喘嘔食。宜皆以大甘辛熱之劑治之。又
曰。寸口陰脈實者。肺實也。肺必脹。上氣喘逆。咽中塞如呃
狀。自汗皆肺實之證。右寸陰脈虛者。肺虛也。必咽乾無津
少氣。不足以息。然實者肺中邪氣實也。虛者肺中正氣虛
也。故華佗云。盛則爲喘。減則爲枯。活人云。發喘者氣有餘
也。非言肺氣盛。及有餘。乃言肺中之火盛。及火有餘也。故
瀉以苦寒之劑。非瀉肺也。瀉肺中之火。實補肺也。金匱又

曰實喘者氣實肺盛呼吸不利肺竅壅塞若寸沉實宜瀉
肺虛喘者氣短腎虛先覺呼吸少氣兩脇脹滿左尺大而
虛此腎虛症治宜補腎勿謂小兒無慾腎實如稟先天不足
者尤爲真虛耳故實則清理其上虛則溫補其下
病療下治法之要領也然大抵初喘多屬外因宜從標治
或因風痰壅塞者必兼壯熱咳嗽鼻塞頭疼因痘疹未出
者必兼驚厥煩燥身熱足冷因停滯脹滿者必兼嘔吐惡
食噯臭肚疼因驚癇痰熱者必兼抽掣搐搦而青啼叫因
痰哮大喘者必發秋冬暴冷張口擡肩如非前症繼諸病
後非子令母虛即脾肺兩困多從本治况有短氣少氣似

喘非喘更難與喘同例也。諸喘久而不愈者不妨先用劫藥一二服卽止。旣止之後因痰治痰。因火治火可也。然肺脹二症相因。竝皆小便不利。故喘則必脹。脹則必喘。先喘而後脹者主於肺。先脹而後喘者主於脾。經曰肺朝百脈。通調水道。下輸膀胱。又曰膀胱者州都之官。津液藏焉。氣化則能出矣。是小便之行由於肺氣之降下。而輸化若肺受邪而喘。則失降下之令。以致水溢皮膚而生腫滿。此是喘爲木腫爲標。治宜清金降氣爲主。而行水次之。更脾主肌肉。惡溼尅水。若脾虛不能制水。則水溼妄行。外侵肌肉。內壅溢上。因肺氣不得下降而喘乃生。此是腫爲本。喘爲

標治當實脾行水爲主而清金次之。肺症而用燥脾之藥則金得燥而喘愈加。脾病而用清金之藥則脾得寒而脾愈甚矣。如無故喘聲陡發如鋸身不熱而目竄者鼻淵肺肋心胸俱爲開張者腹硬青筋口吐涎沫面無神色而唇白者諸病小痊之後忽交子午時喘鳴者喘促目急黑睛出汗印堂青色者皆爲不治。其脈滑而手足溫者生脈濇四肢寒者死。經曰喘鳴肩息者脈實大也。緩則生意則死。蓋喘鳴肩息者陽症也。脈當實大。更實大中而緩則邪氣漸退故可得生。若實大中而急則邪氣愈增病當死矣。

論哮兒科

喉吼喘者。喉中如拽鋸。有水雞之聲者是也。如氣促而違屬。不能以息者。卽謂之喘。夫哮以聲響名。喘以氣息言耳。喉如鼾聲者爲虛。喉如水雞聲者爲實。丹溪曰。治哮必用薄滋味。專主於痰。宜大用吐藥。吐藥中宜多用醋。不可純用涼藥。兼當帶表散。蓋此是寒包熱也。亦有虛而不可吐者。慎之。總是痰火內鬱。風寒外束而然。亦有過啖醃酸。日久腠理而致者。治法須審其新久虛實可也。

一朱姓兒三歲哮喘大作。聲聞隣里。二三日不止。身熱汗出。一醫投以滾痰丸。利之下瀉二三次。其勢更甚。六脈洪數。胸脇扇動。扶肚擡肩。旦夕無寧刻。粒米不能食。頭汗如

雨數日不寐。勢甚危迫。乃延余治。余曰。誤矣。夫聲出於氣。喉連喘數日。下元已傷矣。今以峻利藥從食喚下之。伐其元氣。無辜下元更虛極矣。所以有扶肚擡肩惡候來也。令以參麥冬各一錢。五味子七粒。肉桂三分。水煎溫服。二日一劑。服後而哮聲頓減。至夜復作。次日往視。余曰。此氣少復而陰未有以配之也。乃以入味之加牛膝麥冬五味子。內熟地每劑五六錢。桂附每劑各四分。水煎冷服。午前午後各一劑。服後而竟熟睡。醒來飲食大進。其聲悉止。次日往視。喘熱俱已。但勞力運動。喘聲微有。此未還元之故也。以生脈飲調理三四日。精神全復。



欵花五味子湯 治小兒久嗽

欵冬花 五味子 麻黃 馬兜鈴 杏仁去皮殼

甘草炙一錢 水煎食遠服

人參寧肺湯 治小兒肺胃俱寒涎喘氣急不得安眠

人參 五味子 茯苓 白朮 陳皮去白 甘草炙各三錢

薑棗水煎食遠服

杏蘇飲 治小兒喘急咳嗽不止

杏仁去皮尖炒 紫蘇子 炒陳皮去白 赤茯苓 桑白皮

大腹皮 半夏麴 甘草炙各一錢 薑水煎食遠服

貝母膏 治風熱天哮

馬氏婦人必錄雜症卷十二 兒科喘哮諸方



黑玄參 焙 山枝 炒 天花粉 焙 川貝母 焙 枳殼 焙 橘紅

百部 炒 黃芩 焙 杏仁 去皮尖炒 桔梗 焙 粉甘草 焙 各

薄荷 淨葉 七錢 蜜丸彈子大 燈心湯或淡竹葉湯化

潤肺化痰膏

大白梨 汁一 白茯苓 四兩乳製晒 麥冬 四兩 川蜜 片

川貝母 一兩去 核桃肉 四兩去皮 先將梨汁熬熟

將蜜煉熟入前藥在內再熬成膏如痰有血入童便四

兩在內每早空心白湯調半茶鍾服

清化丸 治肺鬱痰喘

貝母 杏仁 青黛 爲末蜜和薑汁丸口含嚙化



千金方 治初生十日至五十日卒得嗽逆吐乳

生薑

七片

桂心

二錢

甘草

款冬花

紫苑

各三錢

杏仁

各三錢

蜜

各一錢

山梔

一錢

石微

火煎

如饴

塗唇

化下

吉氏治乳麪方

天竺黃

蚌粉

煨

等分

研和

蜜調

塗乳上

令乾

補肺阿膠散

治肺虛久嗽

作喘

人參

阿膠

各一兩

三錢炒

白茯苓

馬兜鈴

去老

糯米

各五錢

杏仁

二十一粒製

甘草

四錢

為末

取二錢

水煎服

定喘湯

治麪嗽無不取效

見方脈喘哮門

方脈咳嗽合參

馬氏婦孺必錄雜症卷十二。兒科喘哮諸方



南京中医药大学图书馆版权所有

大咳嗽之所以累人者以其難於立止也。然欲治肺而止嗽則益害肺而嗽愈甚。蓋肺受病而爲嗽者必有因。少壯之治其因則嗽自愈。若不詳所自而徒事於肺則氣無所歸。或邪無所散。肺愈苦而嗽愈甚矣。凡傷風久而肺氣已虛發熱咳嗽服發散藥而嗽愈甚。或被發散太過者當用收斂之劑。補之。然虛嗽有二。日間嗽多吐痰白沫或惡心者爲氣虛。宜六君子湯加款冬、五味子。加夜嗽多口渴痰不易出發熱爲血虛。宜六味地黃料加麥冬、五味子。若嗽而脈緊者。咳而羸瘦。脈形堅大者。咳而脫形發熱。脈小堅急者。咳而嘔腹脹且泄。其脈弦急者。皆死不治。

肺屬金射於皮毛所主者氣腎屬水主於骨髓所藏者精
氣輕浮易上而難下精沉重易下而難上此物性之自然
有肺之盛者即熱之作也氣得而上蒸則不能下注於腎
而腎受邪故治腎病必先求之於肺是清其源而流其化
也經曰五臟六腑皆令人咳非獨肺也蓋五臟各以其時
受病非其時各傳以與之有自外得者肺主皮毛風寒暑
濕之邪自皮毛入內傷臟腑而為嗽也有自內發者七情
饑飽內有所傷則邪氣上逆肺為氣出入之道故五臟之
邪上蒸於肺而為嗽也然風寒暑溼有不為嗽者蓋因所
感者重不留於皮毛徑傷臟腑而成傷寒溫熱諸病七情