

玉機辨症

二



傷風

因經曰風為百病之長又曰風勝則動又曰賊風虛邪者陽受之又曰傷於風者上先受之用誠曰風

本陽邪故善動善變其傷於陽者從其類也

風邪傳變陳無擇曰表中風邪在經絡中循經流注

以日傳變與傷寒無異今別立傷風一門且依先哲以太陽經為始分注六經學者當自知用誠曰按

此分傷風六經用藥可謂發諸家之未備在足太陽膀胱經用桂枝湯足陽明胃經用杏子湯足少陽膽經用柴胡加桂湯足太陰脾經用桂枝芍藥湯足少

陰腎經用桂附湯足厥陰肝經用八物湯其方以桂枝湯三味加以各經之藥皆是辛溫解散之劑然既云與傷寒傳變相似此六方亦何以盡其變也學者當求仲景之法以調治之可也

風邪解表有辛溫辛涼之別

用誠曰傷風諸方俱是解表之劑蓋

以風從外入之邪也其所挾有寒熱溫涼之不同故分辛溫辛平辛涼之異

表虛受風者解表固衛

用誠曰風本外邪例用解表然受病

之源不同間有受傷者不能法道清淨腠理不密表上陽虛所致經曰清淨則肉腠閉拒雖有大風苛毒

弗之能害是也若表虛受風專用發表之藥必致汗
多亡陽之證或曰此云表虛與傷寒中風表虛同歟
予曰不同也彼以太陽中風而於有汗無汗分虛實
實者加麻黃虛者加葛根俱解表也此云表虛者當
固守衛氣而散風者也

風邪

挾痰熱
內外交治

用誠曰有內挾痰熱其氣拂鬱風邪易

於外束者若挾痰熱而受風宜內外交治不可專於
解表也

風邪傳變入裏者下之

用誠曰風雖外邪傳變入裏宜隨證施

治錢仲陽論傷風當發散者用大青膏解不散有下

證者用大黃丸可謂得仲景之奧矣諸方於此俱未
曾論及也

辛溫解表之劑仲景桂枝湯治太陽經傷風自汗

桂枝

芍藥

各三兩

甘草兩

生薑三片棗一枚煎

用誠曰按此發散足太陽

經風邪之藥也

局方神朮散治傷風頭痛鼻塞聲重

蒼朮

五兩

藁本

白芷

細辛

羌活

川芎

炙甘草

各二兩

每三錢水一盞薑三片葱三寸煎傷

風鼻塞葱茶調下

用誠曰按此足太陽少陰手

陽明經藥也

辛平解表之劑消風百解散治頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重

荊芥 白芷 陳皮 麻黃 蒼朮

各四兩

甘草

炙二兩

薑三片葱白三根煎每服五錢

用誠曰按此手太陰陽明經藥也

川芎茶調散治諸風上攻頭目昏疼鼻塞聲重

薄荷

八兩

荊芥 川芎

各四兩

羌活 白芷

甘草

各二兩

細辛

一兩

防風

一兩五錢

為末每服二錢食後茶調下 用誠曰按此足太

陽少陰手太陽陽明厥陰經藥

金沸草散治肺經受風頭目昏疼咳嗽聲重涕唾稠
粘荊芥穗四兩前胡麻黃旋覆花各三兩炙甘草赤
芍半夏各一兩以此方見痰飲門第分兩不同耳

辛涼解表之劑柴胡升麻湯治頭痛壯熱惡風體疼鼻塞咽

乾痰盛咳嗽涕唾稠粘

柴胡

前胡

黃芩

各六兩
五錢

荊芥

五錢

赤芍

石膏

各十兩

升麻

五兩

桑白皮

乾葛

各四兩

薑三片豉十粒水煎

用誠曰按此足少陽陽明經藥也

辛涼解表
攻裏之劑

錢氏大青膏發散風邪

天麻錢

白附子末

錢生用一

蝎尾

去毒生五分

麝香

一字

硃砂

研一字

青黛

研一錢

天竺黃

一字

烏梢蛇肉

分五

同再研細生蜜和成膏每服半

皂子大至一皂子大月中兔粳米大人彈子大同

牛膏溫薄荷水化下一處服之

宣明防風通聖散

方見中風門

攻壞錢氏大黃丸

大黃

黃芩等分

水丸服

脈脈經云脈浮而大者風傷寒論云脈浮而緩者

名曰中風

世世不絕其祀大禹風 濟東鎮古鎮名而顯者

大禹 黃龍鎮 水民服 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

濟東鎮古鎮名而顯者 濟東鎮古鎮名而顯者

癰風

風邪干衛經曰風氣與太陽行諸脈俞散於分肉之

間與衛氣相干其道不利故使肌肉腠膜而有癰衛氣有所凝而不行故其肉有不仁也

榮衛熱經曰癰者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱

壞而色敗皮膚癰潰風寒客於脈而不去名曰癰風

血熱病機云經云脈風成為癰俗云癰病也先梓皮

散從少至多服五七日灸承漿穴七壯灸瘡輕再灸

瘡愈三灸之後服二聖散泄熱祛血中之風邪戒房

室三年病愈藥灸同止述類象形此治肺風之法也

然此疾非止肺臟有之以其病發於鼻俗呼為肺氣也鼻腫準赤脹大而為瘡乃血隨氣化也氣既不施則血為之聚血既聚則使肉爛而生蟲也生蟲者厥陰主之厥陰為風木主生五蟲蓋三焦相火熱甚而致金衰故木來剋侮宜瀉火熱利氣之劑蟲自不生也故此疾血熱明矣當以藥緩疎泄之煎局方升麻湯下錢氏瀉青丸餘病各隨經治 用誠曰癘風皮毛血脈先受病二者屬榮衛所主故言肺風至於肉壞生蟲又陽明厥陰所屬故其用藥皆疎泄肺氣祛逐血分之邪熱其灸承漿一穴乃陽明任脈之會所

以宣通血脈以散風也

風邪合內三因云癘風即風論所謂惡疾也雖名曰

風未必皆因風大率多嗜慾勞動氣血熱發汗泄不

避邪風冷濕使淫氣與衛氣相干致肌肉皮膚瘍潰

鼻梁塌壞然亦有傳染者治之須推其所因凡因風

寒濕熱兼勞役飲食與夫傳染穎然不同若例以癘

風藥治之則失矣用誠曰按此云雖名曰風未必

皆因風此論固善蓋此疾多由嗜慾飲食積毒之所

致因其病證穢惡可畏又不可不謂之風也若夫傳

染之說世或有之雖因其一家血脈飲食居處氣味

之相傳者本無內熱積毒亦不能染也

內經內經云病大風骨節重鬚眉墮名曰大風刺肌

肉為故汗出百日王註泄衛氣之怫熱刺骨髓汗出

百日泄榮氣之怫熱凡二百日鬚眉生而止針怫熱

屏退陰氣內復故多汗出鬚眉生也靈樞云癘風

者數刺其腫上已刺以鈹針針其處按出其惡風腫

盡乃止常食方食勿食他食以犯其病

子和汗下出血子和云內經論癰針二百日眉毛再生針同

發汗也但無藥者月針一汗百抵千針故高拱奉嘗

採萍治癰癰風汗出張主簿病癰十餘年戴人曰足

血

有汗者可治之當發汗其汗出當臭其涎當腥乃置
燠室中以三聖散吐下汗出周身如卧水中其汗果
臭痰皆腥如魚涎足心微有汗次以舟車丸瀉川散
下五七行如此數次乃瘳又一人病風面黑爬搔不
已眉毛脫落刺其面大出血如墨刺三次血變色每
刺自額至頤排針上下俱刺每隔日一刺至二十餘
日方已 用誠曰按此論內經用針同發汗至於出
血亦同汗也但癘證在經在表故宜針宜汗有惡血
留滯故宜出或或於腫上或於委中皆可也又腸胃
有穢惡虫積故宜下大抵皆宣泄表裏血氣邪熱之

毒也

丹溪分上下治法

丹溪云大風病是受得天地間穀物之風

古人謂之厲風以其酷烈暴悍可畏爾人得之者須分在上在下夫在上者以醉仙散取臭涎惡血於齒縫中出在下者以通天再造散取惡物陳蟲於穀道中出所出雖有上下通路之異然皆不外乎陽明一經治此病者須知此意看其疙瘩與瘡上先見者上體多者在上也下先見者下體多者在下也上下同得者在上復在下也陽明經胃與大腸也無物不受此風之入人也氣受之則在上多血受之則在下多

血氣俱受者甚重自非醫者有神病者有缺心罕有
免者夫或從上或從下以漸而來者皆可治病人見
其病勢之緩忽_{下上}多之雖按此法施治病已全然脫體
若不能絕味絕色皆不免再發則終於不救矣某曾
治五人矣中間惟一婦人得免以其貧甚無物可吃
也餘四人三兩年後皆再發孫真人曰吾嘗治四五
百人終無一人免於死非孫真人之不能治也蓋無
一人能守禁忌耳此一婦治本病外又是千餘帖加
減四物湯半年之上方得月經行而十分安全

用誠證
治總論

用誠曰癘風古方謂之大風惡疾以其瘡痍

荼毒臟汁淋漓眉鬢墮落手足指脫頑痺痛癢鼻塌
眼爛齒豁唇揭病勢之可畏耳若專以房勞嗜慾飲
食積毒之所致何為遽至於是故丹溪先生亦謂之
受得殺毒之風也蓋其風毒之傷與夫內毒所致人
皆安得而知之及其病証顯露方始歸咎於此其於
外受之風內積之毒豈可得而分治之也故內經刺
肌肉刺骨髓以泄榮衛之怫熱靈樞以鈹針刺腫上
按出惡氣惡血子和用汗吐下出血之法河間用疎
風泄熱之劑俱不分病之所因隨其病之所在以調
之也至於丹溪分在上在下氣血受病多少其用藥