

本草彙言

十一



本草綱目十七



南京中医药大学图书馆版权所有
1951

桑螵蛸



螳螂



露蜂房



蜂窩

殼蟬蟲



螵蛸

五倍子



石蜜



南京中医学院图书馆版权所有
南京中医学院图书馆
南京中医学院图书馆

南京中医学院图书馆

水蛭



齊脣



蚱蟬



樗鷄



班蝥



全蟹




舞白蝶



雀瘡尾




蠍姑



牛蝎



蟻酥



蜈蚣

仰

覆

蟻唧



廢蟲



蚯蚓



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆
www.ertongbook.com

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

藥言卷之十七目錄

蟲部 邪生類

蜂 蜜

蜜 蠼

蜂子

露蜂房

白蘆邊

九香蟲

五倍子

附百

桑螵蛸

蟲白蟬

雀 菴

樗 雞

班 蟹

全 蝎

水 蛭

蟲部 化生類

鱗 蟑

蚌 蟬

蠍 蟬

蟻 蟬

麤 蟲

蠅 蟲

蠅 蟲

蠅 蟲

蟲部 濕生類

蟾 酥

蚌 蟺

蟻 蟎

蟻 蟎



北京中医药大学图书馆版权所有

本草彙言卷之十七

錢塘 倪朱謨純守雨選集 男倪洙龍沖之氏叢稿
沈公葉定白甫校正 內姪沈九穀克全氏叢閱

蟲部

卵生類

蜂蜜味甘。氣寒。性潤。無毒。沉也。降也。人手足太陰陽明經。

按類書云。蜜蜂。一名蠻蠻。爾雅翼云。蜜蠻似蠭而小。工作蜜也。山海經云。穀城之上。足峰密之蘆。今土木之蠭亦各有蜜。北方地燥。多在土中。故名土蜜。南方地濕。多在木中。故多木蜜。又如杭之於潛縣。及金陵懷安諸處。山巖石壁中有巖蜜。百蜜也。今人家所畜之蜂。小而微黃。大半腹腹相稱。如蠅蠅也。喜專此者。以薪木容數斛。置蜂其中。養之。開小孔。纏容出。人宋嘉記云。七八月中。苦有蜜蜂。羣過有一二小蜂先飛覓止泊處。人知輒置一木桶。以蜜塗桶內。飛者聞蜜臭。便舉羣悉至矣。盧氏曰。今人家養蜂。或羣逸以百千萬數。中有人者爲王。羣蜂翼之。從其所在。人收養之。多在穀雨春分時也。蜂采取百花。醞釀造蜜。其房謂之蜜脾。王之所居。疊積如臺。

蜂無王則盡死。君臣之體，生死不移也。一日兩出而聚，鳴齊號爲兩衙。其出采花者，取花鬚上粉，置兩罈。惟牡丹芍藥蘭蕙之粉，或負於背，或戴於首。如采無所得者，經宿花間，不敢歸，或慄怖入。蜂亦尋死，故古無蜂蠶。有毒，近其房，則卒起攻人。寒冬無花，深藏房內，卽以釀蜜爲食。春暖花朝，復出捲采矣。蘇氏曰：宛陵有黃連蜜，色黃而味小苦，薤卻開有梨花蜜，色如凝脂。亳州太清宮有榆花蜜，色小赤，柏城縣有何首烏蜜，色更赤。各隨所采花色，性之溫涼，亦相近也。蜜脾之痕爲蠟。卽雅云蠟生下蜜，而天下之味莫大于蜜矣。淡于蠟，蓋厚于此者，必薄于彼。理之固然也。西方之書曰：味如嚼蠟。舊說蜂之化蜜，必取匣猪之水。注之蠟房，而後蜜成。故蠟者，蜜之蠟也。方言云：其大而蜜謂之蠟峰，卽今黑蜂也。蓋亦蠟蜜，楚詞所謂赤蠟若象。李峰岩壺者是也。李氏曰：試蜜真餕以燒紅火箇，挿入蜜中，提出起氣者爲真，起烟者爲僞。修治每沙蜜一筋，用水四兩，人銀石器內，桑柴火慢煮，掠去浮沫，至滴水成珠，不散乃用。又法以器盛，貯重湯中，煮一日，候滴水不散，取用方佳。且不傷火也。孫思邈曰：七月勿食生蜜。令人暴下霍亂，味酸色青赤者，食之心煩，不可共葱、及蒿、苜、同食。令人下利。食蜜飽後，不可食魚。令人恭泄。○沈氏曰：四方之蜜，氣味當異，幽曠少霜雪，諸花多熟，蜜性則熟。川蜜性溫，西蜜性

原也

李時珍

卷之三

四

五

○蜂蜜潤藏府。和營衛。通三焦燥火之藥也。陸平林曰。蜜
蜂采百花精英。醞釀而成。得草木雨露清陰之氣。故味
甘氣寒。性潤質柔。而利久藏不壞。草木之華水之精也。
如前古主心腹邪結。及驚癇煩悶。甄氏主赤白痢疾。滯
滯不通。日華子主腎陰虛燥。二便不行。諸證凡和百藥
治衆病之因風因火。因燥結者。用之甚佳。雖稱甘平。補
益之劑。但寒滑潤下之勢居多。如胃寒食少者。脾寒作
泄者。大腸氣虛。完穀不化者。嘔吐涎痰。及中滿腹脹者。
俱不宜用。生者有毒。尤不宜食。與生葱薑同食。令人
利下。亦能損人。

○集方治傷寒陽明病。自汗。小便反利。大便硬者。津液內燥也。以蜜煎導之。用生蜜二合。銅器中微火煎之。候凝如飴狀。入水內。乘熱捻作梃。令頭銳大如指頭。長寸半許。候硬納入穀道中。少頃即通也。○治心腹邪結及胃脘作痛者。用蜂蜜熬熟半盞。葛湯沖服。○治心虛內熱以致驚癇。煩悶者。用生蜂蜜。滾湯調服。五錢。○治赤白痢疾。滯不通。用白芍藥。川黃連。甘草。大黃。各一錢。五分。白蜜十匙。水煎服。○治產後口渴。用蜂蜜。煉熟白湯調服。三錢。○治橫生難產。用蜂蜜。麻油。各半碗。煎滾。自湯和服。立下。○治一切惡毒疔腫。用生蜜少許。同葱白搗膏。塗患上。一時許。則疔出。後以醋湯洗去。

蜜蠟

俗名黃蠟

味甘淡氣溫無毒氣味俱薄陽也。入足陽明經

陶隱居曰蠟生蜜中故謂蜜蠟。蜂先以此爲蜜蠟。取蜜時得之。陳過濾入水中候凝取之。初時極香軟而白。以則轉黃色矣。如烊化內水中十餘遍亦轉白色。外有種白蠟係小蟲延樹吐珀結成與此蜂蜜蠟不同也。

○蜜蠟清腸止痢托毒收膿之藥也。李氏曰蠟蜜之凝結

於底者也與蜜同出一源而萬物之至味莫甘於蜜莫

淡於蠟蜜之氣味俱厚屬乎陰也故入脾蠟之氣味俱

薄屬乎陽也故入腸胃蜜性緩而質柔故潤藏府而利

大便蠟性嗇而質堅故吸膿解毒而止洩痢一類二物

有各異如此古人儉歲以此度饑但合太棗咀嚼卽易

爛也仲景方治痢有調氣飲千金方治痢有調血湯其

効甚捷但性本收滯治虛寒久痢者宜之倘暴痢火積

不淸者不宜用也。

○集方治赤白痢金匱要略。小腹痛不可忍。下重。或面青手足俱變者。用黃蠟阿膠各三錢同溶化入黃連末一錢和熱湯一盞攪勻分三次服立驗。○治熱痢及婦人產後下痢用黃蠟阿膠各三錢同溶化入當歸末二錢和熱湯一盞攪勻分三次服立驗。○治諸瘡毒久爛膿血泄而瘡口不飲用黃蠟一兩溶化將凝入枯礬細末二錢熬熟香油數匙攪勻搘成細小丸子每服二錢毒在上食後服在下食前服俱用熱酒送下。○治陰蝕瘡用黃蠟猪油各一兩同溶化加鉛粉真珠冰片、蛀竹屑俱研細末葱白擣爛化各二錢同調入蠟油內用鴉羽蘸藥擦之。

○治内外癰瘡。用黃蠟一兩。猪油五錢。同溶化入務兒茶。鉛粉。龍骨。粉霜。共研極細末。調入蠟油內作次。紙膏貼之。

○治脚

脚氣

上凍瘡。風裂疼痛。用黃蠟溶化。灌入瘡中。

○治妊娠胎漏。下血。用黃蠟五錢溶化。熱湯一碗。沖入。卽服立止。

○蜂子。味甘。氣平。微有毒。

周子曰。乃蜜蜂子也。食之者須用冬瓜、生薑、紫蘇、制其毒。
○按蜜蜂有大、有木、三種。俱能釀蜜。其子皆可食。以充饌。用外有胡蜂。較蜜蜂稍大。其色有黃黑二種。於人家屋角上。結巣。小者如升。大者如斗。緣山林大樹間。有大如巨鐘。其房孔數百層。土人采時。着草衣蔽身。以捍其攢螯。復以烟火薰炙。蜂母飛去。斷其蒂。持歸入甕。蒸熟。取出蜂子。計五六斗。或一石者。取出形如蠶蛹。殼白者。以薄鹽微淹。暴乾。京洛以爲方物。如趨足具者不堪食矣。然胡蜂子皆可食。大抵治病功能以蜜蜂子。性殊亦不相遠也。外有一種七里蜂。黑頭鐵嘴。識其窠如鵝

塊皮厚蒼黃色。只有一個峰大都小。蟻子其毒最猛。人馬被螫立死也。又一種蛇蜂出巴蛇在蛇穴內其毒常中人手足輒斷。中人心胸卽圮裂而死。非藥可療。故元興詩云：巴蛇蟠窟穴。穴下有蠍蜂近樹齋垂韁。侯山獸絕蹤。微遭斷手足。厚毒裂心胸。昔有招魂客應。蟾蜍碎蓬此胡蜂之毒如此。

○蜂子去大風癘疾之藥也。聖濟總錄方治大風癘。用諸攻毒藥。兼用蜂子。蓋亦足陽明太陰引經之劑。古人充餌品以進賓客。而本經別錄言能補虛羸。傷中諸證。○集方治大風癘疾。鬚眉墮落。指節開裂。皮肉已爛成瘡者。用蜜蜂子五錢炒白花蛇、烏梢蛇俱酒浸去皮骨矣。乾全蝎、殭蠶、地龍去土蟹虎赤足蜈蚣各十五枚俱炒硃砂五錢雄黃三錢俱研極細末冰片五分共研勻。每服一錢蜜湯調下。日二次。

露蜂房味甘苦鹹性平有毒

蘇氏曰。露蜂房。懸山林大樹上。得風露者。其蜂黃黑色。長寸許。螯人及牛馬。皆至死。非人家屋下小蜂房也。小者如甕。如斗。大者如巨鐘。色淡黃。有層疊雲頭斑紋。其腹有數百足。干眼者。修治剪碎。酒浸一夜。火上炙用。

○露蜂房驅風攻毒散疔腫惡毒之藥也。梁心如曰。蜂性有毒。螫人則痛極欲死。以其得火氣之甚也。故蜂房係胡蜂吐沫結成。亦非良物。如別錄方治風痺腫痛。及附骨惡疽。內癰疔腫根在藏府。及歷節風疼。痛如虎咬。蓋取其以毒治毒之義云。若病屬氣血兩虛。無風毒外邪者。與癰疽潰後元氣虛乏者。皆不宜服。

○集方治風痺手足腫痛。用蜂房一兩炒焦爲末。蒜肉五錢切片。醋浸七日取出。同蜂房搗傅患上。○治風蟲牙。油沙方。

瘡用蜂房一塊。細辛一錢。煎湯漱之。○治重舌腫瘍。用
蜂房白殭蠶各等分。俱炒燥爲末。酒調傅。○治疔瘡惡
毒。用蜂房半枝連各等分。煎湯飲。○治附骨惡疽及歷
節風瘡。用蜂房數兩炒。搗末。酒調厚傅。患上。○治小兒
頭上軟癰。頻作用蜂房二兩切碎。搗末。巴豆肉二十粒。
香油內煎滾。俟豆枯浮。濾出清油。調蜂房末敷之。○治
頸上癬瘡。用蜂房搗末。臘猪油和塗之。立効。○治乳癰。
內結。腫硬不散。不潰用蜂房五錢炒。水煎服。三四次愈。

白殼蠶味甘鹹辛氣平無毒氣味俱薄浮而升陽也。入足厥陰手太陰少陽經。

李氏曰：蠶蟲屬陽喜燥惡濕食而不飲三眠二起三十日而老自卵出而爲蟇自蟇脫而爲蠶蠶而繭繭而蛹蛹而蛾蛾而卵卵而復蟇亦神蟲也其種東南居多西方畧少北方則無矣蠶病風死其體直蠶其色白白死且不朽也今市肆多用中熟死蠶或用石灰未熟者令白服之爲害最深不可不慎也雷氏曰修治用米泔浸一日俟漬涎吐出淨水上者卽掠去之洗淨微火焙乾淨布拭去黃皮毛并黑目明搗細用。

○白殼蠶驅風痰散風毒解瘡腫之藥也夏碧潭曰：殼蠶之病風者也，挺直屬木色白屬金得金木堅清之化，故善治一切風痰相火之疾，如前古之治小兒驚癇搐搦，恍惚夜啼。李氏方之治大人中風痰閉悶絕人事不省，或喉痺腫寒水穀不通，或頭風齒痛腮頰硬脹，或皮膚。