

女科醫案選粹

嚴鴻基題



民國十年甯波
汲綆書莊印行



序

諺云。熟讀王叔和。不如臨證多。誠以臨證為醫學求實驗也。實驗維何。醫案是已。故古人臨證必有案。立案必詳病者男女姓名年歲。病源證狀傳變脈象舌苔。方法。俾有所考證得失也。雖然。古今醫案多矣。求其純粹女科。則寥如無聞。而分門別類。惟正續名醫類案。於女科一門。選取宏富。次則陳自明婦科良方。武叔卿濟陰綱目等書。亦有採錄。但所採者。乃薛立齋醫案居多。薛氏醫案。既不列病者姓名。語焉不詳。方法簡單。久為世所疑。而不取。然則女科醫案。既無專書。又乏精良。學者將何所取法也。余臨證廿餘年。大抵婦女就診較多。故平時瀏覽醫籍。凡見古今人有案有關於女科。堪以取法者。輟別錄副本。其醫案經古人判評者。尤為多選。或未經古人評判。余讀案有心得者。遂按數語於後。或闡發其理。或推廣其義。不數年而得四卷。名曰古今女科醫案選粹。置之几案。藉資研究。未敢問世也。不謂今春適有感證輯要之刊。同志曰。胡不亦付手民。以供同好。余不得已。遂應同志之請。而剞劂之。惟俟海內博學君子。正其得失。或再續選。此則余私心所深幸也夫。

民國九年歲次庚申春王月

慈谿嚴鴻志序於退思廬

退思廬古今女科醫案選粹目錄

卷一

經水門

經水不調案

經水不調屬肝腎奇脈陰虛案

經水不調由於衝脈虛案

經水不調由於肝脾氣結案

經水不調由於中虛藥誤案

經水不調由於痰凝案

又案

經水不調由於悲鬱案

經水不調由於滯下案

經水不調將成勞瘵案

經水不調屬肝胃不和案

經水不調由於痞塊脾泄案

經行先期由於氣衝塊升案

經行先期由於氣鬱血滯案

經速腹痛案

經速腰發赤塊案

經遲屬衝脈肝陰兩虛案

經遲屬血虛案

經遲屬鬱傷情志案

經遲屬鬱傷肝脾案

經行陰部發腫案

經行音啞案



經行泄瀉案

經中腹中寒痛案

經行腹痛吐涎案

經行腹膨脹痛案

經行適逢冬溫案

經不止由於肝脾兩傷案

經不止由於肝火過旺案

經多屬血虛火盛案

又案

又案

經閉嘔吐案

又案

經閉泄瀉便血案

經閉腹痛便血案

經閉腹脹屬氣血俱病案

經閉因氣血兩虛案

經閉夾痰飲厥氣案

經閉吐血案

又案

經閉將成勞損案

又案

卷二

經水門

經停瘀血成癰案

經停由於體虛自乳案



經停由於陰虧誤治案

經停由於痰阻案

又案

經停由於肝鬱案

經停為藥所誤案

又案

經阻腹痛繞臍案

經阻致氣逆不舒案

經阻成癥案

經逆則病血案

經逆則病齒衄案

經逆由於衝脈襲受寒邪案

痛經由於癥瘕案

痛經體發紅塊案

痛經下如豆汁案

經色不正肌瘦案

經黑屬熱陷衝脈案

經淡腹痛案

熱入血室案

共八則

帶下門

淋帶屬奇經虛案

帶下屬陽虛案

又案

帶下屬氣虛下陷案

帶下由於肝脾兩傷案

帶下由於寒痰案



帶下由於濕熱案

帶下致大便溏瀉案

帶下致小便淋瀝案

帶下久成白崩案

崩漏門

經漏屬衝任陽虛案

經漏屬衝任陰虛案

經漏屬奇經陰虛風陽動案崩漏屬衝任胃脈皆虛案

崩屬奇脈虛血滯案

崩由肝脾兩傷案

崩由脾腎兩虛案

崩由氣血兩虛案

崩由脾胃虛寒案

崩由肝火案

又案

崩由蓄血案

崩由氣鬱案

崩由悲哀案

崩由憂勞案

崩由積滯案

崩由痰滯案

崩由胃陽下陷案

崩由風邪內陷案

崩由風入胞門案

崩且淋帶案

因漏致崩案



崩久傷中案

暴崩屬氣血兩虛案

暴崩胎墮案

卷三

妊娠門

憑脈斷妊娠案

妊娠惡阻案 共七則

妊娠子懸案 共五則

妊娠子癰案 共二則

妊娠子利案

妊娠子滿案

妊娠子腫案

妊娠轉胞案

妊娠患肺癰胎朽案

妊娠胎枯案

妊娠胎毒衝逆案

妊娠因夢擊胎動案

妊娠鬱怒致胎不安案

妊娠漏血案

妊娠感寒案

妊娠煩熱案

妊娠嘔吐案

妊娠風濕案

妊娠冬溫案

妊娠溫毒發斑案



妊娠暑熱入絡案

妊娠暑濕擾中案

妊娠燥氣為病案

妊娠瘧痢案共三則

妊娠痢疾案

妊娠內熱欬痰案

妊娠咳嗽案

妊娠肝厥案

妊娠關格案

妊娠淋閉案

妊娠咽痛案

妊娠乳痛案

半產門

半產由於氣血兩虛案

共三則

半產由於相火太盛案

半產由於肝胃不和案

半產由於藥誤案

半產異胎案

半產死胎案

共二則

半產後胎毒胎患案

半產後營熱患瘡案

半產後營虛不攝案

半產後暴崩案

半產後因虛昏厥案

半產後患風痢案

半產後肝胃痛案



產難門

產難由於肝腎兩虛案

產難由於痰塞胃口案

產難由於學生案

產難由於胞破胎溺案

產難溺阻案

產難損脤案

卷四

新產門

新產胞留案

新產子宮下墮案

新產血暈案 共二則

新產瘀血衝胃案

新產暴崩亡陽案

新產鬱冒案

新產感冒案 共二則

新產寒疫案

新產發疹案

新產伏暑案

新產痰嗽案

新產吐瀉案

新產蟲痛案

產後門



北京中医药大学图书馆藏

產後經水色淡案

產後神昏如狂案

產後肝厥案

產後畜血癰瘕案

產後血瘀發哮喘案

產後血瘀成膿案共二則

產後血瘀成癰案

產後血瘀腎毒案

產後乳生癰毒案

產後乳生癰毒案

產後舌瘡案

產後足痠案

產後血暈案

產後血阻痰滯案

產後痰飲案

產後痰厥案共二則

產後痰血交湧案

產後感受風熱案

產後溫熱案

產後類風案

產後感寒案

產後感暑夾食案

產後陰虛夾暑案

產後瘧瘧案

產後三瘧案

產後久痢案

產後便血不寐案

產後肝虛結核案



產後動肝結塊案

產後肝胃不和案

產後厥氣上攻案

產後血虛燥痛案

產後血虛發熱案

產後急勞案

產後損却案

產後腫脹案

產後血崩厥逆案

產後泄瀉厥逆案

產後泄瀉案

產後咳嗽案

產後嘔逆案

產後積滯案

產後伏邪發現案

共二則

產後受驚案

產後驚悸案

產後寒熱案

產後寒熱浮腫案

產後真陰不足案共二則

產後陰虛內熱案



南京中醫藥大學圖書館

退思廬古今女科醫案選粹卷一

慈谿嚴鴻志癡孫纂輯

男智鶴梅村校字

婦科醫案散見於古今名人各家載藉浩如煙海採不勝採茲選其案之佳者錄之於後以供揣摩取法焉

經水閉

經水不調案

汪石山

一婦年逾四十形色頗實常患難產倒生經水不調或時遍身骨節疼痛食少倦怠自汗汪診之兩手脈皆不應惟右關輕按隱隱然微覺動也疑脈出部以指尋按渠經列缺穴分亦不應甚怪之乃叩其夫曰有孕時醫診亦言無脈後服八物湯幸而易產而得一子汪曰此由稟賦本來脈不應也無足怪可見天下事變出無窮果難一一以常理測也如脈經所謂但道其常而已兩手無脈而人如故此亦理之所無事之大變故記之

俞東扶按人有一手無脈者頗多若兩手無脈者則少此乃母胎中或襁褓時覺剝其經隧致脈不通原非病也石山又診一婦左手無脈而動於腕臂外廉陽谿



醫學大學圖書館藏

偏歷之分。是即今所謂反關脈也。汪乃曰。左脈離其部位。其病難以脈知。誠然。反關脈多洪大。且可推動。果不足以審病情。又丹溪治一婦人瘧。食少經閉。兩手無脈。每日以三花神祐丸十餘粒津嚥之。月餘食進脈出。又半月脈愈。又一月經行。此則因病而無脈。非向來無脈也。

經水不調屬肝腎奇脈陰虛案

葉香巖

朱氏經云。陽維為病苦寒熱。緣上年冰雪甚少。久失其藏。春半潮濕。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。八脈隸乎肝腎。一身網維。八脈乏束固之司。陰弱內熱。陽微外寒矣。脊脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。情景已露。局方逍遙散。固安科聖藥。大意重在肝脾二經。因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今則入夜病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。用炙甘草阿膠細生地生白芍麥冬牡蠣。鴻志按此症八脈皆損。斷非草木之功。所能補救。即用異類有情之品。恐亦難於奏績矣。

經水不調由於衝脈虛案

繆宜亭

某氏經行速而為日多。衝不攝也。寒熱發而腹中痛。營氣虛也。病關八脈。陽維督脈衝任皆及也。法以調奇經為主。使河津漸充。流於經脈。可漸愈矣。熟地炭炙羊尾膏艾炭阿膠杞子炭沙蔞黎杜仲炙蜆蛸兔絲子白薇

鴻志按繆氏此方是從艾膠四物湯化出。學者宜注意。

經水不調由於肝脾氣結案

薛立齋

一婦腹內一塊。不時上攻。或痛作聲。吞酸痞悶。月事不調。小便不利。面色青黃。相兼已二年餘。此肝脾氣滯。以六君子加芎歸柴胡木香吳茱萸炒川連二劑。次與歸脾湯下蘆薈丸。月餘肝脾和而諸證退。又與補中益氣加茯苓丹皮。中氣健而經自調。鴻志按塊有癥瘕之別。癥由血結。瘕由氣成。此症由肝脾氣滯。其塊必是瘕類。故疏達肝脾。其塊即失。

經水不調由於中虛藥誤案

薛立齋

一中年婦素性急。先因飲食難化。月經不調。服理氣化痰藥。腹反膨脹。大便泄瀉。又加烏藥蓬朮。脹愈甚。小便不利。加猪苓澤瀉。痰喘氣急。手足厥冷。頭面肢體腫脹。指



按沉而屈脈沈細。右寸為甚。此脾肺之氣虛寒。不能通調水道。下輸膀胱。滲泄之令不行。生化之氣不運。東垣云。水飲留積。若土之在雨中。則為泥矣。得和風暖日。水濕去而陽化。自然萬物生長。喜其脈證相應。遂與加減腎氣丸。小便即通。數劑腫滿消平。四肢漸溫。自能轉側。又與六君子加木香肉桂炮姜而愈。

鴻志按經謂前陰總宗筋之所會。會於氣街。而陽明為之長。陽明水穀之精華。變化成血。以灌輸太衝。太衝脈盛。月事以時下。是知此證經水不調。實由胃陽先虛。其時遷延不治。厥後治不如法。以成陰寒充斥。而為危急之候。若非急投加減腎氣丸。以益火之源。消其陰翳。則中陽不伸。氣化不行。勢難挽此沈疴。善後以六君子加木香姜桂。其病遂愈。治法頗合經旨。

經水不調由於瘀凝案

陸養愚

董龍山夫人。胸膈不舒。大便不實。或時去血。或時去積。經期或先或後。或行後止。四五日。復行一二日。去血或多或少。有時經前作痛。服養血調經之藥。不應。又服健脾之藥。亦無效。飲食減少。肌肉消瘦。每夜膳不能進。強食之。則飽脹不能安臥。陸診其脈。沈弦而滑。右關尤甚。曰。沈為氣滯。弦為留飲。滑為痰凝。經之不調。便之不實。腹之

脹痛皆積痰為之也。乃合清氣化痰丸以調氣。水煎化陳湯送下。數劑後大便去痰積若干。胸腹不脹不痛。改用六君子湯數劑。而大便結實。後以調氣養榮湯間服之。自此經水漸調。數月而受孕。調氣養榮湯方。用歸身白芍川芎茯苓木香白豆蔻。盧紹庵曰。月候不調而用養血。未為差謬。漸形食減肌瘦。投之以健脾。依然如故。病而至此。眾醫無所施其巧矣。先生乃用順氣行痰。諸疾頓失。昔賢所謂痰多佔住血海地位。以致現證若此。先生何由而知。診其脈弦滑也。語云。心中了了。指下難明。先生得之於心。應之於手。是以他醫莫及。

又案

王孟英

張養之令姪女患汎衍而飲食漸減。於某與通經藥服之。尤惡穀。請孟英診之。脈緩滑。曰。此痰氣凝滯。經隧不宣。病由安坐不勞。法以豁痰流氣。勿投血藥。血自流通。於某聞而笑曰。其人從不吐痰。血有病而妄治其氣。脹病可立待也。及服孟英藥。果漸吐痰。而病遂愈。養之大為折服。

周光遠謂世人頭痛治頭。脚痛療脚。偶中而愈。貪為已功。誤藥而亡。冤將奚白。此寓意草之所以首列議病之訓也。孟英深得力於喻氏。故其議病迥出凡流。要知