



先煮麻黃去沫內諸藥煎一服汗者止勿服

此足太陽藥也成氏曰桂枝主中風麻黃主解風寒而傷欲以桂枝解肌驅風而不能已其疾以桂枝浮散而不能主其風仲景所以處風而兩解也麻黃甘溫桂枝辛熱冀傷營以甘緩之風傷衛以辛散之故以麻葛爲君桂枝爲臣甘草甘平杏仁甘苦佐麻黃以發表東甘溫生薑辛溫佐桂枝以解肌薑東又能行脾之津液而利營衛營衛陰陽俱傷則非輕劑所能獨解必須重輕之劑同散之乃得陰陽之邪俱已營衛俱和石膏辛甘微寒質重而又專達肌表爲使也風寒外盛人身之膏休重瀉執氣輕解肌故云重輕之劑足太陽膀胱經表病也而表有營衛之不同病有風寒之名異仲景治分三症桂枝解肌驅風麻黃發汗散寒青龍風寒兩解各分疆界即足三大綱也按大青龍爲發汗之重劑隔節卷曰此湯陰峻須風寒俱甚又加煩躁乃可與之喻嘉言曰

解脫兼發汗義取青龍者龍興而雲升雨降鬱熱頓除煩躁乃解匪龍之爲靈何以得此乎青龍湯爲太陽無汗而設與麻黃證何異因兼煩躁一證煩爲風躁爲寒非此法不解也然不汗出之煩躁與發汗後之煩躁迥別下後之煩躁與未下之煩躁亦殊若少陰煩躁而悞服此則有亡陽之別矣又曰石膏一物入甘溫隊中則爲青龍從清涼同氣則爲白虎夫風寒皆傷宜從辛甘發散矣而表裏又俱熱則溫熱不可用欲併風寒表裏之熱而俱解之故立白虎一法以輔青龍之不逮也按煩躁有在表者此症不汗出而煩躁是也有在裏者不大便而煩躁是有陽虛者汗下後病不去而煩躁是也有陰盛者少陰病吐利歐道煩躁欲死是也內熱曰煩爲有根之火外熱曰躁爲無根之火故但躁不煩及先躁後煩者皆不治

行水  
解汗

小青龍湯

仲景

治傷寒表不解心下有水氣乾嘔發熱而渴或嘔或喘或

渴或利或小便不利少腹滿短氣不得卧

發熱惡寒頭痛身痛屬太陽表症者則以表不解三字該之內有水飲則水寒相搏水留胃中故乾

嘔而嘔水寒射肺故咳而喘水停則氣不化津不生故渴水瀆腸間故不利水畜下焦故小便不利而少食清短氣者氣促不能相續與喘不同有實有虛有表有裏此爲水停心下亦令短氣水氣內滯所傳不一故有或爲之症○金匱云平人無寒熱短氣不足以息皆實也又云膈

麻黃去桂枝

芍藥酒

甘草

五味子

渴

半夏加花粉

牛夏溫燥花粉

苦寒去熱生津

喘爲氣逆麻黃多重

發散杏仁降氣升腫

亦去麻黃本之病故並去之

噏呼形腫水氣標經曰水寒相搏則

附子溫經散寒小便

秘去麻黃加茯苓

便秘忌發汗宜滲利

此太陽藥也表不解故以麻黃發汗爲君

桂枝廿二佐之解表爲佐

咳喘肺氣逆也故用芍藥酸寒五味酸溫以收之

經曰肺欲收急食酸

水收斂以固真水

以潤之細辛又爲

水停心下則腎躁細辛乾姜

溫能潤腎而行水

經曰腎苦燥急食辛

少陰腎經表藥

半夏辛溫能收逆氣散水飲爲使也

外發汗內行水

則表裏之邪散矣

此症爲水寒相搏而傷肺若寒從外出而水不內消

龍湯並主之程郊倩曰水氣之渴與白虎湯中之渴不特寒熱有殊亦

且燥濕各異金匱云先渴後嘔者水停心下

小青龍湯主之不治渴而

嵒治水水去而渴自止矣李時珍曰仲景治傷寒太陽症表未解有時頭痛惡寒有水而咳乾嘔發熱或喘或利小青龍湯主之表已解有時心下有水乾嘔痛引兩脇或喘或咳十棗湯主之蓋青龍散表邪使水從汗出內經所謂開鬼門也十棗逐裏邪使水從二便出內經所謂潔淨府去陳莝之法也

淨府去陳莝

# 李芳加葛根小青龍加石膏湯

金匱

治肺脹欬而上氣煩躁而喘心下有水脉浮

此去水飲散

葛根湯

仲景

治太陽病項背凡几殊無汗惡風

音

葛根

鳥之短羽者動則引頸

凡然狀

病人項背難舒之

貌也無汗惡風

中風而表實也

陽明脉上頸而合于太陽

然將傳陽明

故如葛根以斷之

此症又名剛症

乃風寒傷筋故拘急而強直也

金匱

治

風寒

之重劑

治之亦主此湯剛症無汗柔症有汗仲景又曰太陽發汗不徹煩躁短氣者亦宜此湯更發其汗經曰何以知汗出不徹以脈濶故也按傷寒失吐汗下而短氣爲實汗下後短氣亦治之也方中合病下利傷寒有者爲虛表實宜發汗表虛宜解肌合病本經未解傳入他經有催併之義爲併病二經三經同受邪者爲合病合病者邪氣甚也太陽陽明合病其症頭痛脣脢痛肌膚覺酸目痛脈浮大而長頭腰太陽也肌目鼻陽明也浮大太陽也脈長陽明也陽

下利多用之趙嗣真曰合病者二陽經或三陽經同病不傳者也併病者一經先受病又過一經病之傳者也如太陽陽明君併而未盡是傳未過仲景所謂太陽症不罷面赤陽氣怫鬱在表不得越煩躁短氣是也猶當汗之以各半湯若併之已盡是謂傳過仲景所謂太陽症罷潮熱手足汗出大便鞭而諧語是也法當下之以承氣湯是知傳則人府不傳則不入府併病傳變有如此仲景治太陽陽明合病主葛根湯太陽少陽合病主黃芩湯少陽陽明合病主承氣湯三陰有兩感而無合病○此事難知云足太陽爲諸陽之首故多傳變太陽傳陽明水傳土也謂之微邪又謂巡經得度傳太陽傳少陽謂之越經傳太陽傳太陰謂之誤下傳太陽傳少陰謂之表裏傳水勝火火勝水此南北二方之變頃刻害人辨之不早必成不救太陽傳厥陰謂之首尾傳三陰不至于首唯厥陰與督脈上行與太陽相接又名巡經得度傳災變至重不爲不多矣

葛根四  
兩蜜黃

生薑三  
兩桂枝

芍藥

甘草二  
兩

大棗十二  
枚

此足太陽藥也成氏曰輕可去實葛根麻黃之屬是也此以中風表實故加二物于桂枝湯中仲景以有汗無汗定傷風傷寒之別有汗爲傷風用桂枝加葛根湯不用麻黃無汗爲傷寒用

此湯張元素曰二湯加葛根所以斷太陽人陽明之路非太陽藥也若太陽初病便服升葛是反引邪氣入陽明也周揚俊曰不去麻黃復加葛根大開肌肉之藥不慮大汗無制乎故以桂枝監之且以芍藥收之喻嘉言曰仲景于太陽帶陽明症其風傷衛則桂枝湯中加葛根寒傷營則麻黃湯中加葛根太陽帶少陽症其風傷衛財桂枝湯中加柴胡營則麻黃湯中加柴胡合併之病亦然則陽明以葛根爲主藥少陽以柴胡爲主藥矣乃少陽經專用小柴胡湯而陽明經全不用葛根湯何耶此有二義太陽而畧兼陽明則以方來之陽明爲重故加葛根陽明而尙兼太陽則以未罷之太陽爲重故不加葛根恐葛根大開肌肉則津液盡從外泄耳小兒布痘見點之時亦忌之今人知忌升麻而恣用葛根兒命遭枉者多矣又曰金匱論癰病于風木主事之時已申不可汗下之戒夫妄下損陰則筋失所養而瘻妄汗亡陽則脉失所養而拘急及遇無汗之剛症又不得不用葛根湯取其微汗至于下法全不示戒且云可與大承氣湯見身內之陰爲外熱所耗容有不得不下之症伍十中不得一二終非可訓之

定法畧舉其端聽用者之裁酌耳

### 本方除麻葛桂枝加葛根湯

仲景治

太陽陽明合病不下利但嘔

此又以利不利辨傷寒之不同也寒

### 葛根加半夏湯

仲景治

太陽陽明合病不下利但嘔

此又以利不利辨傷寒之不同也寒

爲陰陰性下行裏氣不和故利而不嘔風爲陽陽性上行裏氣逆而不下故嘔而利

以下由氣

少陰  
表症

麻黃附子細辛湯仲淳復卷少陰症始得之反發熱脉沉者

少陰症脉微細相欲

寐是也太陽勝財與少陰腎相爲表裏腎虛故太陽之邪直入而脉沉餘邪未盡入裏而表熱此症謂之表裏相傳非兩感也

麻黃

細辛附子二枚  
兩炮一枚

先著麻黃去沫內諸藥煎

此足少陰乘也太陽症發熱脉濶全反沉少陰症脉沉當無熱今發熱故反也熱爲邪在表汗脉沉屬陰又當溫故以附子溫少陰之經以麻黃散太陽之寒而解以細辛醫經表藥聯屬其間是汗利重者趙嗣真曰仲景太陽篇云病發熱頭痛脉反沉身脉疼痛當救其裏宜四逆湯少陰篇云少陰病始得之反發熱脉沉者麻黃附子細辛湯均是發熱脉沉以其頭痛故屬太陽陽症脉當浮而反不能浮出而乾薑附子亦能出汗而散假令裏不虛寒而脉浮則正屬太陽麻黃症矣均是脉沉發熱以無頭痛故名少陰病陰病當無熱今反熱寒邪在表未全傳裏但皮膚發熱爲熱故用麻黃細辛以發表熱附子以溫少陰之經假使寒邪入裏外必無熱當見吐利厥逆等症而正屬少

陰四逆湯症矣由此觀之表邪泮淺發熱之反猶輕正氣衰微脉沉之  
反爲重此四逆證不爲不重于麻黃附子細辛湯矣又可見熟附配麻  
黃發中有裡生附配乾薑稍中有發仲景之旨微矣按傷寒傳入三陰  
尚有在經表症加太陰有桂枝加芍藥湯少陰有麻黃附子細辛湯厥  
陰有當歸四逆湯之類皆陰經表藥也又按少陰雖有反熱而無頭痛  
厥陰雖有頭痛而無身熱且痛不如陽經之甚若身熱頭痛全者則屬  
陽症醫貴曰有頭痛連腦者此係少陰傷寒宜麻黃附子細辛湯不可  
不知前嘉言曰仲景太陽經但有桂枝加附子法並無麻黃加附子法  
太陽無脉微惡寒之症不當用附子若見脉微惡寒吐利煩躁等症則  
亡陽已在頃刻又不當用麻黃矣又曰三陰表症與三陽迥異三陰必  
以溫經之藥爲表而少陰尤爲繁閑俾外邪去而真陽不出方合正法  
經又曰少陰病吐利手足不適令反發熱者不死脉不至者亥少陰七  
壯此又以陽氣爲主少陰吐利法當厥  
逆以無陽也發熱爲陽氣猶存故不死

李去細辛加甘草名麻黃附子甘草湯仲景治少陰病得之三日無

證者當取附子得之二三日較初得之爲緩無症無吐利厥逆裏症也  
附子不得用此湯微發汗以散之是汗劑之輕者周湯俊口言無  
裏證則亦有反發熱之表在可知也二方皆治少陰表症少陰無發汗  
之法汗之必至亡陽惟此二症用之全履用本方治少陰水症少氣脉

升散

升麻葛根湯

三陽皆有

痛鼻乾不得卧及陽明發斑欲出不出寒暄不時多瘡痍頭痛故頭痛屬表六經皆有身痛在陽經則煩痛拘急風寒在表故發熱惡寒邪外束故無汗熱入裏故口渴陽明脈絡鼻竅目故目痛鼻乾陽明屬胃胃不和故固不安陽邪人胃裏實表虛故發斑輕如蚊點爲疹重若錦紋爲斑

升麻葛根

葛根二錢

葛根一錢

加葛根如頭痛加川芎  
爲通

陰陽血氣之使白芷

身痛背強加羌活

防風

此兼太陽也

不退者加柴胡

葛根

少陽司令柴胡

葛根

葛根

葛根

防風

故加二葉

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

黃芩防風

少陽司令柴胡

葛根

白芷川芎牛蒡石膏

解毒

喉加桔梗

清肺利膈

咽喉

火熱豆面腫

加防風荆芥連翹

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

葛根

紫草涼血潤腸用耳者取

其初得陽氣觸類升發

脉弱加入參

食少加白朮

腹痛倍加藥

梨之

此是陽藥也陽明多氣多血寒邪傷人則氣爲之壅滯不能達表

輕可去故以升萬辛輕之品發散陽明邪陽邪盛則陰氣虛故用

甘草盤口和血又用甘草調其衛氣也

雲岐子曰葛根爲君升麻爲佐甘草爲藥以安其中升麻

甘草升陽解毒故又治時疫

時疫感之必先入在胃故用陽明胃藥正

瘡已出者勿服恐重

瘧疾也

斑疹欲出未出之際宜服此湯以透其毒不可安服寒劑以

攻其熱又不可發汗攻下虛其表裏之氣如內熱甚加黃連犀角青黛

大青知母石膏黃芩黃柏玄參之類若班熱稍退潮熱譫語不大便可

用大柴胡加芒硝

調胃承氣下之

傷寒未大陽明者勿服恐反引表邪入陽明也

太陽

柴胡葛根湯

代葛根湯

治太陽陽明合病頭目眼眶痛鼻乾不眠惡

寒無汗脈微洪太陽脉起目內眥上額交竅陽明脉上至額顱絡于目

寒無汗脈微洪風寒上干故頭痛目痛眶痛也惡寒無汗屬太陽鼻乾

不眠屬陽明脉洪將爲熱也

節菴曰此

不眠屬陽明脉洪將爲熱也

節菴曰此

陽明在經之邪若在府病另有治法

柴胡葛根羌活白芷黃芩芍藥桔梗甘草加葛根

石膏一錢前服無汗惡寒者去葛根冬月加麻黃夏月少加夏月加

此足太陽陽明藥也寒邪在經活散太陽之邪用此以止

此邪未入少陽代麻黃止

散陽明

之邪柴胡散少陽之邪

而節菴加用之寒將爲解故以黃芩葛根梗

清之

三葉西泄肺熱

柴葛草和之也

少陽

柴胡升麻湯

局方

治少陽陽明合病傷風甚頭痛脣口瘡目赤  
痰盛咳嗽唾沫稠粘及陽氣鬱遏元氣下陷

劉宗厚曰傷風  
一病仲景與傷

寒同論雖有麻黃桂枝之分主于傳變之後亦未嘗悉分之也諸家皆與惑冒四氣併中風條混治惟陳無擇別立傷風一方在四濁之首且依傷寒以太陽爲始分註六經可謂詳密但風本外邪諸方例用解表發表然受病之源亦有不同若表虛受風專用發表之藥必至汗多亡陽之症若內挾痰熱而受風亦宜內外交治不可專于解表也或曰此云表虛與傷寒中風表虛同歟予曰不同也彼以太陽中風而于有汗無汗分虛實實者加麻黃虛者加葛根俱解表也此云表虛者當固守衛氣而散風者也

柴胡

前胡

黃芩

六十末五錢

葛根

桑白皮

四兩

錢并方錢赤芍

石膏

雨一  
如晝三庄或二十粒煎

此足少陽陽明藥也陽明而兼少陽則表裏俱不可攻祇宜和解宜和柴胡芍藥之勢并葛根散陽明之邪升提清陽前胡消瘀下氣而解風寒及瀉利濕而止痰嗽荆芥疏風熱而清頭目赤為調營血而散肝邪芩清火于上中二焦石瀉熱于肺胃之部風進爲熱故以口加薑鼓者取其辛散而升發也

解表  
通劑

九味羌活湯即羌活仲和

湯張元素

治傷寒傷風憎寒壯熱頭身痛項痛脊強

嘔吐口渴太陽無汗及感冒四時不正之氣溫病初有物有聲曰嘔無聲曰吐胃寒則吐胃熱亦吐邪熱在表則不渴傳裏則渴四時不正之氣謂時當熱而反大涼時當寒而反大溫非時而有其氣也冬則傷寒不卽病者至春而發爲溫病至夏而發爲熱病餘症解見前

羌活  
防風  
蒼朮  
錢細辛  
川芎  
白芷  
生地黃  
葛根

五味子

桂枝

白芍藥

甘草

桔梗

厚朴

川芎

甘草

寇者隨身而滿也關門也月滿去地黃加枳殼桔梗喘加杏仁夏加石膏知母汗下兼行

## 加大黃

此足太陽傷藥以代桂枝麻黃青龍各半等湯也藥之辛者屬手人爲義故能匡正邪邪者苦者細辛皆辛藥也差活人足太陽爲撥亂反正之主藥除閉節痛甚無汗者倍之奈入足太陰辟惡而去濕能除濕下氣邪氣不致傳足太陰脾脾氣入足太陽明治頭痛在額川窮人足厥陰治頭痛在腦細辛人足少陰治木經頭痛皆能驅風散寒行氣活血而又加黃芩入手太陰以泄氣中之熱生地入手少陰以泄血中之熱黃芩苦寒生地清滯二味苟用于發熱之後則當若未發熱猶當議減也防風爲風藥卒徒隨所引而舞不至治一身盡痛爲便無汗宜借用甘草甘草用以協和諸藥也藥備六經治四時用者當

嘔症加減不可執

一張元素曰有汗不得用麻黃無汗不得用桂枝若

爲解表神方冬可治寒夏可治熱春可治溫秋可治濕是諸路之應兵代麻黃等誠爲穩當但陰虛氣弱之人在所禁耳

十神湯局

治時氣瘟疫風寒雨感頭痛發熱惡寒無汗咳嗽鼻塞聲

感冒四時不正之氣謂之時氣天災流行沿門闥境傳染相似謂之瘟疫頭痛發熱惡寒無汗邪在表也咳嗽鼻塞聲重風寒雨感故表實而氣爲之不利也按傷風

寒而咳嗽者其感爲輕

赤芍藥 等分加葛根煎  
麻黃 葛根 升麻 川芎 白芷 紫蘇 甘草 陳皮 香附

此陽經外感之通劑也吳鶴臯曰克人治風寒必分六經見症用藥然亦有發頭痛惡寒鼻塞而六經之症不甚顯此即前症亦陽不以經之可辨者李東垣之方也曰苦麻黃升麻葛白芷紫蘇陳皮香附皆辛香利氣之品故可以解散風寒之症諸藥以散表邪而又加

能解利陽明瘧疫時氣非正傷寒之藥若太陽傷寒發熱用之則引邪入陽明傳變發班矣慎之

傷寒無汗  
神木散海

治內傷令飲小咸寒而無汗者

內傷令飲則寒濕停于中無汗曰其寒飲食入胃則肺

寒肺寒則內外合邪是傷寒亦有由內而得者不特外感風寒而已矣寒能滯血故無汗亦治而症太陽純傷風傷先傷風後傷寒先傷風後傷濕及太陽過汗濕家過汗後血虛被傷風皆發症其症頭搖口禁手足搐搦項皆反張無汗爲風症有汗爲寒症亦有剛柔不分者不可純作風治宜清熱化瘀陳風養血亦有用大承氣者凡陽症不厥逆其厥逆者皆陰症也宜附子湯附子防風散桂心白朮湯

蒼朮製防風二兩甘草一兩

炙

加生薑葱白如太陽證般恐寒脉浮

緊者加羌活浮緊帶洪者是兼陽明加黃芩浮緊帶絃數者是兼少陽加柴胡婦人加當歸

此足太陽藥出防風辛溫升浮除風勝濕爲太陽主藥蒼朮甘溫辛烈

散寒發汗辟惡升陽

能升胃口能升中

乃海藏所製以代

桂枝麻黃二湯者也喻嘉言曰此海藏得意之方蓋不欲無識者輕以麻黃桂枝之熱傷人也昌明仲景不得不表揚海藏之功

本方除羃木加白朮三兩薑三片不用藜白水湯

海藏治前症有汗者

二木主治畧同第  
有止汗發汗之異

亦治柔症

有汗爲柔症風而兼溫故多汗

大無神木散羃木

泔厚朴薑汁炒各一錢陳皮去白二錢

甘草多藿香石菖蒲各錢

治感出風癰氣憎寒壯熱一身盡痛頭面腫大癰癰時毒

濕熱時毒感于口鼻傳入

陽明邪正交爭陰勝則憎寒陽勝則壯熱流于百節則一身盡痛上行頭面則爲腫大名大頭瘟瘡木辛烈升陽辟惡燥濕解鬱厚朴苦溫除濕散滿化食厚腸陳皮理氣通利三焦廿草和中匡正脾土此卽平胃散而重用陳皮爲君者也蓋人之一身以胃氣爲主胃氣強盛則客邪不能入故治外邪必以強胃爲先也加藿香菖蒲取其辛香通竅亦能辟邪而益胃也吳鶴臯曰太無此方但理脾胃而解瘴之妙自在其中不愧爲丹溪之師矣