

壽世保元二



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学图书馆

新刊醫林狀元壽世保元乙集卷之三

太醫院

吏目金谿雲林龔廷賢子才編

司邑後學周亮登元龍校

中風

脉微而數中風使然○風邪中人六脈多沉伏亦有脉隨氣奔指下洪盛者○夾寒則脉帶浮遲夾暑則脉虛夾濕則脉浮濶○大法浮遲者吉急疾大數者凶

風者百病之長也卽內經所謂偏枯風痱風懿風痺是也而有中腑中臟中血脉中經絡之分焉夫中腑者爲在表中臟者爲在裏中血脉中經絡俱爲在中在表者宜微汗在裏者宜微下在甲者宜調榮中腑者多着四肢加手足拘急不仁惡風寒爲在表也其治多易用疏風湯之類中臟者多滯丸煎膏緩失音耳聾曰督二便閉澀爲在裏也其治多難用滋潤湯之類中血脉者外無六經之形證內無便溺之阻隔肢不能舉口不能言爲在中也用養榮



湯之類中經絡者則口眼喎斜亦在中也用復正湯之類其間又有氣血之分焉血虛而中者由陰血虛而賊風襲之則左半身不遂用四物湯加鈞藤竹瀝薑汁以補血之劑爲主氣虛而中者由元氣虛而賊風襲之則右半身不遂用六君子湯加鈞藤竹瀝薑汁以補氣之劑爲主氣血俱虛而中者則左右手足皆不遂用八珍湯加鈞藤竹瀝薑汁或用土池飲乃治諸風生痱右癥之神方也然則類中風者如中寒中暑中濕中火中氣食厥勞傷房勞等證如中於寒者謂冬月卒中寒氣昏冒口噤肢挾惡寒脉浮緊也用理中湯之類中於暑者謂夏月卒暴炎暑昏冒痰厥吐瀉喘滿用十味香薷飲之類中於溫者丹溪所謂東南之人多因濕土生痰痰生熱七生風也用清燥湯之類加竹瀝薑汁中於火者河間所謂非用木之風內中六淫之邪外侵貞由五志過極火盛水衰氣熱佛鑑昏冒而所作也用六味地黃丸四君子湯之類內有恚怒傷肝火動土炎者用小柴胡湯之類中於氣者由七情過極氣厥昏冒或牙關緊急用蘇合香丸或藿香正氣散之類若誤作風治者死也食厥者過於飲食胃氣自傷不能運化故昏冒也用六君子湯加木香

之類勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛衰不任風寒故昏冒也用補中益氣湯之類傷於房勞者因腎虛精耗氣不歸元故昏冒也用六味地黃丸之類此皆類中風也蓋內經主於風外經主於風河間主於火東垣主於氣丹溪主於濕而爲暴病暴死之症類中風非真中風也治者審之有卒中昏冒口眼喎斜痰氣上壅咽喉有聲六脉沉伏此真氣虛而風邪所乘用三生飲一兩加入參一兩煎服卽甦若遺尿手撮口開竇卽爲不治用前藥亦有得生者是乃復經絡祛寒痰之藥有斬闕奪旗之功每服必用人參兩許以祛其邪而補助真氣否則不奏效矣有因虛火與湿痰涎壅盛口眼喎斜不能言語牙關緊急昏倒不知人事將病人足大指中間半甲半肉上并人中名重掐一下至體卽用奪命通關散搐鼻候有嚏可治無嚏不治如牙噤不開用烏梅肉擦和南星細辛未以中指蘸藥擦牙自開隨以蜜湯調奪命通關散二匙卽止其痰以通經絡亦上湧意也得噫氣轉卽進膈生飲或清熱導痰湯之類皆効人事稍醒關節動活且先以理氣爲急中後氣未盡順痰未盡消調理之剉淮當以藿香正氣散加南星木香當歸防風一二劑後次隨證而調之子

觀古人之方多用攻擊之劑施於北方風大勁之人間或可也用於南方風土柔弱之士恐難當耳予僭補前人之缺一言天下之通宜若天地之南北人身之虛實固有不同其男子婦人大略相似學者當通變而治之慎毋膠柱以調瑟也

理中湯

見中寒十味香薷飲見中暑

清燥湯

見養陰四君子湯見補益小柴胡

胡湯

見傷寒藿香正氣散見霍乱蘇合香丸見諸氣

中風惡證

口閉者心氣絕遺尿者腎氣絕手撒者脾氣絕鼻鼾者肺氣絕及髮直吐沫瞞如直視聲如歛睡者不治之症也及筋枯不治牽動則筋痛是無血以滋養其筋故也面赤如枚而赤黑汗綴如珠不治之症也

○一論中風中氣痰厥不省人事牙閼緊急湯水不下宜奪命通關散

皂角

如猪牙者去皮弦二兩用生白

礬一兩以苧布包入乾取出曬乾爲末

遼細辛

去上葉爲辛化去帛再煮令

乾取出曬乾爲末

右合句每遇瘧厥或喚閉不省人事者先以少許吹鼻候有喚可治無喚不可治却用蜜湯調服二匙卽吐痰不吐再服

○一方用半夏爲末用少許吹鼻卽効

○一治牙噤不聞用烏梅肉揉南星細辛末以中指蘸藥擦牙自開

○一治中風痰迷不省人事者用巴豆去殼紙包搗油在紙上將麝少許入紙捲作桐油浸透燒烟吹滅重算

○一治中風不語或倒地不省人事及在癱石瘡口眼喎斜須以諸藥水服之先用

真麝香三分爲細末加麻油三兩置口將病人口幹開灌下通其閑竅卽便甦醒

○一論卒中不問中風中寒中暑中濕及瘧厥氣厥之類不省人事初作用此攝生飲

南星

溫五分

半夏

湯泡五分

木香

一錢

蒼朮

一錢

遼細辛

一錢

石菖蒲

一錢

甘草

生一錢

○一論中風痰涎壅盛不能言語不省人事牙關緊急有火有痰有氣或頭赤身熱手足溫緩脉緊盛宜服此方

清熱導痰湯

黃連

黃芩

瓜蔞老

去枳

賈竦

桔梗

白朮

去芦

升麻

白芍

芩陳皮

半夏

南星

人參

甘草

右剉一劑生薑三片棗一枚水煎熟入竹瀝薑汁同服

○一方加防風白附

子尤効

○一論中風昏冒不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛宜並服之兼治癰厥飲厥及氣虛眩暉症屬虛寒者宜服

三生飲

南星生

五分

川芎

去皮尖

大附子

生一粒去皮尖

木香

一錢半

右剉一劑生薑十斤水煎溫服

○氣虛之人虛弱之甚

加人參一兩

○如氣

虛

加黃耆一錢半

○如氣

虛

加黃耆一錢半

○如氣

虛

加黃耆一錢半

盛人只用南星五錢木香一錢生薑十四片水煎服名星香散

○一論中風卒然倒仆牙關緊急不省人事并解上膈壅熱痰涎不利咽喉腫
閉一應熱毒又能消食化氣兼治食癟取積下熱并經喉風卒死心頭猶溫
虛起立甦

雄黃解毒丸

方見小兒通治

壯盛之人暫服

○一論中風暗風痰厥氣厥不省人事宜

牛黃紫金丹

牛黃三分 硫砂二分 阿芙蓉一升 沉香一分 冰片三分
廣木香五分 麝香二分

右爲細末人乳爲丸四十數陰乾每服一丸梨汁送下如無梨汁薄荷湯研
化灌下立甦

○一論初中風邪四肢麻痺骨節疼痛手足癱瘓語蹇癥宜服此方
烏藥順氣散

烏藥

陳皮各二两 麻黃去節

川芎

當归



桔梗

枳殼

炒去殼各分

乾薑各五分甘草三分

炙去滓分

右剉一劑薑盛煎服○口眼喎斜加左癱右瘓加大麻當歸皮膚燥癢加

○一論風中腑者多着四肢手足拘急不仁面加五色藥風寒爲在表也宜用

當炒黃連羌活防風荆芥竹煙薑汁加蟬退薄荷

○此方

陳風湯

當歸

白茯苓

去皮陳皮

半夏泡炒

烏藥

川芎

白芷

羌活

防風各八分

麻黃

五分

甘草

細辛各二分

右剉一劑生薑三片水煎熱服

○一論風中臟者多滯丸塞脣緩失音耳聾鼻塞目瞀二便閉澀爲在裏也宜

此方

滋潤湯

當歸

生地黃

枳殼去殼

厚朴姜炒

梔榔

大黃

火麻仁

杏仁去皮各

羌活七分

紅花三分

右剉一劑水煎空心溫服

○一論中風一切風熱大便閉結小便赤濁頭面生瘡眼目赤痛或熱極生風舌強口噤或鼻生紫赤風刺癰疹而爲肺風或成風瘻而世呼爲大風或腸風而爲痔瘡或腸鬱而爲諸熱譯妄驚狂並皆治之

防風通聖散

防風

當歸

川芎

白芍

連翹

薄荷

麻黃各四分

石膏

桔梗

黃芩各八分

白朮

梔子

荆芥各三錢

滑石各四分

大黃

芒硝各四分

甘草二錢

右剉一劑生薑煎服○自利去硝黃○自汗去麻黃○解利四時傷寒兩感每一兩加益元散一兩葱白十根豆豉一撮生薑五片水煎熟服○一論風中血脉者外無六經之形症內無便溺之阻隔服不能舉口不能言爲在中也宜此方

養榮湯

當歸酒洗

川芎

白芍酒炒

生地黃

麥門冬去心

遠志

甘草湯泡去心

石菖蒲去毛

南星

菖蒲制灰

半夏

菖蒲製

陳皮

白茯苓去皮

枳實

麸炒

烏藥

黃連

菖蒲炒

防風

羌活

秦艽

甘草

右各等分加竹茹一團生薑三片水煎服

○一治中風痰癥舌塞不語并失音不能言語用此方

轉舌膏

連翹

一兩

梔子

五不

黃芩

酒炒

薄荷

一兩

桔梗

五不

大黃

酒水五分

玄明粉

五不

防風

五小

川芎

三不

遠志

甘草湯泡

一兩

石菖蒲

六分

甘草

五不

尾角

二不

柿霜

一兩

牛黃

五不

琥珀

珍珠

一不

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大硃砂五錢爲衣每一丸細嚼薄荷湯送下食後臨卧服

○一治中風失音用韭菜汁灌之或用白僵蚕末酒調服



○一治舌大不能言語

青黛

冰片

三分 砂二錢

牛黃三分

南薄荷葉三錢

右爲細末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之將藥蜜水調一杯擦舌上

○二治中風不語痰迷心竅舌不能言

南星

二兩

防風

五分

右爲細末麵糊爲丸如梧桐子大每服五十丸薑湯送下

○一治中風卒不得語以苦酒煮白芥子付頸一週以吊包之一日一夕即瘥

○二治中風瘡症不能言

大黃

一兩

芒硝

一兩

當歸

二兩

甘草

五分

右剉水煎服瀉下後用四物湯加殼蟇一

兩作二三服之

○一治腎氣虛弱舌瘡不能言足癰不能行

地黃飲子

熟地黃

巴戟

去心

石棗

酒蒸去核

肉蓯蓉

酒洗薄荷少許

石斛

大附子炮

五味子

白蒺藜

去皮

石菖蒲

遠志

甘草水酒去心官桂

麥門冬

去心

右剉生薑棗子水煎溫服

○一論風中經絡則口眼喎斜也宜此方

復正湯

防風

荆芥

細辛

黃芩

烏藥

天麻

當歸

酒泡

白芍

酒炒

川芎

白术

去草

白茯苓

去皮

陳皮

去白

半夏

枳殼

去穰
炒

白芷

桔梗

僵蚕

甘草

右剉生薑煎服

○一治口眼喎斜及手足頑麻

荳蔻

米泔水炒

陳皮

三兩

南星

二兩
五分

半夏

二兩

白茯苓

二兩
五分

粉草

大錢

右剉生薑三片水煎臨服入生薑汁三匙溫服



○一治諸風口眼歪斜

金刀如意散

川烏泡

鐵錢

二草烏泡

錢

防風

一錢

川芎

二錢

白芷

四錢

不雄黃

三分

細辛

三不

蒼朮

四不

天麻

五分

白水

五分

麻黃

五分

右爲細末每服五分臨卧溫酒調服

○一治中風口眼不正語則牽急四肢如故

一人耳客於陽明之經故合筋急不調而口

金僻也

皂角

大皂角五兩去皮子爲末以三年米醋和成膏在嘴塗右石嘴塗左乾更塗之

○一方用新礦石灰一合以酸醋炒調如泥口面歪向右卽於左邊塗之向左卽於右邊塗之候正如舊卽須以水洗下大効

○一治卒暴中風口眼喎斜

天仙膏

天南星

草烏

白芨

俱用大者

僵蚕

七錢

右爲細末薑汁調如前塗正便洗去

○一治口眼喎斜

正顏丹

白芷

獨活

薄荷

右爲細末蜜丸如彈子大每服一丸細嚼茶清下

○一論癱瘓之症因虛而瘀火流注爲病當時遇治爲妙若失之於初瘀火停久便成贅瘤久便生火火能傷氣耗血而瘀猶難治矣如疼痛則爲實用疎通關節之藥而與腦麝少許爲引經如不痛則爲虛服此疎通關節之藥亦要兼服補氣血藥如此攻補兼施而癱瘓可愈矣

○一論癱者垣也筋脉弛緩坦然而不舉也瘓者渙也血氣散漫渙然而不用也或血虛或氣虛皆正氣虛不足之症也

○一論中風手足軟弱不能舉動外症自汗者虛中風也若手足強急口眼喎斜伸縮痛者實中風也



南京中医药大学图书馆所有
医药大学图书馆版权所有

○一論中風左癱左半身不遂屬血虛乃瘀水流注於左而爲左癱也宜後方
○一論中風右瘓右半身不遂屬氣虛乃瘀水流注於右而爲右瘓也宜後方
○一論一切中風左癱右瘓半身不遂口眼歪斜語言蹇澁呵欠噴嚏頭目眩
暈筋骨時痛頭或痛心中忪悸痰火熾盛此乃血氣太虛脾胃虧損有瘀有
火有風有濕此總治諸風之神方也

上池飲 即愈風潤燥湯加入參烏藥

人參去皮

二錢

白芍去芦

五錢

炒

白蒺藜去皮

一錢

當歸酒洗

一錢

當歸酒洗

二錢

當歸酒洗

溫服亦可

○一論中風等症因內傷者非外來風邪乃本氣自病也多因勞役過度耗散真氣憂喜忿怒傷其氣者而卒倒昏不知人則爲左癱右瘓口眼喎斜四肢麻木舌本強硬語言不清等證宜此方

補中益氣湯

黃芪

蜜水炒
十五分

一人參

去皮
不
一两

白朮

去蒲芦
炒
五分

陳皮

一两

當歸

酒珠
錢

柴胡

去芦
五分

升麻

五分

甘草

炙一两

右剉一劑生薑

牽牛子水煎服加酒炒黃柏三分以滋腎水瀉陰中之伏火也

紅花三分而入心養血

○一中風卒倒因勞傷者過於勞役耗損元氣脾胃虛弱不任風寒故昏冒也宜本方

○一左癱右瘓加防風羌活天麻半夏南星水香

○一語言蹇澁加石菖蒲滑石

○一目眼喎斜加葛根炒黃連羌活防風荆芥竹瀝葛汁

○一中風瘓瘻因中氣虛飲食素少忽瘞壅氣喘頭搖目劄揚手擲足難以候