

傷寒原文讀本

吳縣汪玉齡述

辨太陽病脈證并治法

太陽之為病脈浮。尺。寸。俱。浮。頭。項。強。痛。而。惡。寒。諸。陽。為。

太陽之為病。脈。浮。太。陽。之。會。風。寒。初。受。必。先。惡。寒。此。為。太。陽。之。會。風。寒。初。受。

太陽病發熱汗出惡風脈緩者名為中風。此。為。風。傷。

之。提。綱。名。曰。中。風。非。中。府。中。藏。中。血。脈。之。謂。蓋。中。風。證。

與。傷。字。同。義。仲。景。不。直。言。傷。風。者。恐。後。學。不。察。以。咳。

立。論。故。以。中。字。別。之。也。同。

傷寒一日太陽受之脈若靜者為不傳頗欲吐若躁。

太陽病或已發熱或未發熱必惡寒以傷寒必惡寒無風時亦覺其寒非若惡風者有風始覺其寒其寒也。

煩脈數急者化寒邪為傳也

傷寒二三日陽明少陽症不見者為不傳也

太陽病發熱而渴不惡寒者為溫病此明溫病與傷寒大異若

發汗已身灼熱者名曰風溫風溫為病脈陰陽俱浮

自汗出身重多眠睡息必鼾語言難此因誤汗所致若被下

者小便不利津液竭直視太陽不足失溲膀胱不約此

若被火者一微發黃色火炎劇則如驚癇時瘵火盛

生風也瘵音綴若火熏之再一逆尚引日再逆促命期

言命必危殆

病有發熱惡寒者發於陽也無熱惡寒者發於陰也
發於陽者七日愈發於陰者六日愈以陽數七陰數

六故也

此條義該全
部傷寒論

太陽病頭痛至七日以上自愈者以行其經盡故也

若欲作再經者鍼足陽明

三里穴

使經不傳則愈

太陽病欲解時從巳至未上

巳午未太陽乘王也

風家表解而不了了者十二日愈

病人身大熱反欲得近衣者熱在皮膚寒在骨髓也

表熱病人身大寒反不欲近衣者寒在皮膚熱在骨髓也

表寒
裡熱

太陽中風陽浮而陰弱陽浮者熱自發風在表故陽

實陰弱者汗自出衛氣有邪則不能護營則陰晉晉

惡寒淅淅惡風翕翕發熱鼻鳴乾嘔者風逆擁桂枝湯

主之

桂枝湯

桂枝 三兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

生姜 三兩

大棗 十二枚

右五味㕮咀以水七升微火煮取三升去滓適寒

溫服一升。服已須臾。歔熱稀粥一升。以助藥力。溫
覆令一時許。通身熱。熱微似有汗者佳。不可令如
水流漓。病必不除。若一服汗出病差。停後服。不必
盡劑。若不汗。更服。依前法。又不汗。後服當小。但其
間半日許。令三服盡。若病重者。一日一夜服。周時
觀之。服一劑盡。病證猶在者。更作服。若汗不出者。
服之二三劑。禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪臭惡等

物。此解肌
之方

太陽病。頭痛發熱。汗出惡風者。桂枝湯主之。

此桂枝湯為

症總

太陽

病項背強几几

音殊而仲

形容不能伸頸之象

欲

反汗出惡

此風者

表桂枝加葛根湯主之

陽之邪將入陽明故用

桂枝加葛根湯方

桂枝湯原方桂枝芍藥各減一兩加葛根四兩餘

同右六味以水一斗先煮葛根減二升去上沫內

諸藥煮取三升去渣覆取微似汗不須啜粥

太陽病下之後其氣上衝者可與桂枝方用前法若

不。上。衝。者。不。可。與。之。
若。上。衝。邪。在。陽。部。未。入。裡。也。

治。論。中。誤。治。諸。法。詳。觀。自。明。

太。陽。病。三。日。已。發。汗。若。吐。若。下。若。溫。鍼。仍。不。解。者。此。
為。壞。病。桂。枝。不。中。與。也。觀。其。脈。證。知。犯。何。逆。隨。證。治。
之。

桂。枝。本。為。解。肌。若。其。人。脈。浮。緊。發。熱。汗。不。出。者。
此。屬。營。不。可。與。也。常。須。識。此。勿。令。誤。也。

若。酒。客。病。不。可。與。桂。枝。湯。
酒。客。內。熱。喜。得。湯。則。嘔。以。

酒。客。不。喜。甘。故。也。

喘家作桂枝湯加厚朴杏子仁佳

凡服桂枝湯吐者其後必吐膿血也受肺傷胃

太陽病發汗遂漏不止發汗太過其人惡風靈表小便難津

少四肢微急難以屈伸者經曰液脫者骨屬屈伸難利液

而伸乃津脫陽靈之象但不致六陽耳若更甚桂枝加

附子湯主之

桂枝加附子湯方

桂枝湯原方加附子一枚炮去皮破八片餘同

太陽病下之後脈促胸滿者客中靈而表邪桂枝去芍

藥湯主之。若微惡寒者，去芍藥，方中加附子湯主之。

觀後條桂枝證醫反下之利遂不止。脈促者，表未解也。

喘而汗出者，葛根黃連黃芩湯主之。脈促而喘者，汗出者，有連黃連之苦寒，為胸滿者，至此為

益陰之芍藥，且以微惡寒而加附子，彼為陽盛，此為

陽虛，誰云不然？而何以諦審於毫釐千里之間？是在學者於脈證中參觀得之也。

之陽虛，誰云不然？而何以諦審於毫釐千里之間？是在學者於脈證中參觀得之也。

桂枝去芍藥湯方

桂枝湯原方去芍藥，餘依前法。

桂枝去芍藥加附子湯方

桂枝湯原方去芍藥，加附子一枚，炮，去皮，破八片。

餘依前法。

太陽病得之八九日如瘧狀發熱惡寒熱多寒少已邪

漸其人_不嘔非少清便欲自可無裡一日二三度發

瘧脈微緩者不浮不緊為欲愈也脈微而惡寒者此陰

陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也亦病氣雖除正氣

之不可更用面色反有熱色者未欲解也表邪未解

以_其不得小汗出身必痒宜桂枝麻黃各半湯桂枝以

解肌表麻黃半以解表

桂枝麻黃各半湯

桂枝一兩芍藥六銖

甘草炙

麻黃各一兩

醫方集解

杏仁

皮廿四粒去

生薑切一兩

大棗

擘四枚

右七味

以水五斗先煮麻黃一二沸內諸藥煮取

八升八合去渣溫服六合

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府因

氣凝結於太陽之要路故藥力不能流通刺之以泄

脈陽維之府在項上入髮際一寸大筋內宛宛中督

髮際陷者中足少陽陽維之顓顓後却與桂枝湯則愈

服桂枝湯大汗出脈洪大者虎白與桂枝湯如前法

當以味有煩渴猶若形如瘡日再發者肌表之汗出必

解宜桂枝二麻黃一湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝

一兩七銖

芍藥

一兩六銖

麻黃

十六銖
去節

杏仁

十六個

甘草

一兩二銖

生薑

一兩六銖

大棗

五枚
擘

右七味

以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥煮取二升

去滓溫服一升日再服

服桂枝湯

大汗出後大煩渴不解

因汗多而胃液乾
枯陽明之火獨熾

脈洪大者

白朮加人參湯主之

白虎加人參湯方

知母 六兩

石膏 一斤 碎

甘草 二兩

粳米 六合

人參 三兩

石五味以水一斗煮米熟成湯去滓溫服一升日

三服

太陽病發熱惡寒熱多寒少脈微弱者此無陽也此

陽與亡陽不同并與他處之陽虛亦別以其人本非

壯盛而邪氣亦輕故身有寒熱而脈微弱故以此湯

清蹠營衛令得似汗而解况熱多寒少熱在此
二越脾一湯
宜桂枝

桂枝二越脾一湯方桂枝湯加麻黃石膏二味

桂枝

芍藥

甘草

麻黃各十銖

大棗

生姜二兩

石膏碎二十四銖

石七味以水五升煮麻黃一二沸去上沫內諸藥煮

取二升去滓溫服一升

服桂枝湯

既治或下之裏又治

仍頭項強痛翕翕發熱

治不無汗心下滿微痛小便不利者桂枝湯去桂加

茯苓白朮湯主之此非桂枝證乃屬飲家也蓋無汗但

停心下滿而微痛病不在表越小不便不利水不下泄

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

宜逐飲故以此湯主之不得更發汗也

桂枝湯方內去桂枝加茯苓白朮各三兩餘依前

法煎服小便利則止服

傷寒脈浮表證自汗出表虛小便數心煩微惡寒以上俱

症脚攣急裏虛之象只此一症非桂枝症矣凡辨

足心上股內後廉今汗多液反與桂枝湯欲攻其表

此誤也得之便厥咽中乾煩躁吐逆者有陽越作甘

草乾姜湯與之以復其陽此陽不致若厥愈足溫

者更作芍藥甘草湯與之其脚即伸此湯乃純陰之

脚陽兩和而若胃氣不和譫語者在邪熱少與調胃承氣

湯若重發汗復加燒針者已陽極四逆湯主之

甘草乾姜湯方

甘草

炙四兩

乾姜

炮二兩

右㕮咀以水三升煮取一升五合去滓分溫再服

芍藥甘草湯方

白芍

酒洗四兩

甘草

炙四兩

右二味以水三升煮取一升半去滓分溫再服

調胃承氣湯方

大黃

清四兩去皮

甘草

炙

芒硝

各二兩

四逆湯方
 甘草二兩 乾姜二兩
 附子一枚
 右三味以水三升煮
 取一升二合去渣分
 溫再服

右三味以水三升煮取一升去滓內芒硝更上火

微煎令沸少溫服

問曰證象陽旦旦活人書云桂枝湯加黃芩曰陽按法

治之而增劇厥逆咽中乾兩脰拘急而謔語按以上言

方而病不應師言夜半手足當溫兩脚當伸後如師

言何以知之答曰寸口脈浮而大浮則為風大則為

虛風則生微熱虛則兩脰攣病証象桂枝因加附子

參其間桂枝加附子湯猶桂令汗出附子溫經亡陽故也厥

兩脰拘急即厥逆咽中乾煩躁陽明內結陽越譫語