

雜病篇

霍亂

嘔吐

咳嗽

東醫寶鑑

十三

東醫寶鑑雜病篇卷之五

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

霍亂

霍亂之因

內經曰土鬱之發民病嘔吐霍亂注下又曰太陰所至為中滿霍亂吐下又曰歲土不及

風乃大行民病飧泄霍亂體重腹痛筋骨搖併外
霍亂之病皆因飲食非關鬼邪針○內有所積外
有所感陽不升陰不降乖隔而成非因鬼邪皆飲
食所致此先哲確論也明○霍亂者揮霍變亂也
凡人為系有鬱熱外又感寒一時陰陽錯亂然病
本因食失節生冷過度以致濕熱內甚中焦失
運不能升降是以上吐下瀉○霍亂或因飲冷
或冒寒或失飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人
吐瀉併作用藥遲緩須臾不救○霍亂多責於
熱故夏秋為盛○霍亂之病由風濕喝三氣之
合辰也風者肝木也濕者脾土也喝者心火上也肝
主筋故風急甚則轉筋也吐者喝也心火炎上也故

嘔吐泄瀉世者脾土也脾濕下流故泄瀉也
啓玄子曰皆脾熱所生也斯言爲正

霍亂形證

霍亂證心腹痛卒痛嘔吐先腹下利增寒壯熱頭痛

痛吐利並作甚則轉筋入腹即死○三焦爲水

穀之道邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利

而不吐邪在中焦則吐利並作病因飲食不節清

濁相干陰陽乖隔輕者只曰吐利重者揮霍變亂

乃曰霍亂因邪入脾胃故發爲吐利○霍亂

證夏秋爲多寒月亦有之蓋有伏暑而作○入

之歲府冷熱不調或飲食不節生冷過多或起居

失宜露卧當風使風冷之氣歸於三焦傳於脾胃

脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干飲食變

脉法

霍亂脉浮洪可救脉微遲而不語氣少則難差

霍亂脉伏或絕○脉代者霍亂代而亂者亦霍

亂又關脉滑為霍亂吐瀉又滑而不勻必是霍亂吐瀉之候脉代勿訝○滑數為嘔代者霍亂微滑者生流數而虛或結或促或代皆不可斷以死脉而伏或大而虛或結或促或代皆不可斷以死脉

可救故也○脉浮大而洪

霍亂有乾有濕此病有乾霍亂濕霍亂乾霍亂吐利則所傷之物得多

以也乾霍亂甚重胃中水穀泄盡則止矣所以死者少也乾霍亂死者多者以其上不得吐下不得利

絕陰陽煩擾悶躁喘脹而死矣○氣隔

乾霍亂治法吐利不得謂之乾霍亂○乾霍亂者忽然

頃刻之間便致悶絕急用鹽湯吐之續以理中湯

赤茯苓枳殼木瓜煎服或吞下蘇合香元尤妙○乾霍亂最難治死在須臾升降不通故也當先

加解以提其氣之橫格不可用涼藥宜二陳湯痰方見

手足。絞腸沙者乃乾霍亂一名也。腹痛不可忍或

正氣關格陰陽煩躁喘脹者必死急用吐法鐵委

中或欲出血無服治中湯

薑鹽湯

治乾霍亂欲死鹽一兩生薑切半兩右同炒

濕霍亂治法

為上吐下瀉謂之濕霍亂。凡霍亂吐瀉渴

散寒多不飲水宜理中湯。熱多欲飲水宜五苓

用藿香正氣散。寒月虛冷用理中湯。寒方見暑

以分消上下更益元氣。散黃連散。加味薑附湯。回

生。白朮。減正氣散。中暑霍亂宜香薷散。附桂

事。南星末三錢。棗三枚。薑五片。煎極熱服一服。可

服亦效

木黃散

治霍亂吐瀉肢體轉筋逆冷木瓜吳茱萸食

藥同煎至二升分冷煖任意服即效○如無前藥枯

白礬末一錢沸湯調服如無白礬只用鹽一匙醋

二香黃連散

治伏暑霍亂腹痛躁悶脉沉手足冷霍

各一錢黃連澤瀉各八分甘草三分右

加味薑附湯

治霍亂吐瀉過多手足逆冷氣少不語

半甘草炙七分右剉作一貼水煎服

回生散

治霍亂吐瀉過多但一點胃氣存者服之回

服

加減正氣散或異鄉人或初到他方不伏水土遂成霍亂

砂研香附半夏甘草各一錢右剉作一貼

香薷散治中暑霍亂吐瀉腹痛轉筋四肢逆冷

益元散一名六一散治霍亂吐瀉取此

霍亂後轉筋陽明屬胃與大腸以養宗筋暴吐暴瀉

而已重者遍體轉筋入腹手足厥冷危甚風燭矣

倉卒之際以益填臍中灼艾不計壯數雖已死而

胃中有煖氣者立甦急用木葱散坊見加香甘

草紫蘇葉煎服再研大蒜塗兩脚掌心則雖昏危

入腹者亦效。霍亂吐瀉過多遍體轉筋手足

厥冷氣欲絕者急灸臍中又取蓼一把煎湯泡洗

次投附子理中湯方見即效。霍亂後轉筋理

中湯方見。白朮加生附子一箇。轉筋屬血熱四物湯方

見。加酒。芍藥。花。蒼朮。南星。煎服。見。吐瀉脇痛轉

筋脉弦者木克土也平胃散加木瓜五錢煎服

木瓜湯

治霍亂轉筋木瓜四錢吳茱萸二錢茴香炒一錢甘草炙四分右剉作一貼入薑三片紫

蘇一箇同煎服

一法

治轉筋不止欲死男子以手挽其陰牽之女子則挽其乳近兩傍牽之此千金方妙法也

霍亂後煩渴

吐瀉既多津液暴亡以致煩渴引飲不止宜桂苓白朮散五苓散寒方

冬湯加減薤芩湯止渴

桂苓白朮散

治中暑霍亂吐瀉煩渴滑石一兩寒水石石膏澤瀉甘草各五錢白朮白茯苓

人參桂枝各二錢半右為末每三錢白湯或新汲水調下生薑湯亦可

麥門冬湯

治霍亂後煩渴麥門冬二錢陳皮半夏白朮白茯苓各一錢小麥半合人參甘草各

五分右剉作一貼入薑三片烏梅一箇水煎服

椒豆散

治霍亂吐瀉後煩渴不能服藥或水藥不入

水調下或水煎服
七粒菜豆二十一粒為末一名胡椒湯調下胡椒

加減薤苓湯

治霍亂熱渴天花粉二錢赤茯苓一錢
猪苓澤瀉香薷乾葛各七分黃連白朮

甘草各五分
貼入薑三片水煎服

止渴湯

治同上人參麥門冬赤茯苓桔梗瓜蒌根澤
瀉葛根甘草各五錢右為末蜜水調二錢服

心丹

霍亂後虛煩

霍亂後虛煩不得眠或熱渴宜竹葉
石膏湯寒方觀參胡三白湯

參胡三白湯

治霍亂後煩熱口乾脉數或頭身痛柴
胡白朮白茯苓白芍藥當歸陳皮麥門

冬施子仁廿草各八分一人參五分五味子十粒
右剉作一貼入棗二梅一燈心一團煎服

既濟湯

治霍亂後虛煩不得眠參門冬二錢人參
葉半夏附子炮甘草炙各一錢右剉作一貼

入薑五片粳米百粒水煎服

霍亂吐法

治乾霍亂心腹刺痛煩冤吐利不得氣欲絕者極鹹鹽湯熱飲一升刺口令吐不吐則再

飲一升須三吐使宿食盡乃止此法大勝諸治吐

訖以理中湯藿香正氣散款緩調治○又法急以鹽湯一盞入童便薑汁頓服探吐

霍亂熨法

護頓其胃前并腹痛不可忍炒鹽二握紙包紮

則又法續以炒鹽熨其背則十分無事○又法鹽炒吳茱萸熨臍下亦效

霍亂鍼法

乾霍亂刺委中絞腸沙證手足厥冷腹痛不可

可忍以手蘸溫水即愈○又法用麻打有紫黑點處以鍼刺去惡血即愈

霍亂者乃寒濕太甚脾被絆而不能動氣液鬱而

不能行所以卒痛而手足厥冷俗名絞腸沙者蓋言痛之甚也北方刺青筋以出氣血南方割膏背

門入

霍亂大轉筋入腹手足厥冷氣欲絕以鹽填臍

死而腹中_有煖氣者依上法灸之亦甦鑿鑿○又法
灸氣海二七壯少氣者依上法灸之亦甦鑿鑿○又法
樞氣中脘立愈師○霍亂諸法不效灸大椎即
效綱○霍亂已死但有煖氣者灸承筋七壯立甦日綱

霍亂吐瀉之時切過半日與穀食雖米湯一呷下咽

法霍亂吐瀉之時切勿與穀食雖米湯一呷下咽
漸而將息正○霍亂吐瀉時慎勿與粟米粥湯入
胃必死矣○霍亂不可遽與米飲粥飯以助邪
氣必所傷物盡然後稀粥漸養之○霍亂寺
大忌飲食入腹則死只喫米水不妨不可飲熱湯
切不可飲熱酒燒酒刷

不治證霍亂如亂轉筋腹痛四肢厥冷氣欲絕其脉共大可

煩躁者不治效得乾霍亂吐瀉不得胃腹脹硬面

唇青黑足冷過肘膝六脉伏絕氣喘急舌短囊

水疾吐瀉已乘船亦大好明渴飲白水者即死飲童尿最好自

亦好亦好亦好亦好亦好亦好亦好亦好

單方凡二十

鹽治乾霍亂鹽一大匙熬黃取童

鍋底墨治霍亂投其中急攪服吐瀉立止乾

甘爛水治霍亂入藥煎

生熟湯一名陰陽湯治乾霍亂能吐宿食惡毒之物

生薑

治霍亂欲死生薑五兩切取斗

天南星

治吐瀉不止四肢逆冷不省人事南星為末每三錢入大棗三枚同煎服四肢漸煖神識

便省神妙

蘆花

取一名蓬蘽治霍亂氣息危急者

皂角

乾霍亂許調服探吐即效

木瓜

治霍亂吐瀉轉筋不止煮汁飲之

烏梅

治霍亂煩渴木漬和蜜飲之妙

林檎

青色者治霍亂吐瀉甚妙

秫藷葉

治霍亂轉筋筋大如桃李

粟米泔

治霍亂煩渴飲數升立差又研米

糯米

治霍亂吐瀉取汁任意飲之

麥

治霍亂轉筋濃煎乘熱熏洗因取飲一二盞即愈效

香薷

治霍亂吐瀉即止○治霍亂不可闕也

小蒜

治霍亂吐瀉煮汁飲之

牛糞

治霍亂吐瀉取清汁頓服一升即止

烟鹿皮

或取汁頓服治乾霍亂即吐神效

醋

治霍亂未得吐下飲一二升良○治轉筋取

牛涎

小兒霍亂牛涎一合灌下立效

嘔吐

嘔吐之因

內經曰諸嘔吐逆衝上皆屬於火○胃膈熱甚則為嘔火氣炎上之象也

俱屬於胃胃者總司也以其氣血多為異耳嘔者陽明也陽明多血多氣故有聲有物氣血俱病也吐者太陽也太陽多血少氣故有物無聲乃血病也有食入則吐有食已則吐以橘紅為主歲者少陽也少陽多氣少血故有聲無物乃氣病也以半夏為主究其三者之源皆因脾氣虛弱或因寒氣客胃或因飲食所傷而致宜以丁香藿香半夏茯苓陳皮生薑之類主之燥○濕嘔者有物有聲食已則嘔乾嘔者空嘔無物總屬陽明氣血俱病故嘔比吐為重也○劉河間謂嘔者火氣炎上此特一端耳有痰隔中焦食不得下者有氣逆者有寒氣鬱於胃口者有食滯心肺之分新食不得下而反出者有胃中有火與痰而嘔者明○嘔家雖有陽明證慎不可下逆之故也○

脉法

寸口脉數其人即吐○寸口脉細而數數則為熱細則為寒數其人即嘔吐細○問曰病人脉數數為熱當消穀引食而反吐者何也師曰過發其汗令陽氣從膈氣虛故乃數數為客熱不能消穀胃中虛冷故吐也○陽脉緊陰脉數其人食已即吐○寸緊尺瀦其人胃滿不能食而吐○脉滑為嘔

嘔吐

治法

吐則有痰最忌瀉弱寸緊滑數微數血虛單浮胃薄
北則有傷脾胃為則不磨朝食暮吐暮食朝吐完
穀不化名曰胃反脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐
胃噎膈寸緊尺澁朝噎反胃脈浮緩者生沉
澁者死脈澁而小血不足
足脈大而弱氣不足

湯梗○熱者面赤手足熱食已即吐宜保中湯和中
加味橘皮竹茹湯○湯清熱二陳湯或葛根竹茹湯
葉石膏湯○加薑汁服即止○時常口吐清
木或芍藥升麻下涌上者脾熱所致也二陳湯加白
木白芍藥煎服或蒸餅為丸服○肝火出胃逆上嘔
吐宜抑青丸○煖○半夏橘皮生薑為嘔家主藥
若胃虛而嘔者宜推揚穀氣四味藿香湯加減四
君子湯主之○久病胃虛嘔吐宜藿香安胃散

藿香平胃散比和飲○痰飲嘔吐宜茯苓半夏湯
小半夏湯○大半夏湯○而嘔者心下怔忡先渴後嘔
水如神○赤茯苓湯○而嘔者心下怔忡先渴後嘔
者宜赤茯苓湯○而嘔者心下怔忡先渴後嘔
即吐者宜五苓散○而嘔者心下怔忡先渴後嘔
千金之說信矣然氣逆作嘔生薑散之痰水作嘔
半夏夏逐之生薑於寒證最佳○若遇熱嘔不可無烏
梅也○蠲○嘔吐宜服薤白粥○嘔家有癰膿不須
自治愈矣○蠲盡

自

加味二陳湯
治胃冷嘔吐
錢丁香五錢
分也
一貼

丁香安胃湯
治嘔吐
錢丁香二錢
柴胡升

麻當歸身陳皮甘草
二當歸身陳皮甘草
一分右剉作一貼
水煎服

加減理中湯
治胃寒嘔吐
白朮亦茯苓乾薑炮陳皮藿香丁香半

夏縮砂研桂皮各一錢
貼入薑三片烏梅一箇
水煎服