

醫學發明

咽膈不通

並四時換氣用藥法

飲食勞倦論

九上

本草十劑

四上

中風同從高墜下

滑詠生癰疽

瀉之則脹已汗之則瘡已

二九下

區欬氣喘

陰所至為高熱中滿霍亂吐瀉

廿三上

諸脈按之無力所生病證

並治法

諸腹脹大皆屬於熱

廿上

諸嘔吐酸皆屬於熱

三十七上

諸痿喘嘔今立熱喘

二方寒喘

諸脈有胃有格有覆有益

廿九上

損其腎者益其精

四上

腸門不通土衝敗不用噎塞不便燥秘

四十四上

腳氣論

四十四下

中風有三

四七上

肺塞則面白生痰喘欬嚏唾

五十三上

五邪相干

謂賊實微虛正也

淹疾瘡病

五十八上

百病在氣在血

六十一上

治病必須求其

醫學發明

醫學發明方目錄

吳茱萸丸

氣不交通

利膈丸

痰喘咳嗽

消痞丸

心下痞

黃耆補中湯

本草十劑

傷元活血湯

墜墜

乳香神應散

止痛

當歸導滯散

墜墜

紫金丹

接骨

聖靈丹

止痛

調中順氣丸

痞滯

沉香導氣丸

痞痛

木香順氣湯

腹脹

沉香交泰丸

腹脹

加減瀉白散

喘嗽

神秘湯

喘嗽

三奇湯

痰嗽

補中益氣湯

勞倦

朱砂安神丸鎮固

人參益肺散氣鬱

草薢薏苡丸心痛

丁香練實丸癰疔

茴香練實丸疝

托裏榮衛湯瘡

續隨子丸腫

木香楊梅丸腹脹

導滯通經湯脾濕

薑附湯寒禁

用藥加減法

通氣防風湯太陽氣鬱

白朮附子湯寒中

天台烏藥散疝

川練子散疝

沉香海金沙丸腫脹

海金沙散脾濕

廣茂潰堅湯積

赤茯苓丸脾濕

沉香桂附丸

十全大補湯補弱

中滿分消丸熱脹

中滿分消湯寒脹

藿香安胃散嘔吐

加減二陳湯吐

人參平肺散肺痿

參蘇溫肺湯寒嗽

滋腎丸熱閉不渴

清肺飲子渴小便閉

還少丹補

補益腎肝丸困乏

水芝丸補

地黃丸腎虛

三才封髓丹益腎水

離珠丹虛冷

天真丹下焦虛

八味丸腎氣虛

通幽湯幽門不通

潤腸湯燥結

當歸拈痛湯脚氣疼

醫學發明卷一

新安吳勉學校

膈咽不通并四時換氣用藥法

黃帝鍼經云。胃病者。腹脹。膈胃。皖當心而痛。上支兩
脇。膈咽不通。食飲不下。取三里。夫咽者。嚥物之門
戶也。膈者。上焦胃中心肺之分野。不通者。升降之
氣上不得交。又云。清氣在下。則生飧泄。泄黃如糜。
米穀不化者是也。濁氣在上。則生脹。腹中脹滿。
不得大便。或大便難。或先結後溏皆是也。濁氣在
上。當降而不降者。乃腎肝吸入之陰氣不得下而

反在上也。胃氣逆上。或爲嘔。或爲吐。或爲噦者。是陰火之邪上衝。而吸人之氣不得入。故食不下也。此皆氣衝之火逆。胃之脈反上而作者也。清氣在下。則生飧泄者。胃氣未病之曰。當上行心肺。而營經也。因飲食失節。勞役形體。心火乘於土位。胃氣弱而下陷於陰中。故米穀入而不得升。反降而爲飧泄也。膈咽之間。文通之氣。不得表裏者。皆衝脈上行逆氣所作也。蓋胃病者。上支兩脇。膈咽不通。飲食不下。取三里者是也。鍼經云。清濁相干。亂於胃中。是爲大惋。惋者惑也。氣不交通。最爲急證。不

急去之。諸變生矣。聖人治此有要法。陽氣不足。陰
氣有餘。先補其陽。後瀉其陰。是先令陽氣升發。在
陽分而後瀉陰也。春夏之月。陽氣在經。當益其經。
脈去其血。絡秋冬陽氣降伏。當先治其藏。有者有
噎。有寒。寒者五藏之所生。陰也。血也。噎者六府之
所生。陽也。氣也。二者皆由陰中伏陽而作也。今立
四氣用藥并治法于後。

冬三月陰氣在外。陽氣內藏。當外助陽氣。不得發汗。
內消陰火。勿令泄瀉。此閉藏周密之大要也。盛冬
乃水旺之時。水旺則金旺。子能令母實。肺者腎之

身皮毛之陽元本虛弱更以冬月助其令故病者
善嚏鼻流清涕寒甚出濁涕嚏不止比常人大惡
風寒小便數而欠或上飲下便色清而多大便不
調夜寒無寐甚則為痰咳為嘔為噦為吐為唾白
沫以至口開目瞪氣不交通欲絕者

吳茱萸九主之

吳茱萸

草豆蔻仁

各一錢二分

橘皮

益智仁

人參

黃耆

升麻

各八分

澤瀉

白殭蚕

薑黃

柴胡

各四分

當歸身

炙甘草

各六分

木香

二分

青皮

分三

大麥蘖

一錢五分

半夏

一錢

右件爲細末。湯浸蒸餅爲丸。如菰豆大。細嚼二十丸。白湯送下。無時。

夏三月大暑陽氣在外。陰氣在內。以此病而值此時。是天助正氣而挫其邪氣。不治而自愈矣。然亦有當愈不愈者。蓋陰氣極盛。正氣不能伸故耳。且如膈咽不通。咽中如梗。甚者前證俱作。治法當從時利膈。泄肺火。以黃耆補中湯送下。如雨足痿厥。行步惛然。欹側欲倒。臂膈如折。及作痛而無力。或氣短氣促而喘。或不足以息。以黃耆人參甘草白

米蒼木澤瀉猪苓茯苓橘皮等作湯送下滋腎丸
一百五十丸六七月之間濕熱之令大行氣短不
能言者加五味子麥門冬如心下痞膨悶食不下
以上伴白朮蒼木等湯送下消痞丸五七十丸更
當審而用之

利膈丸主胃中不利痰嗽喘促脾胃壅滯

木香七錢

檳榔七分

厚朴

姜製二兩

人參

藿香葉

當歸

炙甘草

枳實

炒各二兩

大黃

酒浸焙稱二兩

右爲細末滴水和丸或少用蒸餅亦可如桐子大

每服三五十九食後諸飲下

消痞丸治一切心下痞悶及積年久不愈者

黃連

去鹽炒六錢

黃芩

刮黃色六錢

薑黃

白朮

各一兩

人參

四錢

炙甘草

錢

縮砂仁

三錢

枳實

炒黃色半兩

橘皮

四錢

乾生薑

二錢半

夏

湯洗七次四錢

麴

炒黃色二錢

一方

加澤瀉厚朴

各三錢

猪苓

二錢半

右為極細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七

十九至百丸白湯送下食後服

黃耆補中湯

黃耆錢一

人參錢八

炙甘草

白朮

蒼朮

橘皮各半兩

澤瀉

猪苓

茯苓

各三分

右咬咀都作一服水二盞煎至一盞去滓大溫送下上件丸藥

本草十劑

宜可以去壅。壅橘之屬是也。此大畧言之。蓋外感六淫之邪。欲傳入裏。三陰尚實而不受逆邪氣于胃中。窒塞不通。而或噦或嘔。所謂壅也。仲景云。嘔多雖有陽明證。不可攻之。况乾噦者乎。三陰者。攻單

用生薑宜散必愈。若嘔者有聲而有物邪在胃系未深入胃中。以生薑橘皮治之。或以藿香丁香半夏亦此之類。投之必愈。此天分氣分虛無處一無所受。今乃窒塞。仲景謂膈之上屬上焦。悉屬於表。或有形質之物因而越之。則可。若氣壅則不可。越

者吐也亦無下之理

破氣藥也。

辛瀉氣

若陰虛機氣逆上窒塞

嘔噦不足之病。此地道不通也。止當用生地黄當歸桃仁紅花之類。和血涼血潤血。兼用甘藥以補其氣。微加大黃芒硝以通其閉。大便利邪氣去。則氣逆嘔噦自不見矣。復有胃中虛熱穀氣久虛發

而爲嘔噦者。但得五穀之陰以和之。

五穀皆屬陰。或食或飲。

湯皆止。

則嘔噦自止。且如小兒班後餘熱不退。痾

不收斂。大便不行。一謂血燥。則當以陰藥治血。因

而補之。用清涼飲子。通利大便而瀉其熱也。索古

云。涼風至而草木實。夫清涼飲子。乃秋風徹熱之

劑。傷寒家邪入於裏。日晡潮熱。大渴引飲。譫語躁

狂。不大便是。謂胃實。乃可攻之。夫胃氣爲濕熱所

傷。以承氣湯瀉其土實。元氣乃得周流。承氣之名

於此見矣。今哀世人以苦瀉火。故備陳之。除熱瀉

火。非其寒。不可以苦寒瀉火。非徒無益。而又害之。

故諄諄及此。至如孫真人言生薑嘔家之聖藥。謂上焦氣壅。表實而言之。非以瀉氣而言之也。

若脾胃虛弱。穀氣不行。榮衛下流。清氣不上。留中閉塞。惟益胃推揚穀氣而已。不宜瀉也。若妄以瀉氣瀉血藥下之。下之則轉增閉塞疼痛。或變作結胃。復下其膈。由此致危者多矣。鍼經說。呵欠噦振寒噫噦。譫涕淚出。太息涎下。耳中鳴。目瞤舌顫。昏視生病者。補之。此十二邪者。皆奇邪之走空竅者也。凡邪之所在。皆爲不足。宜補而不宜瀉。空竅者。胃之清氣能通也。胃氣虛則穀氣不上行。是氣路

不利經云廉泉玉英者津液之道路也津液不上
胃中氣路不開亦令人噦勿作外實以辛藥生薑
之類瀉其壅滯蓋肺氣已虛而反瀉之是重瀉其
氣必胃中如刀剗之痛與正結胃無異亦聲聞于
外用藥之際可不慎哉

通可以去滯通草防已之屬是也防已大苦寒能瀉
血中大熱之滯也亦能瀉大便與大黃氣味同者
皆可瀉血滯豈止防已而已通草甘淡能助西方
秋氣下降利小便專瀉氣滯也小便氣化若熱絕
津液之源於肺經源絕則其水斷流故膀胱受濕