

外科正宗卷四

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯

許開平水訂
蔣光緒實叻校

發背論第二十三

發背有五一日陽毒先因風熱或患熱毒消渴或先患傷寒餘毒蓄積於背脊膏之間不拘樞數但從兩夾脊

起滿背掀熱赤紫或紅色如燄膿毒難成後痛不除數日之間忽然平塌味者誤謂腫消殊不知此是內

攻肉陷不可復藥矣

此二句徐國此曰此乃始時高腫以後忽平故為險惡者本不起發雖腫虛證反可施治

二曰陰毒乃氣冷而作初如黍米隱隱而痛直應前

心頭目昏重寒熱如癰五七日後始覺攻腫膿毒淡沈遲緩未透急宜以補氣湯藥內托

此句徐國

外以抽膿藥

貼之三日服金石燒煉藥毒初起如丹腫之狀熱熱漸開如湯火所傷面色如赭心膈煩躁多渴嗜冷

此句徐國

其瘡難起起則驚人尤甚於陰陽二毒但根柢分明須以解金石毒湯散急治其內方保無虞四曰酒食毒

乃平時或饑或困飽食即睡或多食酒食冷熱黏滑肥鮮油膩之類積於臟腑兼之不慎幃幕恣意當風脾

臟氣虛不能承受乃毒發於背

徐曰此所謂背梁之瘡足生大疔者也

不問椎數初起頭如小彈子後大如拳其堅如石痛連四肢

加之拘急口若舌乾腹急便澀十數日後頭面手足浮腫臟腑滑泄急痛如利是其候也初腫時急用收腫

發穴潰膿湯藥內實臟腑外泄膿水治之遲緩潰腐愈甚傷骨爛筋復感外邪而致內敗死矣五曰冒山嵐

瘴氣毒其人素歷瘴鄉觸冒嵐瘴著諸臟腑久而不發至氣血衰弱及斷喪虧損之時而後發露初起腫色

青黑形如靴皮附筋徹骨頑如木石引手加深方覺痛處至五七日毒氣浮淺腫高色變青白有如拳打之

狀寒戰似癰頭痛口歪又有風手足厥逆眼黑睛小白多此因內有邪氣相搏急宜破清血三五升方有

黃白膿出然其皮猶腫痛不止直至青白之色退盡方愈此宜急急追趕膿毒出外方為無害否則有未不

至於危者也相案發背乃大證而原本無總論但有治驗各條列於卷二腫瘍治法之後而統名之曰癰疽

治驗殊為闕略失次今取徐批瘍科選粹中發背論補于治驗之前并載徐批而移在腦疽之後庶幾以類

相從其方藥原本不別出散非於腫潰瘍諸方及腦疽門並非專治背疽之方故仍其舊

發背治驗

一男子年五十餘背心生疽十三日矣湯水不入煩悶不語背堅硬如負石皮色亦紫瘡勢雖重喜其根脚交會明白毒尚結局於此未經入內須行拔法使毒氣外發不致內攻隨煮藥筒提拔二次去惡血碗許餘曰最忌血又脈實便閉用內疎黃連湯及豬膽導法何曰大便通利二次使內外毒氣皆得通泄夜臥即安背重失其大半次用托裏排膿之藥外以桑木灸法腫硬漸腐膿毒漸出換服十全大補湯加麥冬五味數服腐肉自脫飲食漸進瘡口漸合調理兩月餘而愈

一老婦年近七旬背瘡已過半月形勢可畏其家已置不治整備後事適予往看童稚瘡證見而問之臆言待斃旦夕予強請觀半背皆腫瘡雖不高亦不內陷以手按之外實而內腐老年內虛膿毒中隔不得外發故也雖飲食不進且善根脚兩無混雜臟腑各無敗色治之可生其家堅執不信且言籤龜命卜俱斷必死予歎曰再三四日不治內膜穿洩此命死於無辜矣次日予自往謂曰予非相強實見其可生不忍聽其死耳藥金分毫不取愈後任從酬謝何如其家首肯乃先用葱艾湯淋洗外面俱是不腐頑肉隨用拔針利翦取去正中二寸頑肉放通膿管以手輕里之間擦淨內蓄膿血約有三碗旁觀無不失色膿血稍盡仍換前湯洗淨用膏封貼內用回元大成湯二服徐曰膿已出可用以接補真氣後用人參養榮湯倍參朮加香附早以八味丸八味丸徐勒八仙饒相兼調理使其脾健食進腐脫肌生亦此婦亦謹慎調理並未更變不出百日瘡愈身健始信予言不謬也

一監生年過五旬素有渴證體又極肥生背疽約有尺許至十二朝後請治視其形勢微腫色淡微紅根脚半收半散此陰陽相等之證也肥人內虛瘡勢又大非補托瘡必難起毒必易陷誠恐緩不及事便以托裏散固其內候至十五日外用披針小小從頂放通三孔緣勢大不可過放走泄元氣致膿難成但令有路可出

而已內用參耆內托散倍加人參黃耆各三錢服至二十日大膿將發日至升許早以參朮膏午用十全湯加參耆各四錢麥冬五味子各一錢徐曰用五味子不通所以毒氣收往而難愈也服至月餘肉腐通潰膿似湧泉間用聖愈湯兼之八

仙錢調理保助脾胃增進飲食尙恐前藥不能勝病加熟附一錢脾健膿稠色黃而正四十日外瘡熱方得

微退時值仲夏酷熱病者生煩誤飲冷水二碗瘡隨下陷不痛無膿身涼脈細腹痛足冷變爲陰證非辛熱

不能回陽急用十二味異功散倍人參熟附各三錢不應徐曰用人參則寒氣不出矣換用生附人參各五錢錢徐又早晚二

服方得身溫脈起瘡高復痛又二服膿似前流徐曰此藥力微成之膿也出至一月約有百餘碗竟不減少外皮紅退亦不

腐爛徐曰此乃補毒之故大凡非反對之藥原不能殺人只是補勞更太不能愈耳此肥人外實內虛故皮不腐而內潰也又用玉紅膏搽於棉花片上推

入瘡內膏蓋之內腐漸脫漸出又十日後出大腐一塊約有六兩自後腫消身便膿少肌生百日外方得平

復人參服過五斤外人參五斤外徐又附子亦用十兩餘此句徐勒方得全安此證設用解毒傷脾宣利等藥徐曰原不可用何勞說得

用辛熱峻補豈有生理

一鄉官年踰七旬背瘡已經八日形雖微腫色淡不紅勢若龜形根漫不聳乃老年氣血衰弱之故診其脈帶

微數而有力此根本未撥雖老可治隨用排膿內托散加皂刺以潰膿托裏服至十三日後瘡漸高腫色亦

漸赤但不能潰膿此食少脾弱未能培養之故也又用十全大補湯數服徐曰總不膿始漸出不能快利乃因

膜中隔不通故也不可畏其老而致誤事隨用披針徐曰不可當頭取開寸許捺通膿管膿果隨出以猪蹄湯洗

淨膏蓋復用照藥每日一次外肉亦腐爲膿病者形色枯槁更用人參養榮湯倍加參耆徐曰托裏腐肉將

脫者取之新肉欲生者培之但老年氣血衰不能速效又加服參朮膏早晚二次新肉方生飲食頓倍調理

七十餘日而安

一庠生年六十餘患背疽已十日外其形堅硬色亦深紫頭發甚多含若螺子豎長尺餘根橫半背喜其高腫

光亮發熱掀痛脈洪數有力此膏梁醇酒濕熱交蒸之故雖重不妨隨用照藥三條相繼照畢其內含螺子

盡欲吐出即用搗脚刮去流出惡血鍾許徐曰總不葱湯洗淨搽上腐藥用紙蓋貼周圍根脚以吸毒散敷之

收其毒氣使不開大次日仍照仍敷三日後外肉漸腐內服托藥培助脾胃解毒為膿早服八味丸徐曰以

滋腎水徐曰換洗蹄湯仍將膏貼候至腐盡其深寸餘隨用玉紅膏日漸生長但此公好飲雖病不戒兩月

後新肉雖平嬌嫩不能結皮完口復將淨嫩之肉盡行翦去以上十字徐又批曰此等法膏貼數日肉平復

珠散數次方結皮蓋八十日而安出於何典其人不死幸也

一老人患疽半月其瘡貫脊徧背皆腫上至肩膊下至腰脇腫若瓜形頭計數百其家以為不治余診其脈

微洪而不鼓瘡形腫掀外發飲食知味年雖老而根本尚有餘也先用托裏消毒散二服其勢稍定外用桑

木灸法助其腐潰根以鐵桶膏搗之更服排腫內托散正膿漸出但老年氣血不充外肉不易就腐視其肉

色變而不腐者用針鉤利剪徐徐翦去約四寸餘見長紅肉便用膏塗新肉已生將半時值隆冬其家自行

開看房中不著炭火兼蓋被未暖致被寒侵瘡色淡白膿亦清稀飲食減少氣體不舒幸其瘡本屬陽證隨

用濃葱湯乘暖淋洗將玉紅膏烘化搽上外用膏貼以熟綿軟絹覆蓋數層細蓋甚密內用神功托裏散早

晚連進二服次早復看其瘡自回陽矣徐曰不鑿用以後遵法調理百日而安參此故易愈

一老人年過六旬患背疽十二日矣其形半腫半紅微疼微熱發於背心之下腎俞之上高低平等廣闊八寸

根脚泛腫色若水噴徐曰色若水噴最為膿證頂軟無神似腐非腐脈浮而大重按則虛余曰此瘡易於腫潰而難於收斂

不可治也其家笑而不信復請里中老醫視之見病者起居平和言語清利舉動加常飲食有味以為五善

俱具安若泰山其家亦喜隨用其藥日漸有功膿潰腫退徐曰此腐盡肌生余謂其親族曰此病必死於收

口至錢大時也眾皆不信果至口如錢大時變證一出不四朝而死始以余言為神

一男子六旬有二發右搭手予用艾炷形勢漸高腫堅硬不痛半月後尚未潰膿日生煩悶恐其毒陷先用針

通隨行拔法拔出惡血鍾許此六字稍得輕便日搽化腐之藥膏蓋三日後瘡漸腐潰至二十日出正膿壞

內潮脈新肉漣生外治之法盡矣其家與一內科醫甚密詰其開方不遵外科神丹之法字餘圖失於彰補四亦不全在參前語終有隙

每日人參不過二錢余余曰不及當用五錢兼熟附二錢不然必變其家與內科醫

俱不信後果肉色淡白瘡口散大膿水清稀飲食減少敗證具矣雖強投溫中健脾大補之藥終至形體消

削膿水臭穢延至六十日瀝盡氣血而亡悔已無及凡大瘡每日膿出一碗用參必至三錢以此爲則此人

日出膿三碗用參二錢謂之大損小補安得不死又外科乃破漏之病最能走泄真氣如損補兩不相敵無

以抵當多致不救後曰此說亦是然補法亦儘多此人不可不償補而自取敗亡惜哉人亦有變通之法

一男子年近六旬其孫患瘰癧余往視彼坐於堂時值仲夏余見其背生熱癰凡二十餘內有一瘡甚小余謂

曰此非瘰癧比其毒甚大一發即不可治彼笑而答曰固無恙也及送至門余又謂曰可急請他醫視之彼仍

不信至十日形勢稍發命里中一醫視之曰瘰癧也又十日形勢內陷敗證齊出始信前言矣親友邀余往視

彼臥於堂帛覆瘡上余登堂未數步即退親友問故余曰敗氣滿前死期速矣何必再視急備後事更七日

死果如期不爽

疔瘡論二十四

夫疔瘡者乃外科迅速之病也有朝發夕死隨發隨死有三日五日而不死一月半月而終死此在於毒中之

淺深各隨臟腑而見證有曰火燄疔其患多生臍口手掌指節間初生一點紅黃小泡抓動癢痛非常左右

肢體麻木重則寒熱交作頭暈眼花心煩發躁言語昏憤此出於心經之病也有曰紫燕疔其患多生手足

腰脇筋骨之間初生便作紫泡次日破流血水三日後串筋爛骨疼痛苦楚重則眼紅目腫指甲純青舌強

神昏睡語驚惕此出於肝經之病也有曰黃鼓疔初生黃泡光亮潤四邊紅色纏繞多生口角腮顴眼胞

上下及太陽正面之處發之便作麻癢癢急硬強重則惡心嘔吐體木痛寒熱交作煩渴乾噦此出於脾

經之病也有曰白刃疔初生白泡頂硬根突破流脂水驟然癢痛易腐易陷重則腮損咽焦毛聳肌熱咳吐

膿痰鼻掀氣急此出於肺經之病也有曰黑靨疔其患多生耳發胸腹腰腎偏僻軟肉之間初生黑斑紫泡毒串皮膚漸攻肌肉頑硬如釘痛徹骨髓重則手足青紫驚悸沈困軟陷孔深目睛透露此出於腎經之病也以上五疔內應五臟又紅絲疔起於手掌節間初起形似小瘡漸發紅絲上攻手膊令人多作寒熱甚者惡心嘔吐遲治則紅絲至心常能壞人用針於紅絲盡處挑斷出血此十一字徐國尋至初起瘡上挑破俱用蟾酥條插入膏蓋蟾酥條徐勣批曰點按毒藥為妙內服汗藥散之自愈凡治此證貴在乎早此句徐國初起即治者十全十活稍遲者十全五六失治者十全一二初起項以上者二陽受毒必用披針刺入瘡心四五分徐曰必用金針為穩不必太深挑斷疔根令出血隨用回疔丹或蟾酥條插入孔內膏蓋之如項以下者三陰受毒即當灸灸此句徐又灸之不痛亦須針刺搗藥方效隨後俱用蟾酥丸冬月萬靈丹發其大汗二字徐勣批曰發汗過不宜太過毒方得解不致稽留毒氣致生變證今人治法不論陰陽表裏部位上下凡見是瘡便加艾灸殊不知頭乃諸陽之首亢陽熱極所致其形雖小其惡甚大再加艾灸火益其勢逼毒內攻反為倒陷走黃之證作矣既作之後頭面耳項俱能發腫形如尸胖七惡頓起治雖有法百中難保一二外又有疔名數種形狀紛紛有舊說未及重錄徐曰此篇皆是古人舊說不可不知但疔不可灸以其全屬火也 梟案徐言疔不可灸全生集言疔藥不可用酒皆古人未發之論凡藥不忌酒煎而疔獨忌之者疔善走黃也

疔瘡看法

初起如疥形如粉刺或小泡或疙搭結脈不散者順瘡腫不作寒熱亦不惡心飲食有味手足溫暖者順瘡腫肉不腫四圍白色多痛少癢作膿者順已灸出膿瘡仍高腫肉色鮮明根內紅活漸平者順初起似疔非疔軟漫灰色四邊瘡根平塌漫腫者凶未發前先行作寒熱如瘰癧惡心不食後出瘡如蚊跡蚤斑或青紫黑泡軟陷無根腐爛深孔氣粗足冷者逆瘡形似魚臍頂凹灰白軟漫相兼脈細身冷者多逆肉腫瘡不腫根腳走散瘡頂空腐血水氣穢者死凡疔項以上針刺不疼項以下灸之不痛俱死已經走散頭面耳項俱腫煩躁脈細驚動

喘急者死日久原癰無跡走散之處仍復作膿脈數屬焦終死雖險惡歲運順者可活癰雖微險歲運逆者當危

徐曰大段與諸證同 梟案徐批有附錄繡波公一條云疔瘡全看部位如部位不佳者甚為難治余觀其毒將走之證用針破其四圍插入拔疔之藥其浮腫處用針鑲之出其惡血此法甚妙 又案他書載疔形闊如韭菜長可寸餘肉色紫黑者忌行針刺

疔瘡治法

初生在項以上者必先針刺

徐曰亦宜斟酌

以去惡血庶毒不內攻在項以下者必先艾灸

此四字徐又

以殺其勢庶不侵良

肉發熱惡寒身體拘急六脈緊數邪在表也宜汗散之身體發熱口燥咽乾脈實有力二便秘澀者宜下之針刺之後瘡不作腐邊腫不消仍加搗藥

二字徐又

內用補托初起誤灸致毒走黃不住者急當隨走處破去惡血

四字徐點

發熱乾嘔心煩作渴悶亂神昏當解毒清心托裏護膜

此二句徐曰

潰後氣血受傷神怯食少睡臥不甯宜助脾胃斂神氣將愈後氣血漸復飲食當進仍作渴者急滋養腎水

徐曰宜長清心胃之火

疔瘡治驗

一監生右額下生疔三日形如魚目麻癢不常此肺經受毒也用針刺入四五分

此句徐勒

其硬如骨有聲隨用

蟾酥條搗至三日猶不腐化

徐曰肉已變頑那得腐

此堅頑結聚之病也非此藥所能勝

徐曰為藥所害

換用三品一條槍搗至七日

以上九字徐勒批曰好肉俱須痛極矣可惡

外用紙封蓋至十一日脫出疔根一塊約有指許

徐曰皆好肉為藥所變者

以長肉玉紅膏搽之先服

托裏消毒散加金銀花二錢白芷五分脫後用八珍湯加天花粉麥門冬黃耆陳皮各一錢調理月餘肉已

平用珍珠散搽上結皮而愈

一監生中年縱欲自服補腎助陽之藥以致腎水受傷

以上四字徐批曰是

不能上制心火左額生一泡先紫後黑麻木

不知痛癢黑屬腎經其毒不淺幸四邊尚未定散即用針刺

此二字徐勒

以冰蠟散厚糊作條挿入患孔

以上八字徐勒批曰額上

皮薄如何
可用插藥
仍用紙封勿令泄氣朝服加減八味丸以滋腎水此丸九餘批曰此乃增腎火也午服益氣養榮湯接補真氣晚用琥

珀蠟礬丸護心解毒至十一日外疔根與藥結成一塊以上八字餘批批曰凡好肉過惡藥皆為死肌依期脫落乃用生肌斂口補助調

理脾胃之藥二十日而愈後因不慎保養及三年復成勞瘵而歿徐曰病根仍在自然致死

一婦年近四旬與夫不相得懷抱鬱鬱季夏臘發一疔六日後方延余治毒已走散頭目層項俱腫形色紫赤

余曰肉腫痛不腫業已走黃不治之證徐曰亦非必死之證以下治法幸而生耳婦流涕歎曰一家皆絕也余問其故婦曰吾夫不肖

有一女二子尚未婚嫁我死而托命於夫必致流蕩故我死則家絕矣余聞其言不忍棄而不治但瘡勢既

大非藥力所回因先雇一貧人與飯吃飽再飲水酒數杯隨用針刺腫上十餘處以上七字徐勒令其吸出惡血數

碗以上四字徐勒批曰自有散毒之方何必出溫湯洗淨用蟾酥錠磨濃塗之四圍敷金黃散早晚二次內以護心散

蠟礬丸清心護裏兼服降火化痰開鬱安神之藥餘腫稍退又六日其夫言何以不死婦聞暴怒腫甚於前

復用針刺約十餘處出血三四碗以上十三字徐勒針孔上蓋小膏餘腫仍用敷藥出血既多其內必虛服人

參養榮湯徐曰出血多不得不然加香附貝母數日後針口漸膿餘腫漸消其瘡頭乃得高腫仍用蟾酥條插化腐潰

勒徐外用生肌斂口之藥內服開鬱和中養血健脾之劑百日外方愈此瘡勉強治之得生其後二子一女

俱婚配夫先故婦今六十五歲矣

一婦二十二歲右耳垂向前一寸生疔二日請余視之約有豆大頂陷色灰此肺經白刃疔也又根脚綿軟毒

不結聚為陷伏陰證未針刺徐曰若針出血亦死其舅曰何恙也余直告曰疔瘡彼冷笑不信余因辭不用藥復請他醫

視之曰不過風熱疔瘡耳用消風散藥二服毒氣全收昏憤喘急而死

一少婦額下生瘡瘰作癢予欲針之此四字徐勒批曰針亦死其家不信自用灸法次日四邊漸腫瘡漸陷此二句徐勒批曰灸之害如此又三日

頭面大腫復請余視灸處已結黑靨乾陷無膿此毒氣內陷外肉已死又面目浮腫光亮發熱形狀不堪此

正氣衰而邪氣實也治必不效其家悔之無及後半月而死

蟪酥丸蟪酥丸用有奇功 乳沒砂礞輕粉同 銅絲蟪酥寒水石 蝸牛原解共蜈蚣 治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臂腿等瘡一切惡證歹瘡不痛或麻木或

嘔吐病重者必多昏憤此藥服之不起發者即發不痛者即痛痛甚者即止昏憤者即甦嘔吐者即解未成者即消已成者即潰真有回生之功乃惡證中至寶丹也

蟪酥二錢 輕粉五分 枯礬 寒水石煨 銅綠 乳香 沒藥 膽礬 麝香各一錢 雄黃二錢 蝸

牛二十一個 礞砂三錢 以上各為末稱準於端午日午時在淨室中將蝸牛研爛再同蟪酥和研稠黏方入各

藥共搗極勻丸如菉豆大每服三丸用葱白五寸患者自嚼爛吐於男左女右手心包藥在內在無灰熱酒一茶鍾送下被蓋約人行五六里許出汗為效甚者再進一服修合時婦人雞犬等忌見

徐曰此護心定痛之方有狗寶丸此等方可不合 梹案蟪酥膽礬蝸牛三味徐園方中無蜈蚣而歌訣有之

黃連解毒湯黃連解毒湯黃連 黃芩甘草牛旁子 黃柏黃芩山梔兼 口乾內熱即時搗 治疔毒入心內熱口乾煩悶恍惚脈實者

黃連 黃芩 黃柏 山梔 連翹 甘草 牛旁子各等分 水二茶鍾燈心二十根煎

八分不拘時服

徐曰一味寒涼亦宜酌用 梹案全生集有奪命湯為疔毒主方余初疑其家傳祖方後得鈔本仙傳治疔方有之乃知其古方也方用羌活獨活防風青皮黃連赤芍藥細辛甘草蟬蛻蠶蠶草河車澤蘭金銀花各

等分鈔本防風青皮分兩稍重云初起急服此方能內消也余曾見將走黃者服之亦效

立馬回疔丹立馬回疔丹輕粉 蟪酥砂礞白丁香 雄乳砂礞金頂等 化疔恰似雪撲湯 治疔瘡初起已用針刺後又或誤灸失治以致疔毒走散不住乃

走黃險惡證也急用此搗

蟪酥酒化 礞砂 輕粉 白丁香各一錢 蜈蚣一條 雄黃 礞砂各二錢 乳香六分 麝香一分 金頂礞五分

製法詳
未卷

共爲細末糊成麥子大凡遇疔瘡針破用此一粒插入孔內膏蓋之追出膿血疔根爲效

後曰疔有毒肉必用此拔出降藥亦能拔疔 又曰總屬剛燥之藥不宜輕用 又曰蟾酥乃點頭必用之

藥 又曰代針丹有血竭硼砂冰片

疔毒復生湯

疔毒復生湯壯陽 乳沒山梔與木通 花粉連翹黃皂刺 銀花牛蒡骨皮同

治疔毒走黃頭面發腫毒氣內攻煩悶欲死者

牡蠣

山梔

金銀花

木通

連翹

牛蒡子

乳香

沒藥

角刺

花粉

大黃

地骨皮 各八分

水酒各一茶鍾煎一半食遠服不能飲者水煎臨服入酒一杯和服亦效脈實

便秘者加朴硝

徐曰此表裏兩解之方實火宜用

七星劍

疔瘡最怕七星劍 野菊河車與帶丁 蒼耳麻黃稀薺草 加入半枝蓮有靈

治十三種疔瘡初起憎寒作熱惡心嘔吐肢體麻木痛癢非常心煩作

跟甚者昏憤急宜服之

野菊嫩頭蒼耳頭

豨薺草

半枝蓮

帶丁草

麻黃一錢 草河車二錢

用好酒一斤煎至

一碗瀉澄熱服被蓋出汗爲度冬月無鮮草宜預採陰乾臨時煎服之亦效

徐此所謂草頭方也

鉛粉散

鉛粉散治冷疔瘡 黃丹松脂及麝香 輕粉黑鉛澄黑粉 諸般陰爛可回陽

治冷疔生於脚上初起紫白泡疼痛徹骨漸至腐爛深孔紫血水氣穢

經久不瘥用此大效

黑鉛

四兩鐵杓化開傾入水中取起再化如 此百遍以鉛盡爲度取水澄下者三錢

松脂

一錢

黃丹

飛炒五分

麝香

一分

輕粉

五分

共研先用蔥湯洗淨麻油調塗

瘡口油紙蓋外

徐曰治濕毒之證下體膿瘡最宜

化疔內消散

化疔內消散山甲 知母天花粉皂角 甘草白朮乳桐車 半夏銀花赤芍藥

治疔瘡初起或已針已灸之後服之能令內消

皂角刺 金銀花 知母 貝母 天花粉 穿山甲 白芨 乳香 赤芍

半夏 甘草 草河車各一錢 水酒各一茶鍾煎一半量病上下食前後服之徐曰亦通治之方重

出 梔子 天花粉徐觀

東毒金箍散東毒金箍散白芨 白蠟白芷生大黃 黃柏蠶金輕豆粉 敷圖諸毒不開張 治疔瘡針刺之後餘毒走散作腫宜此藥箍之

梔子 白芨 白蠟 白芷 大黃各四兩 黃柏二兩 輕粉五錢 菜豆粉一兩 共爲細末醋米釀調

箍四邊夏熱甚者蜜水調

徐曰即圍藥意義

解毒大青湯解毒大青湯知母 元參麥冬生石膏 黃人黃麻梔子 大黃木通二錢調 治疔瘡誤灸逼毒入裏致生煩躁譫語不定者

元參 桔梗 知母 大青葉 升麻 石膏 山梔 人中黃 麥門冬 木

通各一大黃便服 燒人糞 水二茶鍾淡竹葉燈心各二十件食遠服 梔子人中黃燒人糞徐俱批不入

藥陸君以酒謂人糞入藥具載他書功效甚著王君士雄謂不入藥者不入煎劑也以其穢惡耳如遇火盛

毒重之證改用陳年糞清澄澈無穢氣者頗有殊功醫者不可不知也

消疔簡便方消疔簡便藥二般 葱白七聖和白蠟 每服三錢溫酒下 如湯瀉雪勝靈丹 治疔瘡及諸惡毒初起但未成膿者

白礬末三錢 葱白七聖 右二味同搗極爛分作七塊每塊用熱酒一杯送下服畢用厚被蓋之再吃葱白

湯一鍾少頃汗出如淋從容去其覆物其痛苦脫此雖味澀難服其效更妙凡居鄉村之處倘有緊病不及

請醫只傳此方服之活人甚衆誠爲良便方也

太乙紫金丹太乙紫金丹麝香 芙蓉文蛤共雄黃 磁砂大戟千金子 百證諸瘡應手良 解諸毒療諸瘡利關竅通治百病此藥真能起死回生製之濟人

奇效不可盡述凡居家出入與大工動大兵及閩廣雲貴仕宦者不可無之

山茨菇洗去毛皮 淨焙二兩 川文蛤一名五倍子 破淨焙一兩 麝香揀淨毛皮乾 者研淨三錢 千金子一名續隨子仁 白者去油一兩 紅芽大戟杭州紫大戟爲上江 南次之北方結大戟

色白者性烈峻利損傷元氣人服之有致吐血愼之勿用取杭州之上品者去蘆根洗淨焙乾爲末一兩五錢整

礞砂有神氣者研極細末三錢

雄黃鮮紅大塊者研細末三錢

以上之藥各擇精品於

淨室中製畢候端午七夕重陽或天月德天醫黃道上吉之辰凡入室合藥之人三日俱宜齋沐更換新潔衣帽臨日方入室中淨手薰香預立藥王牌位主人率衆焚香拜禱事畢各將前藥七味復戩稱準入於大乳鉢內再研數百轉方入細石臼中漸加糯米濃飲調和軟硬得中方用杵搗千餘下至極光潤爲度每錠一錢每服一錠病勢重者連服二錠以取通利後用溫粥補之修合時除合藥潔淨之人餘皆忌見此藥惟在精誠潔淨爲效治一切飲食藥毒蠱毒瘴氣惡苗河豚中毒及自死牛馬猪羊六畜等類之肉人誤食之必昏亂卒倒或生異形之證並用水磨灌服或吐或瀉其人必甦南方山蠻瘴氣烟霧癘疫最能傷人感之纔覺意思不快惡寒惡熱欲嘔不嘔卽磨一錠服之得吐利便愈癰疽發背對口疔瘡天蛇無名腫毒蛙節紅絲等疔及楊梅瘡諸風癰疹新久痔瘡並用無灰淡酒磨服外用水磨搽瘡上日夜數次覺癢而消陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈塞滯邪毒未出瘰癧癰發狂喉閉喉風俱用薄荷湯待冷磨服赤白痢疾肚腹瀉泄急痛霍亂絞腸痧及諸痰喘並用薑湯磨服男子婦人急中顛邪渴叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼覓失心狂亂羊兒猪顛等風俱用石菖蒲煎湯磨服中風中氣口眼歪斜牙關緊急言語蹇澀筋脈攣縮骨節風腫遍身疼痛行步艱辛諸風諸癰並用酒磨頓熱服下自縊溺死驚死壓死鬼魅迷死但心頭微溫未冷者俱用生薑續斷酒煎磨服一切惡蛇風犬毒蝎溪澗諸惡等蟲傷人隨卽發腫攻注徧身甚者毒氣入裏昏悶響叫命在須臾俱用酒磨灌下再吃葱湯一碗被蓋出汗立甦新久瘧疾臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服小兒急慢驚風五疳五痢脾病黃腫癰瘡癰瘤牙關緊閉並用薄荷浸水磨濃加蜜服之仍搽臍上年歲幼者每錠分作數服牙痛酒磨塗痛上仍含少許良久嚙下小兒父母遺毒生下百日內皮塌爛瘰癧道眼眶損爛者俱用清水磨塗打撲損傷松節無灰酒研服年深月近頭脹頭疼太陽痛極偏頭風及時疫愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上婦女經水不通紅花湯下凡遇天行疫

證延街及巷相傳傳染者用桃根湯磨濃搭入鼻孔次服少許任入病家再不傳染又治傳尸勞瘵諸藥不能禁忌一方士指教服此每早磨服一錠至三次後逐下惡物尸蟲異形怪類後得脫然以此相傳活人不計其數一女子久患勞瘵為屍蟲所噬磨服一錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也

徐曰此諸毒邪氣內外要方無病不治 又曰此秘藥中之第一方也用藥之奇不可思議

人參清神湯 人參清神湯此書 歸苦甘草麥冬宜 柴陳遠志黃連等 功救遠同地骨皮 治疔瘡潰膿後餘毒未盡五心煩躁精神恍惚不甯言語睡臥不

清服之降火清心保扶元氣

人參 黃耆 當歸 白朮 麥冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志 甘草

柴胡 黃連 各五分 水二茶鍾糯米一撮煎八分食遠服

徐曰此愈後調養方毒未盡者不可服

內托安神散 內托安神散此書 茯神酸棗志陳皮 麥冬五味菖蒲草 加上人參更宜 治疔瘡針後已出膿時元氣虛弱睡臨驚悸心志不甯或毒未盡

流入心竅致多健忘亦宜服

人參 茯神 黃耆 白朮 麥冬 元參 陳皮 各一錢 酸棗仁 遠志 甘草

石菖蒲 五味子 各五分 水二茶鍾煎八分臨服入硃砂末三分和勻食遠服

徐曰與前方相可刪

疔瘡應用方

蟾酥條 即前蟾酥丸作 係掛餅用之 琥珀蟾蠶丸 玉紅膏 如意金黃散 托裏消毒散 護心散 見傷門

八珍湯 益氣養榮湯 加減八味丸 人參養榮湯 珍珠散 見下 水蠟散 見傷門

脫疽論第二十五

夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏粱薰蒸臟腑丹石補藥消燼腎水房勞過度氣竭精傷兼用房術之藥或噙舌下化水直至丹田或納臍中使熱徑投內腎爲丸掌握作香鼻嗅或抹陰鼎或搽陽器圖使堅硬希求常濟多致陽精煽惑淫火猖狂徐曰下焦往往有之其蘊蓄於臟腑者終成燥熱火証其毒積於骨髓者終爲疽毒陰癰巧人行拙誰防禍起蕭牆智者多愚自謂喜從天降直至骨枯髓涸臟敗腑亡方悔解脫無方罹殃有故凡患此者多生於手足手足乃五臟枝幹癰之初生形如粟米頭便一點黃泡其皮如煮熟紅棗黑氣侵漫傳遍五指上至腳面其疼如湯潑火燃其形則骨枯筋縮其穢異香難解其命仙方難活故謂血死心敗筋死肝敗肉死脾敗皮死肺敗骨死腎敗此五敗者雖有靈丹喪命而已生此疾者死生付於度外孫真人曰在肉則割在指則切卽此病也治之於早乘其未及延散時用頭髮十餘根纏患指本節盡處遠扎十餘轉漸漸緊之毋使毒氣攻延良肉隨用蠟酥餅放原起粟米頭上加艾至肉枯瘡死爲度徐曰灸而後割不至痛極血湧亦良法也次日本指盡黑方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下血流不住用如聖金刀散止之餘腫以妙貼散敷之次日倘有黑氣未盡單用蠟酥錠研末簪之膏蓋黑氣自退患上生膿照常法用玉紅膏等藥生肉護骨完口此爲吉兆內服滋腎水養氣血健脾安神之劑若內外無變証十中可保其三四月矣若割取之後黑色仍漫痛腫尤甚敗惡無膿口乾舌硬精神不爽食不知味者終死凡治此不可一已專任必與高明衆議聽患者願割與否因此証首尾吉凶難定故不可輕易醫治又有似是而實非者詳註在後宜參觀之徐曰此証十死八九卽治之得法亦難輕許其活此論却是一篇勸戒文不獨牛脫疽者然也

脫疽看法

起癰不渴口潤舌和性志尋常無妄暴急循禮爲吉初出形如麻子掀熱作痛一指皆腫根脚收束者吉已成頭便作腐肉不紫黑疼痛有時膿出腫消者吉已潰先膿後腐肉色紅活毒不走散氣不腥穢者吉未瘡先渴喜冷無度昏睡舌乾小便頻數陽痿者逆初起形如粟米肉便紫色不腫刺疼黑氣延散者逆已成瘡形枯濕

用辛熱散寒活血熏洗等藥不應又延黑脚面骨節一段甚疼余曰後必十指齊脫其生疑爲脫疽余曰似是而非尙可不妨令常用桑木火灸之取其溫暖活血又能解散鬱毒患處漸腐漸脫自不走散乃服健脾胃血之藥外用紅黑二膏生肌百日外愈

徐曰此凍極血凝之症

一侍女年十二歲貌頗美主嫌脚大用布任意纏緊以線密縫脹痛不堪訴主不聽半月後流出臭水方解視之雙足前半段盡皆黑腐骨肉已死余曰已壞者不可復救只救未壞者可也先煮麥粥食之次煎蔥湯令主家僕婦將兩足浸入湯內淋洗再換湯浸但腐肉不痛者逐一剪割連續知痛者以花蕊石散搽之俾將壞者復生已壞者得脫內服補中益氣湯外搽生肌玉紅膏此與前案男僕雖俱得愈俱廢疾終身

一男子右足小指縫中初生一點黃粟泡皮肉隨變紫色陰疼不腫有如刀刺視其形色真脫疽也診其脈又細數無力此腎經敗症詢知生平大飲內有妻妾三人精力已竭縱治無功遂起辭之後延至脚面足底皆穿疼痛不止飲食日少氣血日衰形體日削一月後百苦而終

徐曰此陰毒之症多不治

脫疽主治方

解毒濟生湯

解毒濟生湯花萼知母二花兼遠志犀角升麻牛膝同

治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或麻或痛四肢倦怠

心志恍惚不甯者

川芎

當歸

黃柏

知母

天花粉

金銀花

麥冬

遠志

柴胡

黃芩

犀角

茯神各一錢

甘草

紅花

升麻手加

牛膝足指加各五分

水二茶鍾煎八分

臨服入童便一杯

隨病上下服

徐曰藥味甚難不足法

陰陽二氣丹 陽二氣步天冬 冰柏元參青露同 治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽乾至飲冰雪不知其冷此孤陽獨旺宜服此解之

天冬 搗膏 麥冬 搗膏 五味子 炒研 黃柏 人中白 小兒溺者 生用研 元參 湯泡去粗皮 搗膏各一兩 青黛 色礬 嫩者 甘草 桔礬

辰砂 爲衣 澤瀉 各三錢 冰片 一錢 各爲細末同元參二冬膏子加煉蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如桐子

大每服六十丸童便乳汁各一鍾空心送下安睡一時其效如神

徐曰此方無法不可學

清神散 清神散內牛膝砂 豆粉梅花冰片加 解毒更兼甘草節 諸瘡煩嘔自然痊

治脫疽疔瘡發背毒積甚者曉理發越不盡煩躁悶亂睡則譫言嘔吐

不食

甘草 五錢 菜豆粉 二兩 劈砂 三錢 梅花片 五分 牛黃 三分 右爲細末每服一錢淡竹葉燈心湯調服

徐曰此治熱毒犯心經之方

雌雄霹靂火 雌雄霹靂火純陽 翳艾雙黃丁醇香 陰毒瘡疽陰癰背 用之一灸自回陽

治脫疽及一切發背初起不疼痛者

艾茸 二錢 丁香 雄黃 雌黃 各二錢 麝香 一錢

右四味共研極細搓入艾中作黃豆大丸放於患上

灸之母論痛癢以肉焦爲度如毒已經走散就紅暈盡處排炷灸之痛則至癢癢則至痛爲妙灸後仍用提疔麥子貼上膏蓋次服蟾酥丸及解毒濟生湯回活色有膿爲妙

徐曰陰症灸法

金液戊土丹 金液戊土丹五味 砂雄硝石烏梅肉 牛黃神志冰麝香 砂雄硝石烏梅肉 石菖蒲與入中黃

治脫疽及疔瘡發背先因縱食膏粱厚味法酒又或丹石補藥

勉力入房多致積毒臟腑久則胃汁中乾腎水枯竭不能上制心火以致消渴消中消腎饒飲多乾能食多

瘦九穀不通驚悸健忘見此諸症後必發疽多難治療宜預服此可轉重就輕移深居淺又解五蠱八石之

毒藥也

肉黑皮焦痛如刀割毒傳好指者遵已潰肉枯筋腐血水臭汗疼苦應心零竹徹骨者逆

脫疽治法

脫疽多生足指少生手指初起水窠黃泡者即灸之初生如粟裏可容穀皮色紫赤不作掀腫髮托仍灸已灸之後瘡受火氣發泡作膿外藥搗之內兼補托毒勢已成瘡形稍陷但紫色未攻脚面者評議割取既割之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已成飲食減少身體倦怠便數口乾滋津液壯腎水被後氣血受侮脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡臥不寧日晡發熱疼痛苦楚煩悶譴妄俱宜大補氣血貴貴及膏粱素饜色慾每於房術縱恣日久禁行割法

徐曰看法與諸証同治法前已說明重明不必

脫疽治驗

一男子年近五旬右足小指初生如粟米形漸成白泡三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也用艾火明灸十三壯始大痛乃止又用針刺灸頂貼蟪酥餅膏蓋其餘紫腫用披針鑿刺七八處發泄毒血用蟪蠟錠磨濃塗之腫外以真君妙貼散敷護良肉使不外侵時病者脈數身發寒熱惡心體倦先用人參敗毒散人參二錢徐勒解其表證次用黃連內疎湯通其大便而惡心煩熱亦止又用托裏消毒散加金銀花牛膝數服早用八味丸晚用蠟礬丸相兼服之隨又針刺徐曰針刺本不必又針刺更不必泄其毒氣解毒爲膿腫方不散後用十全大補湯加山黃五味此四字徐勒麥冬等藥調理月餘而愈此疽若不針灸發泄毒氣專假藥力敷圍再加峻藥攻必傷元氣豈能保乎

徐曰此證並非脫疽乃濕毒也糝解毒清火藥即愈因誤治遂成大證

一客商右足次指生一紫泡癢痛異常次日指甲俱紫欲黑余曰此乃肝腎二經之毒甲乃肝之餘氣甲紫則肝受毒也骨乃腎之餘腎傷則骨黑彼問何以致之余曰凡人勞疲筋力傷於肝誤服熱藥傷於腎此句徐隨批曰名醫